

## Дополнения к семинару 8

# Равновеликость и равноставленность. Третья проблема Гильберта

**Упражнение 8.1.** Пусть  $W$  — многоугольник, разрезанный двумя способами, а именно, на многоугольники  $F_1, \dots, F_n$ , а также на многоугольники  $G_1, \dots, G_m$ . Докажите следующее утверждение: многоугольник  $W$  можно разрезать на многоугольники  $W_i$  так, что каждый  $W_i$  лежит в некотором  $F_j$  и  $G_k$ . В частности, каждый  $F_j$  и  $G_k$  разрезается на некоторые из многоугольников  $W_i$ .

**Упражнение 8.2.** Выведите из упражнения 8.1, что из равноставленности многоугольников  $A$  и  $B$ , а также многоугольников  $B$  и  $C$ , вытекает равноставленность многоугольников  $A$  и  $C$ . Покажите, что отношение равноставленности на плоских многоугольниках является эквивалентностью.

**Упражнение 8.3.** Докажите, что любой плоский многоугольник можно разрезать на выпуклые многоугольники (а затем на треугольники).

**Упражнение 8.4.** Докажите, что любой треугольник равноставлен с некоторым параллелограммом.

**Упражнение 8.5.** Докажите, что два параллелограмма, у которых соответственно одинаковы основания и проведенные к ним высоты, равноставлены.

**Упражнение 8.6.** Из упражнения 8.5 выведите, что любые два прямоугольника равных площадей равноставлены.

**Упражнение 8.7.** Докажите, что конечный набор прямоугольников равноставлен с любым прямоугольником суммарной площади.

**Упражнение 8.8.** Докажите теорему Бойяи–Валласа–Гервина.

**Упражнение 8.9.** Выведите из теоремы Бойяи–Валласа–Гервина, что любая прямоугольная призма равноставлена с прямоугольным параллелепипедом, а последний равноставлен с кубом.

⊛ **Определение 8.1.** Пусть  $W$  — многогранник с множеством ребер  $E$ , и  $M$  — некоторое множество вещественных чисел, содержащее длины всех ребер из  $E$ . Пусть  $f$  — произвольная функция Дена для  $W$ , и  $g: M \rightarrow \mathbb{R}$  — произвольная аддитивная функция. Тогда *обобщенным инвариантом Дена многогранника  $W$* , соответствующим паре  $(f, g)$ , назовем число  $\sum_{e \in E} g(|e|) f(\alpha_e)$ , где  $|e|$  и  $\alpha_e$  — длина ребра  $e$  и величина двугранного угла при этом ребре соответственно.

**Упражнение 8.10.** Докажите, что у равноставленных многогранников обобщенные инварианты Дена равны.

**Упражнение 8.11.** Докажите, не пользуясь иррациональностью конкретных чисел, что среди правильных пирамид (основание — правильный многоугольник, а высота попадает в центр основания) имеются неравноставленные с равновеликим кубом.

Для решения этой задачи, нам нужно будет построить функцию Дена  $f$  и аддитивную функцию  $g$  на всем  $\mathbb{R}$ . Аддитивность этих функций, на самом деле, является не чем иным, как  $\mathbb{Q}$ -линейностью, т.е. сохранением

конечных рациональных линейных комбинаций. Покажем это на примере функции  $f$ . Пусть  $x = \sum_{i=1}^n \frac{p_i}{q_i} x_i$ , где  $p_i$  и  $q_i$  — целые числа, причем  $q_i \neq 0$ . Приведем все числа  $p_i/q_i$  к общему знаменателю и умножив правую и левую часть на этот знаменатель, получим  $Qx = \sum_{i=1}^n P_i x_i$ , где  $P_i$  и  $Q$  — целые числа,  $Q \neq 0$ ,  $P_i/Q = p_i/q_i$ . Если  $f$  сохраняет соотношения, то  $Qf(x) - \sum_{i=1}^n P_i f(x_i) = 0$ , откуда

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{Q} f(x_i) = \sum_{i=1}^n \frac{p_i}{q_i} f(x_i).$$

Таким образом, аддитивность  $f$  влечет  $\mathbb{Q}$ -линейность. Обратное,  $\mathbb{Q}$ -линейность, в частности, означает и линейность над целыми числами, т.е. аддитивность.

Чтобы эффективно строить  $\mathbb{Q}$ -линейные отображения с нужными свойствами, мы введем понятие базиса Гамеля. Начнем с ряда понятий, относящихся к произвольным векторным пространствам.

Пусть  $V$  — произвольное линейное пространство над некоторым полем. Линейная комбинация векторов из  $V$  называется *финитной*, если все коэффициенты этой комбинации, кроме конечного их числа, равны нулю. Система векторов из  $V$  называется *независимой*, если равенство нулю любой финитной линейной комбинации векторов этой системы равносильно тому, что все коэффициенты такой линейной комбинации равны нулю. Система векторов из  $V$  называется *полной*, если любой вектор из  $V$  выражается в виде некоторой финитной линейной комбинации векторов этой системы. *Базисом Гамеля пространства  $V$*  называется полная линейно независимая система векторов из  $V$ .

Оказывается, базис Гамеля всегда существует. Для доказательства этого факта, а также для изучения различных, нужных в дальнейшем, свойств таких базисов, нам понадобится одно фундаментальное утверждение из теории множеств, называемое леммой Цорна. Чтобы его сформулировать, напомним некоторые определения.

Пусть  $X$  — произвольное множество. Отношение “ $\preceq$ ” на  $X$  называется *частичным порядком*, если оно рефлексивно (при каждом  $x \in X$  выполняется  $x \preceq x$ ), транзитивно (если  $x \preceq y$  и  $y \preceq z$ , то  $x \preceq z$ ) и антисимметрично (если  $x \preceq y$  и  $y \preceq x$ , то  $x = y$ ). При этом, если  $x \preceq y$ , то будем говорить, что  $x$  *подчиняется*  $y$ . Примером частичного порядка, определенного на множестве  $X$  всех подмножеств некоторого множества, может служить принадлежность одного подмножества другому.

Пары элементов из  $X$ , для которых определено отношение, называются *сравнимыми*, а все остальные — *несравнимыми*. Частичный порядок, для которого все пары сравнимы, называется *линейным порядком*. Примером линейного порядка может служить стандартное отношение  $\leq$  на вещественных числах. Если множество  $X$  состоит более чем из одного элемента, то приведенный выше пример отношения на множестве всех его подмножеств линейным не является (убедитесь).

Подмножество  $Z$  частично упорядоченного множества  $X$  называется *цепью* в  $X$ , если индуцированный на нем частичный порядок линейен. Элемент  $m$  частично упорядоченного множества  $X$  называется *верхней гранью* множества  $Z \subset X$ , если для всех  $z \in Z$  выполняется  $z \preceq m$ . Элемент  $m$  частично упорядоченного множества  $X$  называется *максимальным*, если в  $X$  не существует большего чем  $m$  элемента, т.е. такого  $m' \neq m$ , что  $m \preceq m'$ . Вообще говоря, максимальных элементов может быть несколько. Кроме того, максимальных элементов может вообще не быть (приведите примеры, иллюстрирующие все описанные только что определения и утверждения).

**★ Лемма 8.2 (Цорн).** *Если в частично упорядоченном множестве  $X$  каждая цепь имеет верхнюю грань, то каждый элемент из  $X$  подчинен некоторому максимальному.*

Покажем, как отсюда вытекает существование базиса Гамеля. Пусть  $V$  — произвольное векторное пространство. В качестве  $X$  рассмотрим всевозможные независимые семейства  $S$  векторов из  $V$ , а в качестве частичного порядка — отношение принадлежности. Пусть  $C$  — произвольная цепь в  $X$ . Рассмотрим объединение  $\cup C$  всех элементов этой цепи. Покажем, что  $\cup C$  является независимой системой векторов из  $V$ .

Действительно, рассмотрим произвольную финитную линейную комбинацию векторов из  $\cup C$ , и пусть  $e_1, \dots, e_n$  — все векторы, при которых коэффициенты этой комбинации отличны от нуля. Каждый  $e_i$  принадлежит некоторому  $S_i \in C$ . Так как  $C$  — цепь, то все  $S_i$  сравнимы между собой, поэтому их можно упорядочить  $S_{i_1} \preceq \dots \preceq S_{i_n}$ , так что все  $e_i$  принадлежат  $S_{i_n}$  и, значит, входят в независимую систему, поэтому и сами образуют независимую систему. Таким образом, рассматриваемая финитная линейная комбинация равна нулю, если и только если все ее коэффициенты равны нулю, так что  $\cup C$  — независимая система. Ясно также, что любой элемент цепи  $C$  подчиняется  $\cup C$ , так что  $\cup C$  — верхняя грань для  $C$ .

Из проведенных рассуждений вытекает, что применима лемма Цорна, поэтому каждый элемент из  $X$  подчинен максимальному. Что представляют собой максимальные элементы в  $X$ ? Это такие независимые системы векторов из  $V$ , которые нельзя расширить до больших, т.е. добавление любого вектора приводит к зависимой

системе. Отсюда мгновенно вытекает, что каждый добавленный вектор к максимальному  $S \in X$  выражается в виде финитной линейной комбинации векторов из  $S$ , поэтому  $S$  является полной системой и, значит, базисом Гамеля. Итак, лемма Цорна приводит нас к следующему результату.

**★ Следствие 8.3.** *В любом векторном пространстве любая независимая система векторов содержится в некотором базисе Гамеля.*