

Геометрия квантового расстояния Громова–Хаусдорфа, часть III

А. О. Иванов, А. А. Тужилин

24 апреля 2024 г.
22:29:21

Оглавление

1	Предварительные результаты	4
1.1	Банаховы пространства	4
1.2	Направленности и их пределы	7
1.3	Слабая топология	11
1.4	*-слабая топология	12
1.5	Рефлексивные пространства	13
1.6	Сепарабельные пространства	13
1.7	Равномерная выпуклость	13
1.8	Гильбертовы пространства	14
2	Банаховы алгебры	16
2.1	Элементы теории алгебр	16
2.1.1	Алгебра, унитарная алгебра	16
2.1.2	Нормированные и унитарные нормированные алгебры	17
2.1.3	Банаховы алгебры	17
2.1.4	Идеалы, модулярные идеалы	19
2.1.5	Гомоморфизмы алгебр	20
2.1.6	Унитаризация	21
2.2	Резольвентные множества и спектры в унитарной алгебре	22
2.2.1	Случай унитарных банаховых алгебр	25
2.3	Спектральный радиус в унитарной алгебре	27
2.4	Спектры и спектральные радиусы в неунитарной алгебре	29
2.5	Экспоненты в унитарной банаховой алгебре	29
2.6	Модулярные идеалы, продолжение	30
2.7	Характеры коммутативной алгебры, ее спектр	31
2.7.1	Характеры коммутативной алгебры и ее унитаризации	32
2.7.2	Характеры, спектры, топология пространства характеров	33
2.7.3	Отождествления	35
2.8	Представление Гельфанда коммутативной банаховой алгебры	37
3	Элементы теории C^*-алгебр	40
3.1	Алгебры с инволюцией или *-алгебры	40
3.2	Нормированные и банаховы *-алгебры	43
3.3	C^* -алгебры	44
3.3.1	Унитаризация банаховой *-алгебры и C^* -алгебры	46
3.4	Представление Гельфанда коммутативной C^* -алгебры	49
3.5	Некоторые приложения представления Гельфанда	51
4	Функциональное исчисление C^*-алгебр. Положительные элементы.	54
4.1	Функциональные исчисления	54
4.2	Положительные элементы в C^* -алгебрах	56
4.3	Частичный порядок на эрмитовых элементах C^* -алгебры	59
4.4	Аппроксимативная единица	61
4.5	Положительные линейные функционалы на C^* -алгебрах	64

4.6	Конструкция Гельфанда–Наймарка–Сигала	71
5	Частичный порядок с единицей на векторных пространствах	75
5.1	Вещественные векторные пространства с порядком	75
5.1.1	Положительные \mathbb{R} -линейные функционалы и состояния	77
5.1.2	Порядковая полунорма	80
5.2	Упорядоченные *-пространства	83
5.2.1	Полунормы на упорядоченных *-пространствах	84
6	Квантовые метрические пространства	88
6.1	Обобщенные полунормы и обобщенные полуметрики	88
6.1.1	Факторизация	91
6.2	Обобщенная липшицева полунорма на обобщенном метрическом пространстве	92
6.2.1	Продолжение липшицевых функций	93
6.3	Комплексные меры	95
6.4	Расстояние Монжа–Канторовича	97
6.5	Упорядоченные пространства с порядковой единицей (напоминание)	98
6.6	Представление Кэдисона	100
6.7	Компактные квантовые метрические пространства	101
6.7.1	Липшицева полунорма на упорядоченном пространстве	102
6.7.2	Lip-норма	102
6.8	Пространства с липшицевыми полунормами	103
6.8.1	Липшицева топология и *-слабая топология	106
6.8.2	Критерий совпадения липшицевой и *-слабой топологий	107
6.8.3	Преобразование компактного метрического пространства в квантовое	109
6.8.4	Полунепрерывность снизу липшицевых полунорм и восстановление полунормы из метрики	110
6.8.5	Функционал Минковского	115
6.8.6	Пополнение Минковского и замыкание полунорм	121
6.9	Радиус квантового метрического пространства	123
	Литература	124

Введение

Мы предполагаем, что слушатели нашего курса знакомы с основами общей топологии [1] и метрической геометрии [2], [3]. Цель наших лекций — познакомить слушателей с современными работами, посвященными геометрии квантового расстояния Громова–Хаусдорфа — расстояния между квантовыми метрическими пространствами. Эти пространства возникают в физике, в частности, в теории струн, и определение степени похожести между ними играет важную роль в приложениях. Понятия квантового метрического пространства и соответствующего квантового расстояния Громова–Хаусдорфа между такими пространствами были введены Риффелем [5, 6, 7]. Эти конструкции были обобщены многими авторами, например Керром [8, 9] и Ву [10, 11, 12].

Квантовые метрические пространства строятся на базе C^* -алгебр и, более общо, на базе частично упорядоченных векторных пространств с единицей. Мы приведем все необходимые определения и свойства соответствующих теорий. Об этих конструкциях имеется огромная монография. Мы воспользовались [14] и [13].

Классическая часть теории расстояния Громова–Хаусдорфа в основном имеет дело с непустыми компактными метрическими пространствами, рассматриваемыми с точностью до изометрии (расстояние между изометричными пространствами равно нулю). Такое семейство, обычно обозначаемое \mathcal{M} и называемое *пространством Громова–Хаусдорфа*, континуально, расстояние Громова–Хаусдорфа на нем является метрикой (равенство нулю расстояния нулю между компактными метрическими пространствами на самом деле равносильно их изометричности), а само пространство — полное, сепарабельное и геодезическое. Важным утверждением является критерий Громова предкомпактности подмножества пространства \mathcal{M} .

Мы будем также работать с компактными квантовыми метрическими пространствами и покажем, что квантовое расстояние Громова–Хаусдорфа равно нулю между квантовыми изометричными пространствами, а также что для него выполняются многие свойства стандартного расстояния Громова–Хаусдорфа.

Тема 1

Предварительные результаты

План. Банаховы пространства, примеры, фактор-пространства, непрерывные линейные отображения, сопряженные пространства и линейные функционалы, обобщенная норма, сильная топология, пространство непрерывных линейных операторов, банахова алгебра с единицей, теорема Хана-Банаха и ее следствия, рефлексивные пространства, примеры, теорема Банаха-Штейнгауза, направленное множество, направленное множество окрестностей точки топологического пространства, направленность и ее область определения, сходимости и предел направленности, примеры, критерий непрерывности отображения топологических пространств, конечная поднаправленность и поднаправленность общего вида, точка накопления, точка накопления направленности и сходящиеся поднаправленности, пример “несовершенства” конечных поднаправленностей, плоскость Тихонова, критерий компактности топологического пространства, центрированные системы множеств, слабая топология для множества отображения из данного множества в топологические пространства, слабая топология на нормированном пространстве и его сопряженном, свойства слабой сходимости, *-слабая топология на сопряженном пространстве к нормированному пространству, свойства *-слабой сходимости, теорема Банаха-Алаоглу, рефлексивные пространства, сепарабельные пространства, равномерная выпуклость, гильбертовы пространства, эрмитово произведение, полуторалинейность, тождество параллелограмма, теорема Рисса, сопряженный линейный оператор, семейство всех непрерывных линейных операторов на гильбертовом пространстве как пример C^* -алгебры.

Приведем ряд понятий и теорем из функционального анализа, которые нам потребуются в дальнейшем, см. детали, например, в [15]. В наших лекциях все объекты, определенные в общем случае над некоторым полем \mathbb{F} (линейные пространства, функции и др.), предполагаются заданными или над полем вещественных чисел \mathbb{R} , или над полем комплексных чисел \mathbb{C} . Если выбирается конкретное из этих полей, то это обговаривается отдельно.

1.1 Банаховы пространства

Напомним, что **банаховым пространством** называется нормированное линейное пространство, являющееся полным относительно метрики, заданной нормой.

Пример 1.1. Приведем некоторые примеры банаховых пространств:

- все конечномерные нормированные векторные пространства;
- пространство всех ограниченных функций $\mathcal{B}(S)$, заданных на произвольном множестве S , наделенное \sup -нормой $\|f\| = \sup_{s \in S} |f(s)|$;
- подпространство всех непрерывных ограниченных функций $C_b(X) \subset \mathcal{B}(X)$, заданных на произвольном топологическом пространстве X ;
- подпространство всех непрерывных функций $C(X) \subset \mathcal{B}(X)$, заданных на хаусдорфовом компактном топологическом пространстве X ;
- подпространство $C_0(X) \subset C_b(X)$ всех непрерывных функций $f: X \rightarrow \mathbb{F}$, заданных на хаусдорфовом локально компактном топологическом пространстве X и **исчезающих (обращающихся в нуль)** на бесконечности (последнее означает, что для любого $\varepsilon > 0$ существует такой компакт $K \subset X$, для которого $|f(x)| < \varepsilon$ при всех $x \in X \setminus K$);
- пространство ℓ_p , $1 \leq p < \infty$ всех последовательностей $x = (x_1, x_2, \dots)$ чисел $x_k \in \mathbb{F}$, удовлетворяющих $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty$ с нормой $\|x\|_p = (\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p)^{1/p}$;

- пространство $m = \ell_\infty$ всех ограниченных последовательностей $x = (x_1, x_2, \dots)$ чисел (вещественных или комплексных) с sup -нормой $\|x\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k|$ (это пространство является частным случаем пространства $\mathcal{B}(S)$ для $S = \mathbb{N}$);
- замкнутое подпространство c пространства ℓ_∞ , состоящее из всех сходящихся последовательностей;
- замкнутое подпространство c_0 пространства c , состоящее из всех последовательностей, сходящихся к 0;
- подпространство $\mathcal{B}_\infty(\Omega) \subset \mathcal{B}(\Omega)$, состоящее из всех измеримых функций $f: \Omega \rightarrow \mathbb{F}$, заданных на измеримом пространстве Ω (множестве Ω , наделенном σ -алгеброй);
- пространство $L_p(\mu)$, $1 \leq p < \infty$, состоящее из всех измеримых функций $f: \Omega \rightarrow \mathbb{F}$ с интегрируемой по Лебегу функцией $|f|^p$ (такие функции называются μ -интегрируемыми), наделенное нормой $\|f\|_p = (\int_\Omega |f|^p d\mu)^{1/p}$, где $(\Omega, \mathcal{S}, \mu)$ — измеримое пространство с мерой μ , а функции, равные друг другу μ -почти всюду, отождествляются;
- пространство $L_\infty(\mu)$ существенно ограниченных функций, т.е. у которых

$$\|f\|_\infty = \inf \left\{ M \geq 0 : \mu(|f| \geq M) = 0 \right\} < \infty,$$

наделенное нормой $\|f\|_\infty$, где $(\Omega, \mathcal{S}, \mu)$ — измеримое пространство с мерой μ , а функции, равные друг другу μ -почти всюду, отождествляются.

Замечание 1.2. Отметим, что пространство ℓ_p , $1 \leq p \leq \infty$ является частным случаем пространства $L_p(\mu)$, где $\Omega = \mathbb{N}$, а μ — считающая мера, т.е. $\mu(S) = \#S$ для каждого конечного $S \subset \mathbb{N}$, и $\mu(S) = \infty$ для бесконечного S .

Замечание 1.3. Примером не банахова пространства может служить, например, пространство всех вещественных многочленов одной переменной, заданных на отрезке $[a, b]$, с sup -нормой.

Напомним также конструкцию фактор-пространства. Пусть E — векторное пространство и $F \subset E$ — его подпространство. Тогда на E возникает отношение эквивалентности, для которого $x \sim y$, если и только если $x - y \in F$. Классами этой эквивалентности являются аффинные подпространства вида $x + F$. Множество классов эквивалентности естественно наделяется структурой векторного пространства, называется **фактор-пространством E по F** и обозначается E/F . Если E — нормированное пространство, то в качестве F выбирается замкнутое подпространство, а фактор-пространство E/F наделяется естественной нормой $\|x + F\| = \inf_{y \in F} \|x + y\|$.

Замечание 1.4. Замкнутость F требуется для того, чтобы действительно получилась норма, иначе может не выполняться условие положительной определенности. Действительно, рассмотрим нормированное векторное пространство $E = C([a, b])$ непрерывных вещественных функций с sup -нормой, а в нем — подпространство F всех многочленов. Тогда E/F состоит более чем из одного класса (так как не все непрерывные функции — многочлены), однако “норма” каждого класса, определенная приведенной выше формулой, равна нулю, так как каждая непрерывная функция, в соответствии с теоремой Вейерштрасса, сколь угодно хорошо по sup -норме приближается многочленами.

Задача 1.5. Докажите, что если E — банахово пространство, а $F \subset E$ — его замкнутое подпространство, то E/F — также банахово пространство.

Так как норма превращает линейное пространство в топологическое, определено понятие **непрерывного линейного отображения** $L: E \rightarrow F$ между нормированными пространствами.

Задача 1.6. Докажите, что линейное отображение $L: E \rightarrow F$ нормированных пространств непрерывно, если и только если оно ограничено, т.е. переводит каждое ограниченное подмножество E в ограниченное подмножество F . В силу линейности это эквивалентно тому, что L переводит единичный замкнутый шар $B_E \subset E$ с центром в нуле в ограниченное подмножество F .

Множество всех ограниченных линейных отображений $L: E \rightarrow F$ будем обозначать $\mathcal{B}(E, F)$. Отметим, что операции поточечного сложения и умножение на элементы поля превращают $\mathcal{B}(E, F)$ в векторное пространство. В частном случае, когда F совпадает с полем \mathbb{F} , пространство $\mathcal{B}(E, F)$ обозначается E^* и называется **сопряженным пространством**, а его элементы называются **линейными функционалами**.

Пусть $L: E \rightarrow F$ — линейное отображение нормированных пространств. Положим

$$\|L\| = \sup_{x \in B_E} \|L(x)\|$$

и назовем **обобщенной нормой** L .

Задача 1.7. Покажите, что отображение L непрерывно, если и только если $\|L\| < \infty$. Иными словами, $\mathcal{B}(E, F)$ состоит из всех линейных отображений L с конечной обобщенной нормой $\|L\|$. В частности, E^* — это семейство всех линейных функционалов с конечной обобщенной нормой.

Отметим, что обобщенная норма на $\mathcal{B}(E, F)$ является обычной нормой. Соответствующая этой норме топология на $\mathcal{B}(E, F)$ называется **сильной**. В частности, таким образом определяется сильная топология на сопряженном пространстве E^* . Также **сильной** называют исходную топологию на E , заданную нормой.

Задача 1.8. Покажите, что для $L \in \mathcal{B}(E, F)$ и любого $x \in E$ выполняется $\|L(x)\| \leq \|L\| \|x\|$, т.е. каждое такое L является $\|L\|$ -липшицевым.

Задача 1.9. Покажите, что если E — нормированное пространство, а F — банахово пространство, то пространство $\mathcal{B}(E, F)$ — банахово. В частности, сопряженное пространство E^* является банаховым для любого, не обязательно банахова, нормированного пространства E .

Еще одним важным частным случаем пространства $\mathcal{B}(E, F)$ является пространство $\mathcal{B}(E) := \mathcal{B}(E, E)$ **непрерывных линейных операторов**. Помимо структуры векторного пространства, на $\mathcal{B}(E)$ имеется еще и операция “умножения” — композиция отображений.

Задача 1.10. Докажите, что

- для произвольных $L_1, L_2 \in \mathcal{B}(E)$ выполняется $\|L_1 L_2\| \leq \|L_1\| \|L_2\|$;
- тождественное отображение $1: E \rightarrow E$ лежит в $\mathcal{B}(E)$;
- $\|1\| = 1$.

Тем самым, $\mathcal{B}(E)$ является также кольцом с единицей.

В случае банахова E , пространство $\mathcal{B}(E)$, в силу задачи 1.9, является банаховым, и поэтому кольцо $\mathcal{B}(E)$ называется **банаховой алгеброй с единицей**. Банаховыми алгебрами мы будем более детально заниматься в будущих лекциях.

Также приведем важный для дальнейшего результат о продолжении непрерывных линейных функционалов.

Теорема 1.11 (Хан-Банах). Пусть E — нормированное пространство, $F \subset E$ — его подпространство и $f \in F^*$. Тогда существует $g \in E^*$, продолжающий f , т.е. $g|_F = f$, и имеющий с f ту же норму: $\|g\| = \|f\|$.

Следствие 1.12. Пусть E — нормированное пространство и $x \in E$, тогда существует $f \in E^*$ такой, что $\|f\| = 1$ и $f(x) = \|x\|$. В частности,

- если $x, y \in E$, $x \neq y$, то существует $f \in E^*$, различающий точки x и y , т.е. $f(x) \neq f(y)$;
- имеет место формула, двойственная определению нормы линейного функционала, а именно

$$\|x\| = \sup_{f \in E^*, \|f\| \leq 1} |f(x)| = \max_{f \in E^*, \|f\| \leq 1} |f(x)|,$$

где последняя формула означает, что супремум достигается.

Рассмотрим каждый элемент $x \in E$ как функцию $J_x: E^* \rightarrow \mathbb{F}$, определенную правилом $J_x(f) = f(x)$. По определению линейной структуры на E^* , каждое отображение J_x линейно, а для линейной комбинации $ax + by$, $x, y \in E$, $a, b \in \mathbb{F}$ имеем $J_{ax+by} = aJ_x + bJ_y$. Кроме того, из задачи 1.8 непосредственно вытекает, что каждый функционал J_x — липшицев и, значит, непрерывный (в сильной топологии). Таким образом, $x \mapsto J_x$ представляет собой линейное отображение $J: E \rightarrow E^{**}$. В силу следствия 1.12, имеем $\|J_x\| = \|x\|$, т.е. отображение J изометрично, в частности, для $x, y \in E$, $x \neq y$, отображения J_x и J_y различны. Значит, отображение J — изометричное линейное вложение.

Нормированное пространство E называется **рефлексивным**, если J — сюръективное отображение (, а значит и биективное, изометричный изоморфизм), т.е. $E^{**} = E$. Приведем примеры рефлексивных и не рефлексивных пространств. Для $1 < p < \infty$ положим p^* равным единственному числу q , удовлетворяющему $1/p + 1/q = 1$. Иными словами, $p^* = p/(p-1)$, так что p^* удовлетворяет такому же неравенству $1 < p^* < \infty$. Продолжим это определение по непрерывности, положив $1^* = \infty$ и $\infty^* = 1$. Ясно, что для любого $p \in [1, \infty]$ имеем $p^{**} := (p^*)^* = p$.

Теорема 1.13. *Имеют место следующие результаты.*

- Все конечномерные нормированные пространства рефлексивны.
- Для каждого $p \in (1, \infty)$ выполняется $\ell_p^* = \ell_{p^*}$, поэтому такие пространства ℓ_p рефлексивны.
- Для пары $\{1, \infty\}$ ситуация иная: $\ell_1^* = \ell_\infty$, но $\ell_\infty^* \subsetneq \ell_1 = c_0^*$, так что пространства ℓ_1 , ℓ_∞ и c_0 не рефлексивны.
- Для каждого $p \in (1, \infty)$ пространство $(L^p(\mu))^*$ изометрически изоморфно $L^{p^*}(\mu)$, поэтому такие пространства $L^p(\mu)$ рефлексивны (теорема Рисса–Фреше).
- Пространство $C([a, b])$ не рефлексивно.

Следующая фундаментальная теорема также пригодится нам в дальнейшем. Мы приведем ту ее версию, которая будет нам нужна.

Теорема 1.14 (Банах–Штейнгауз). *Пусть $\{T_\alpha: E \rightarrow F\}_{\alpha \in A}$ — семейство непрерывных линейных отображений из банахова пространства E в нормированное пространство F . Предположим, что $\sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha(x)\| < \infty$ для всех $x \in E$. Тогда существует $M > 0$ такое, что $\|T_\alpha\| \leq M$ при всех $\alpha \in A$.*

1.2 Направленности и их пределы

В этом разделе мы обсудим конструкцию из общей топологии, которая обобщает понятие последовательности и называется направленностью. Оказывается, в случае произвольных топологических пространств последовательностей не хватает для получения утверждений, являющихся одновременно необходимыми и достаточными. Например, хорошо известно, что в хаусдорфовом пространстве каждая сходящаяся последовательность имеет единственный предел. Однако из единственности предела для каждой сходящейся последовательности хаусдорфовость не следует (приведите пример). Далее, непрерывные отображения сохраняют сходимую последовательностей. Однако из сохранения сходимости всех последовательностей непрерывность не вытекает (впрочем, для частного случая метрических пространств сохранение сходимости эквивалентно непрерывности). Наконец, компактность (из открытого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие) и секвенциальная компактность (из произвольной последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность) — независимые свойства, т.е. ни одно из них не влечет другое. Замена последовательности на направленность решает все перечисленные выше проблемы.

Пусть S — частично упорядоченное множество. Оно называется **направленным**, если для любых $s_1, s_2 \in S$ существует $s \in S$ такое, что $s \geq s_1$ и $s \geq s_2$ (каждая пара элементов имеет общую мажоранту).

Пример 1.15. (1) Множество $S = \mathbb{N}$ натуральных чисел с естественным порядком.

(2) Пусть X — топологическое пространство, $x \in X$, а Ω_x — семейство всех открытых окрестностей точки x , упорядоченное отношением, обратным к включению: $U \leq V$, если и только если $U \supset V$. Тогда для любых $U_1, U_2 \in \Omega_x$ в качестве их общей мажоранты можно взять $U_1 \cap U_2$. Такое Ω_x назовем **направленным множеством окрестностей точки $x \in X$** .

По аналогии с тем, что последовательность во множестве X — это отображение из \mathbb{N} в X , **направленностью в X , параметризованной направленным множеством S** , называется каждое отображение $f: S \rightarrow X$. Множество S называется **областью определения направленности f** . Как и в случае с последовательностью $x: \mathbb{N} \rightarrow X$, когда образ натурального числа n обычно обозначают в виде x_n , для направленности $x: S \rightarrow X$ образ $x(s)$ элемента $s \in S$ будем обозначать x_s .

Пример 1.16. (1) Каждая последовательность является направленностью.

(2) Для направленного множества Ω_x окрестностей точки x топологического пространства X в качестве направленности $\Omega_x \rightarrow X$ выберем отображение, сопоставляющее каждой окрестности $U \in \Omega_x$ некоторую точку $x_U \in U$.

Напомним, что последовательность точек x_n топологического пространства X сходится к $x \in X$, если для любой окрестности $U \in \Omega_x$ существует n_0 такое, что при всех $n \geq n_0$ выполняется $x_n \in U$. Аналогично определим сходимость направленности $\{x_s\}_{s \in S}$: эта направленность **сходится к точке** $x \in X$, называемой **пределом** этой направленности, если для любой окрестности $U \in \Omega_x$ существует $s_0 \in S$ такое, что при всех $s \geq s_0$ выполняется $x_s \in U$. Сохраним для направленностей похожие обозначения сходимости и предела: $x_s \rightarrow x$ и $x = \lim_S x_s$.

Пример 1.17. (1) Каждая сходящаяся последовательность является сходящейся направленностью с тем же пределом.

(2) Пусть $\{x_U : U \in \Omega_x\}$ — определенная выше направленность в топологическом пространстве X . Тогда $x_U \rightarrow x$. Действительно, для любой открытой окрестности V точки x , имеем $V \in \Omega_x$, и все окрестности $W \in \Omega_x$ такие, что $W \geq V$, содержатся в V , поэтому и все соответствующие x_W содержатся в V .

Конструкция 1.18. Пусть S и T — направленные множества. Превратим $S \times T$ в частично упорядоченное множество, положив $(s_1, t_1) \leq (s_2, t_2)$, если и только если $s_1 \leq s_2$ и $t_1 \leq t_2$. Покажем, что $S \times T$ — направленное множество. Выберем произвольные $(s_1, t_1), (s_2, t_2) \in S \times T$, и пусть s — мажоранта s_1 и s_2 , а t — мажоранта t_1 и t_2 , тогда (s, t) — мажоранта для обеих пар (s_i, t_i) . Полученный порядок на $S \times T$ называется **порядком произведения**.

Теорема 1.19. Топологическое пространство X хаусдорфово, если и только если каждая сходящаяся направленность в X имеет единственный предел.

Доказательство. Пусть сначала пространство X — хаусдорфово. Предположим, что некоторая направленность x_s сходится одновременно к x и y , $x \neq y$. В силу хаусдорфовости, у этих точек имеются окрестности U^x и U^y такие, что $U^x \cap U^y = \emptyset$. Так как $x_s \rightarrow x$, то существует s_0 такое, что при всех $s \geq s_0$ выполняется $x_s \in U^x$. Аналогично, существует s_1 такое, что при всех $s \geq s_1$ выполняется $x_s \in U^y$. Так как S — направленное множество, существует $\sigma \in S$, мажорирующая s_1 и s_2 . Тогда $x_\sigma \in U^x \cap U^y = \emptyset$, противоречие.

Докажем обратное утверждение. Предположим, что каждая сходящаяся направленность в X имеет единственный предел, но пространство X — не хаусдорфово. Это означает, что существуют различные $x, y \in X$, у которых любая пара окрестностей U^x и U^y пересекается. Рассмотрим направленное множество $S = \Omega_x \times \Omega_y$ и построим направленность в X , параметризованную S , выбрав для каждого $U = (U^x, U^y)$ произвольную точку $x_U \in U^x \cap U^y$. Тогда x_U сходится одновременно к x и y . Действительно, для каждой окрестности V^x точки x имеем $V^x \in \Omega_x$. Выберем произвольную окрестность V^y точки y , тогда $V = (V^x, V^y) \in S$, и для всех $W = (W^x, W^y) \in S$, $V \leq W$, выполняется $V^x \supset W^x \supset W^x \cap W^y \ni x_W$, откуда $x_U \rightarrow x$. Аналогично $x_U \rightarrow y$. Полученное противоречие завершает доказательство. \square

Теорема 1.20. Отображение $F: X \rightarrow Y$ топологических пространств непрерывно, если и только если оно сохраняет сходимость направленностей.

Доказательство. Пусть F непрерывно. Рассмотрим произвольную направленность $\{x_s\}_{s \in S}$ в X , сходящуюся к некоторому $x \in X$, и пусть $y = F(x)$. Тогда, в силу непрерывности F , для любой окрестности V^y точки y существует окрестность U^x точки x такая, что $F(U^x) \subset V^y$. Так как $x_s \rightarrow x$, существует $s_0 \in S$ такое, что для всех $s \geq s_0$ выполняется $x_s \in U^x$, но тогда для этих же s имеем $F(x_s) \in F(U^x) \subset V^y$, поэтому $F(x_s) \rightarrow y$, что и требовалось.

Обратно, пусть F сохраняет сходимость всех направленностей. Покажем, что F непрерывно в каждой точке $x \in X$. Предположим противное, т.е. существует $x \in X$ такое, что F не является непрерывным в x . Снова положим $y = F(x)$. Тогда существует окрестность V^y точки y такая, что в каждой окрестности $U \in \Omega_x$ имеется точка x_U , для которой $F(x_U) \notin V^y$. Семейство $\{x_U\}_{U \in \Omega_x}$ — направленность, сходящаяся к x в силу примера 1.17. Но направленность $F(x_U)$ не сходится к y , противоречие. \square

Определим для направленностей понятие поднаправленности, являющееся аналогом подпоследовательности. В случае \mathbb{N} подпоследовательность y_i последовательности x_n во множестве X задается с помощью строго монотонно возрастающей функции $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ так: $y_i = x_{h(i)}$. Иными словами, если последовательность x_n — это отображение $x: \mathbb{N} \rightarrow X$, то подпоследовательность $y: \mathbb{N} \rightarrow X$ равна композиции $x \circ h$. Фактически, мы выбираем бесконечное подмножество в \mathbb{N} и ограничиваем x на это подмножество, нумеруя при этом последовательные элементы последовательными натуральными числами.

В случае направленности $\{x_s\}_{s \in S}$ можно было бы поступить аналогично, а именно, выбрать произвольное подмножество $T \subset S$, индуцировать на нем частичный порядок, и рассмотреть соответствующее семейство

$\{x_t\}_{t \in T}$. Однако теперь мы можем столкнуться с рядом трудностей. Во-первых, T может перестать быть направленным (например, все элементы T могут оказаться несравнимыми). Во-вторых, даже если T — направленность, такое подмножество может оказаться неадекватным задаче вычисления пределов, ведь нам важно, чтобы в поднаправленности “сыграли” сколь угодно большие элементы. Например, это будет в случае, если S равно объединению двух стандартно упорядоченных множеств натуральных чисел \mathbb{N}_1 и \mathbb{N}_2 , при этом для любых $n_i \in \mathbb{N}_i$ выполняется $n_1 < n_2$, а в качестве T выбрано \mathbb{N}_1 .

Чтобы справиться с последней проблемой, введем понятие конфинального подмножества частично упорядоченного множества. А именно, подмножество T направленного множества S называется **конфинальным**, если для любого $s \in S$ существует $t \in T$ такое, что $t \geq s$. Тем не менее, даже в случае конфинального множества T оно может не оказаться направленным.

Чтобы избежать описанных проблем, ограничимся конфинальными подмножествами, являющимися направленными. Для такого T обозначим $h: T \rightarrow S$ отображение включения. Тогда если $x: S \rightarrow X$ — направленность, то $x \circ h: T \rightarrow X$ будем называть **конфинальной поднаправленностью** в x . Оказывается, и этот класс поднаправленностей обладает рядом недостатков, так что его расширяют, отказываясь выбирать T в качестве подмножества S .

Итак, пусть $x: S \rightarrow X$ — направленность. Тогда каждая ее **поднаправленность** задается **произвольным** направленным множеством T , вообще говоря, не имеющим отношения к S , отображением $h: T \rightarrow S$, сохраняющим порядок и таким, что множество $h(T) \subset S$ конфинально в S . При этом соответствующая поднаправленность — это композиция $x \circ h: T \rightarrow X$.

Замечание 1.21. Понятие поднаправленности и конфинальной поднаправленности оказываются неэквивалентными по отношению к сходимости: ниже мы приведем пример 1.24 направленности, когда ни одна конфинальная поднаправленность не сходится, а вот среди поднаправленностей общего вида имеются сходящиеся.

Напомним, что точка x топологического пространства X называется **точкой накопления последовательности** x_n , если для любой окрестности U точки x и любого n_0 существует $n \geq n_0$ такое, что $x_n \in U$. Аналогичное определение имеет место для направленности $\{x_s\}_{s \in S}$. А именно, точка $x \in X$ является **точкой накопления направленности** $\{x_s\}_{s \in S}$, если для любой окрестности U точки x и любого $s_0 \in S$ существует $s \geq s_0$ такое, что $x_s \in U$.

Теорема 1.22. Точка x топологического пространства X является точкой накопления направленности $\{x_s\}_{s \in S}$, если и только если в этой направленности существует поднаправленность $\{y_t\}_{t \in T}$, сходящаяся к x .

Замечание 1.23. Ниже мы покажем, что если в качестве поднаправленностей выбирать лишь конфинальные, то теорема 1.22 перестает быть верной.

Доказательство теоремы 1.22. Пусть сначала $\{x_s\}_{s \in S}$ — направленность в X , у которой некоторая поднаправленность $\{y_t\}_{t \in T}$, $h: T \rightarrow S$, $y_t = x_{h(t)}$ сходится к точке $x \in X$. Тогда для каждой окрестности U точки x существует $t_0 \in T$ такое, что для каждого $t \in T$, $t \geq t_0$ выполняется $x_{h(t)} \in U$.

Выберем теперь произвольное $s_0 \in S$. Мы должны показать, что существует $s \in S$, $s \geq s_0$, для которого $x_s \in U$. Так как $h(T)$ конфинально в S , существует $t_0 \in T$ такое, что $h(t_0) \geq s_0$. По сказанному выше, существует $t'_0 \in T$ такое, что для всех $t \in T$, $t \geq t'_0$ выполняется $x_{h(t)} \in U$. Так как T — направленное множество, существует $t \in T$, $t \geq \max\{t_0, t'_0\}$. Положим $s = h(t)$, тогда $x_s \in U$, и так как отображение h сохраняет порядок, то $s = h(t) \geq h(t_0) \geq s_0$, что и требовалось.

Обратно, предположим, что точка $x \in X$ является точкой накопления для направленности $\{x_s\}_{s \in S}$. Рассмотрим множество T , составленное из всех пар (U, s) , где $U \in \Omega_x$ — окрестность x , и $s \in S$ такова, что $x_s \in U$. Введем на T порядок произведения из конструкции 1.18. Тогда отображение $h: T \rightarrow S$, $h: (U, s) \mapsto s$ сохраняет порядок. Кроме того, $h(T)$ конфинально. Действительно, для каждого s_0 имеем $h((X, s_0)) = s_0 \geq s_0$. Таким образом, $y_t = x_{h(t)}$ — поднаправленность. Покажем, что эта поднаправленность сходится к x .

Действительно, рассмотрим произвольную окрестность $U \in \Omega_x$. По условию, существует $s_0 \in S$ такое, что $x_{s_0} \in U$. Пусть $t_0 = (U, s_0)$. Тогда все $t = (V, s) \in T$ такие, что $t \geq t_0$, удовлетворяют $V \in \Omega_x$, $V \subset U$, $s \geq s_0$, $s = h(t)$, $x_s \in V$. Следовательно, для каждого такого t имеем $y_t = x_{h(t)} = x_s \in U$, что и доказывает сходимость направленности y_t к x . \square

Пример 1.24. Обозначим ω первый счетный ординал, а ω_1 — первый несчетный ординал. Для каждого ординала α на отрезке $[0, \alpha]$, состоящем из всех ординалов β , $0 \leq \beta \leq \alpha$, определена порядковая топология, т.е. интервалы $(a, b) = \{c: a < c < b\}$ и полуинтервалы $[0, a)$ и $(a, \alpha]$ образуют базу. **Плоскостью Тихонова** называется декартово произведение отрезков $P := [0, \omega_1] \times [0, \omega]$, наделенное топологией произведения. Положим $p = (\omega_1, \omega)$.

Рассмотрим теперь линейно упорядоченное множество S , полученное из $[0, \omega_1) \times [0, \omega) \subset P$ введением лексикографического порядка: $(\alpha, m) \leq (\beta, n)$, если или $\alpha < \beta$, или $\alpha = \beta$ и $m \leq n$. Ясно, что S — направленное множество. Пусть $x: S \rightarrow P$ — включение, тогда x — направленность в P . Покажем, что p — точка накопления направленности x .

Выберем произвольную окрестность U точки p . По определению порядковой топологии, существуют $\alpha_0 \in [0, \omega_1)$ и $n_0 \in [0, \omega)$ такие, что все точки (α, n) , где $\alpha > \alpha_0$ и $n > n_0$ содержатся в U . Выберем произвольную точку $(\beta, m) \in S$ и положим $\alpha = \max(\beta, \alpha_0 + 1)$ и $n = \max(m, n_0 + 1)$, тогда $(\alpha, n) \geq (\beta, m)$ в S , и $(\alpha, n) \in U$. Таким образом, p — точка накопления направленности x . Отметим, что, в силу теоремы 1.22, существует поднаправленность в x , сходящаяся к p .

Покажем теперь, что никакая конфинальная поднаправленность в x не сходится к p . Пусть $T \subset S$ — произвольное конфинальное подмножество. Для каждого $n \in [0, \omega)$ положим $T_n = T \cap ([0, \omega_1) \times \{n\})$ и покажем, что конфинальность T в S влечет несчетность одного из T_n . Действительно, если все T_n счетны, то для каждого $n \in [0, \omega_1)$ есть элемент q_n такой, что $T_n < (q_n, n)$. Множество всех таких q_n также счетно, поэтому в $[0, \omega_1)$ есть элемент q такой, что $q > q_n$ при всех n . Последнее означает, что для $(q, 0)$ в T нет элемента, больше или равного $(q, 0)$, противоречие с конфинальностью T .

Итак, пусть T_m несчетно. Тогда T_m конфинально в T . Действительно, если это не так, то существует $t_0 = (\alpha_0, n_0) \in T$ такой, что для всех $t = (\alpha, m) \in T_m$ выполняется $t < t_0$, т.е. или $\alpha < \alpha_0$, или $\alpha = \alpha_0$, но $m < n_0$. В любом случае, $\alpha \leq \alpha_0$, поэтому T_m счетно.

Рассмотрим теперь окрестность U точки p , состоящую из всех (α, n) , где $n \geq m + 1$. Тогда T_m не пересекает U , и так как T_m конфинально в T , для каждого $t_0 \in T$ существует $t \in T_m$, $t \geq t_0$, но тогда $x_t \notin U$, так что конфинальная поднаправленность $\{x_t\}_{t \in T}$ не сходится к p . Что и требовалось.

Теорема 1.25. *Топологическое пространство X компактно, если и только если у каждой направленности имеется сходящаяся поднаправленность.*

Доказательство. Напомним, что семейство подмножеств $\{F_\alpha\}_{\alpha \in A}$ множества X называется **центрированным**, если каждое конечное непустое подсемейство имеет непустое пересечение. Хорошо известно (см. например [1]), что компактность топологического пространства X эквивалентна следующему условию: всякая центрированная система замкнутых подмножеств X имеет непустое пересечение. Перейдем к доказательству теоремы.

Предположим сначала, что пространство X компактно, и пусть $x: S \rightarrow X$ — произвольная направленность в X . Для каждого $s \in S$ положим $A_s = \{x_t : t \in S, t \geq s\}$. Легко видеть, что для каждого конечного набора $s_1, \dots, s_k \in S$ существует общая мажоранта s , поэтому каждый конечный набор A_{s_1}, \dots, A_{s_k} имеет непустое пересечение, так как, например, содержит эту общую мажоранту s . Тем самым, система $\{A_s\}_{s \in S}$ — центрированная. Положим $F_s = \bar{A}_s$. Тогда $\{F_s\}$ — центрированная система замкнутых подмножеств X . По цитированной выше теореме, компактность пространства X влечет наличие общей точки p у всех F_s .

Покажем, что p является точкой накопления направленности x . Рассмотрим произвольную окрестность U точки p и выберем произвольное $s_0 \in S$. Так как $p \in F_{s_0}$ и $F_{s_0} = \bar{A}_{s_0}$, то $U \cap A_{s_0} \neq \emptyset$. Пусть $x_s \in U \cap A_{s_0}$, тогда $s \geq s_0$, а это означает, в силу произвольности U и s_0 , что p — точка накопления для направленности x . По теореме 1.22, у направленности x есть поднаправленность, сходящаяся к p . Таким образом, мы доказали, что компактность влечет наличие сходящейся поднаправленности у каждой направленности.

Докажем теперь обратное. Пусть у каждой направленности имеется сходящаяся поднаправленность. Рассмотрим произвольное центрированное семейство F замкнутых подмножеств X . Дополним F пересечениями всевозможных непустых конечных подсемейств в F . Полученное семейство S также будет центрированным, и если мы покажем, что $\bigcap S \neq \emptyset$, то и $\bigcap F \neq \emptyset$ также будет верным.

Так как пересечение любых двух элементов из S также принадлежит S , то семейство S , вместе с частичным порядком, заданным обратным включением, является направленным множеством (пересечение пары элементов — их общая мажоранта). Выберем в каждом $s \in S$ произвольный элемент x_s , тогда $x: s \mapsto x_s$ — направленность. По предположению, эта направленность имеет поднаправленность, сходящуюся к некоторой точке $p \in X$. По теореме 1.22, точка p является точкой накопления для направленности x . Выберем любое $s_0 \in S$, тогда для каждой окрестности U точки p существует $s \geq s_0$, для которого $x_s \in U$. Отметим, что $x_s \in s \subset s_0$, таким образом p — точка прикосновения s_0 . Так как множество $s_0 \subset X$ замкнуто, то $p \in s_0$. Таким образом, p содержится во всех $s_0 \in S$, так что $\bigcap S \neq \emptyset$, откуда $\bigcap F \neq \emptyset$. По цитированной выше теореме, это влечет компактность X . \square

Замечание 1.26. Для метрических пространств X компактность равносильна возможности выбрать в каждой последовательности сходящуюся подпоследовательность. Отметим, что доказательство этого факта намного сложнее, чем приведенное доказательство теоремы 1.25.

Замечание 1.27. В терминах направленностей существенно легче доказывается теорема Тихонова о компактности декартова произведения любого семейства компактов, если это произведение наделяется тихоновской топологией. Также несложно получить доказательство приводимой ниже теоремы Алаоглу.

1.3 Слабая топология

Кроме сильной, на E и E^* имеются и другие естественные топологии. Напомним важную топологическую конструкцию. Пусть X — множество, $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — семейство топологических пространств, и \mathcal{F} — семейство отображений $\{f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha\}_{\alpha \in A}$. Тогда на X определена самая слабая топология, в которой все отображения $f_\alpha \in \mathcal{F}$ непрерывны. Эта топология называется \mathcal{F} -слабой или *слабой для \mathcal{F}* . Ее предбазой являются прообразы всевозможных открытых подмножеств пространств Y_α при всевозможных отображениях $f_\alpha \in \mathcal{F}$, а базой — всевозможные конечные пересечения таких прообразов.

Пример 1.28. Топология на декартовом произведении $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ — это \mathcal{F} -слабая топология для семейства \mathcal{F} всех проекций $f_\alpha: X \rightarrow X_\alpha$.

Описанная только что конструкция позволяет определить *слабую топологию на нормированном пространстве E* , для которой в качестве \mathcal{F} рассматривается семейство E^* всех непрерывных (в сильной топологии) функционалов. Заменяя E на E^* , а E^* — на $E^{**} = (E^*)^*$, мы определим также *слабую топологию на E^** .

Чтобы различать сходимость последовательности точек x_n банахова пространства E к точке $x \in E$ в сильной и слабой топологии, первую сходимость будем обозначать $x_n \rightarrow x$, а вторую — через $x_n \rightharpoonup x$. Аналогичные обозначения будем использовать и для направленностей. В следующей теореме мы собрали утверждения, относящиеся к слабой сходимости на банаховом пространстве E . Их доказательства см. в [15]. Аналогичные результаты имеют место и для пространства E^* .

Теорема 1.29. Пусть E — банахово пространство, x_n и f_n — последовательности в E и E^* соответственно, $\{x_s\}_{s \in S}$ и $\{f_s\}_{s \in S}$ — направленности в E и E^* соответственно, $x \in E$, $f \in E^*$. Имеют место следующие утверждения.

- (1) Слабая топология на E хаусдорфова.
- (2) $x_s \rightharpoonup x$, если и только если $f(x_s) \rightarrow f(x)$ при всех $f \in E^*$.
- (3) Если $x_n \rightharpoonup x$, то $x_n \rightarrow x$, т.е. сильная сходимость влечет слабую.
- (4) Если $x_n \rightharpoonup x$, то множество чисел $\{\|x_n\|\}$ ограничено и $\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$.
- (5) Если $x_n \rightharpoonup x$ и $f_n \rightarrow f$, то $f_n(x_n) \rightarrow f(x)$.
- (6) В конечномерном E сильная и слабая топологии совпадают.
- (7) В бесконечномерном E сфера никогда не замкнута в слабой топологии, а открытый шар никогда не является открытым с слабой топологии (так как каждое открытое множество содержит некоторую аффинную гиперплоскость, т.е. множество вида $\{x \in E : \varphi(x) = \text{const}\}$, где $\varphi: E \rightarrow \mathbb{F}$ — линейное отображение).
- (8) В бесконечномерном E слабая топология всегда строго слабее сильной (слабая топология содержится в сильной и отлична от нее). Это вытекает из предыдущего пункта.
- (9) В ℓ_1 последовательность сходится в сильной топологии, если и только если она сходится в слабой топологии. В частности, слабая топология в ℓ_1 не метризуема (если бы слабая топология была метризуемой, то тождественное отображение оказалось бы гомеоморфизмом, но это противоречит предыдущему пункту).
- (10) Если F — еще одно банахово пространство, и $L: E \rightarrow F$ — линейное отображение, то L непрерывно относительно сильных топологий, если и только если оно непрерывно относительно слабых топологий.
- (11) Выпуклое и замкнутое в сильной топологии подмножество банахова пространства является также замкнутым в слабой топологии.

Задача 1.30. Выясните, какие пункты из теоремы 1.29 можно переформулировать в терминах направленностей.

1.4 *-слабая топология

Итак, на сопряженном пространстве E^* к нормированному пространству E мы определили две топологии: сильную и слабую. Отметим, что слабая топология на E^* получается максимальным ослаблением сильной до топологии, в которой все функционалы из E^{**} (непрерывные в сильной топологии) оставались бы непрерывными. Сейчас мы сделаем еще большее ослабление.

Напомним, что для каждого $x \in E$ мы определили функцию $J_x: E^* \rightarrow \mathbb{F}$, положив $J_x(f) = f(x)$, и показали, что J_x лежит в E^{**} , тем самым, построив отображение $J: E \rightarrow E^{**}$, $J: x \mapsto J_x$. Отметим, что $J(E) \subset E^{**}$, вообще говоря, не совпадает с E^{**} , поэтому самая слабая топология на E^* , в которой все еще непрерывны функционалы из $J(E)$, еще слабее, чем слабая топология на E^* . Построенная таким образом топология называется ***-слабой**.

Чтобы отличать сходимость последовательности функционалов $f_n \in E^*$ к функционалу $f \in E^*$ в *-слабой топологии, эту сходимость будем обозначать $f_n \xrightarrow{*} f$. Аналогичные обозначения будем использовать и для направленностей.

Теорема 1.31. Пусть E — банахово пространство, x_n и f_n — последовательности в E и E^* соответственно, $\{x_s\}_{s \in S}$ и $\{f_s\}_{s \in S}$ — направленности в E и E^* соответственно, $x \in E$, $f \in E^*$. Имеют место следующие утверждения.

- (1) *-слабая топология на E^* хаусдорфова.
- (2) $f_s \xrightarrow{*} f$, если и только если $f_s(x) \rightarrow f(x)$ для всех $x \in E$.
- (3) Имеют место импликации $f_n \rightarrow f \Rightarrow f_n \rightharpoonup f \Rightarrow f_n \xrightarrow{*} f$.
- (4) Если $f_n \xrightarrow{*} f$ и $x_n \rightarrow x$, то $f_n(x_n) \rightarrow f(x)$.
- (5) В конечномерном E сильная, слабая и *-слабая топологии на E^* совпадают.
- (6) **Гиперплоскостью в E^*** назовем каждое множество $\{f \in E^* : \varphi(f) = \text{const}\}$, где $\varphi: E^* \rightarrow \mathbb{F}$ — линейное отображение. Тогда гиперплоскость в E^* замкнута в *-слабой топологии, если и только если $\varphi = J_x$ для некоторого $x \in E$.
- (7) Для бесконечномерного нереклексивного E всегда *-слабая топология на E^* строго слабее слабой (*-слабая топология содержится в слабой топологии и отлична от нее), что мгновенно следует из предыдущего пункта. Для рефлексивного E слабая и *-слабая топологии совпадают.
- (8) Пусть B и B^{**} — замкнутые единичные шары с центром в нуле в пространствах E и E^{**} соответственно, а $J: E \rightarrow E^{**}$ — построенное выше изометричное линейное вложение. Тогда если пространство E рефлексивно, то $J(B) = B^{**}$, а если нет, то $J(B)$ — замкнутое собственное неплотное подмножество B^{**} относительно сильной топологии, но *-слабое замыкание $J(B)$ совпадает с B^{**} , т.е. $J(B)$ всюду плотно в B^{**} в *-слабой топологии.
- (9) Множество $J(E)$ совпадает с множеством всех линейных функционалов на E^* , являющихся непрерывными в *-слабой топологии. Иными словами, для каждого линейного функционала $\varphi: E^* \rightarrow \mathbb{F}$, непрерывного в *-слабой топологии, существует $x \in E$ такой, что $\varphi = J_x$.

Задача 1.32. Выясните, какие пункты из теоремы 1.31 можно переформулировать в терминах направленностей.

Ослабляя топологию, можно добиться того, что некоторые подмножества, не являвшиеся компактными, превратились в компактные. Именно это имеет место в случае со *-слабой топологией.

Теорема 1.33 (Банах–Алаоглу). Пусть E — банахово пространство и $B^* \subset E^*$ — замкнутый единичный шар с центром в нуле. Тогда B^* компактен в *-слабой топологии. Более того, если E сепарабельно, то *-слабая топология на B^* метризуема.

Замечание 1.34. Компактность шара B^* еще не означает, что из любой последовательности в B^* можно выделить сходящуюся подпоследовательность (секвенциальная компактность). А в общем случае эти два понятия не вытекают одно из другого. Тем не менее, для метрических пространств компактность и секвенциальная компактность равносильны. Поэтому важной составляющей многих доказательств является обсуждение метризуемости компакта B^* . Ниже мы приведем некоторые утверждения такого типа.

Сформулируем еще ряд результатов о рефлексивных пространствах.

1.5 Рефлексивные пространства

Следующая теорема устанавливает связь между рефлексивностью и компактностью единичного шара.

Теорема 1.35. *Банахово пространство E рефлексивно, если и только если замкнутый единичный шар $B \subset E$ компактен в слабой топологии.*

Задача 1.36. Докажите следующие утверждения.

- Замкнутое подпространство рефлексивного банахова пространства само рефлексивно.
- Банахово пространство E рефлексивно, если и только если E^* рефлексивно.
- Выпуклое ограниченное и замкнутое в сильной топологии подмножество рефлексивного пространства компактно в слабой топологии.

1.6 Сепарабельные пространства

Напомним, что топологическое пространство называется *сепарабельным*, если оно содержит счетное всюду плотное подмножество. В случае произвольных топологических пространств, сепарабельность, вообще говоря, не наследуется подмножествами. Стандартным примером является плоскость Зоргенфрея, полученная как декартово произведение вещественной прямой с топологией, база которой — полуинтервалы вида $[a, b)$. Легко видеть, что плоскость Зоргенфрея сепарабельна (множество всех рациональных точек всюду плотно), однако, если x, y — координаты на плоскости Зоргенфрея, то множество $y = -x$ наследует дискретную топологию, поэтому не сепарабельно. Для метрических пространств сепарабельность наследуется подмножествами.

В теории банаховых пространств сепарабельность тоже проявляется необычным образом. А именно, имеет место следующий результат.

Предложение 1.37. *Если E — банахово пространство, у которого пространство E^* сепарабельно, то E также сепарабельно. Обратное утверждение не имеет места. Например, пусть $E = \ell_1$, тогда $E^* = \ell_\infty$. Хотя пространство ℓ_1 сепарабельно, пространство ℓ_∞ — нет.*

Оказывается, если к сепарабельности добавить рефлексивность, то аналог предыдущего предложения превратится в критерий.

Следствие 1.38. *Пусть E — банахово пространство. Тогда E — рефлексивно и сепарабельно, если и только если E^* — рефлексивно и сепарабельно.*

В следующем утверждении демонстрируется, что сепарабельность может быть тесно связана с метризуемостью.

Теорема 1.39. *Пусть E — банахово пространство и $B^* \subset E^*$ — замкнутый единичный шар. Тогда пространство E сепарабельно, если и только если шар B^* со $*$ -слабой топологией метризуем.*

Следствие 1.40. *Пусть E — сепарабельное банахово пространство, тогда каждая ограниченная последовательность в E^* содержит $*$ -слабо сходящуюся подпоследовательность.*

В следующем результате сепарабельность появляется лишь в доказательстве (которое мы не приводим).

Теорема 1.41. *Пусть E — рефлексивное банахово пространство. Тогда каждая ограниченная последовательность в E содержит слабо сходящуюся подпоследовательность.*

1.7 Равномерная выпуклость

Вводимое здесь понятие тесно связано с рефлексивностью. Неформально оно означает, что середина каждого отрезка, лежащего в шаре, находится достаточно далеко от границы шара. Приведем формальное определение.

Линейное нормированное пространство E называется *равномерно выпуклым*, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любых $x, y \in E$, $\|x\| \leq 1$, $\|y\| \leq 1$, $\|x - y\| > \varepsilon$ выполняется $\|(x + y)/2\| < 1 - \delta$.

Приведем примеры пространств, являющихся и не являющихся равномерно выпуклыми. Обозначим ℓ_p^n пространство \mathbb{R}^n с нормой из ℓ_p (мы рассматриваем \mathbb{R}^n как подпространство в ℓ_p , состоящее из всех последовательностей, в которых все члены, начиная с $(n + 1)$ -го, равны нулю). Тогда

- $\ell_1^n, \ell_\infty^n, \ell_1$ и ℓ_∞ не являются равномерно выпуклыми (границы их единичных шаров содержат уплощения);
- все остальные пространства ℓ_p^n и ℓ_p , т.е. при $1 < p < \infty$, — равномерно выпуклы.

Теорема 1.42. Каждое равномерно выпуклое банахово пространство рефлексивно.

Замечание 1.43. Обратное утверждение к теореме 1.42 не имеет места. Действительно, ℓ_1^n рефлексивно, но не равномерно выпукло.

В равномерно выпуклых пространствах слабая сходимость влечет сильную сходимость.

Предложение 1.44. Пусть E — равномерно выпуклое банахово пространство, $x_n, x \in E$, $n \in \mathbb{N}$. Предположим, что $x_n \rightharpoonup x$ и $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \leq \|x\|$. Тогда $x_n \rightarrow x$.

1.8 Гильбертовы пространства

Напомним, что *гильбертовыми пространствами* называются банаховы пространства, у которых норма задается скалярным произведением. Скалярное произведение $\langle x, y \rangle$ линейно по первому аргументу и симметрично в следующем смысле: $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$, где черта над числом обозначает комплексное сопряжение (если $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, то симметричность означает, что $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$). Таким образом, в случае $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ скалярное произведение линейно и по второму аргументу, т.е. оно *билинейно*. В случае же $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ скалярное произведение (часто называемое *эрмитовым произведением*) *сопряженно линейно* по второму аргументу: $\langle x, ay + bz \rangle = \bar{a}\langle x, y \rangle + \bar{b}\langle x, z \rangle$, поэтому говорят, что такое произведение *полуторалинейно*. При этом, в обоих случаях требуется, чтобы $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$.

Приведем примеры гильбертовых пространств.

- Пространство ℓ_2^n со скалярным произведением

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k \bar{y}_k,$$

где $x = (x_1, \dots, x_n)$ и $y = (y_1, \dots, y_n)$.

- Пространство ℓ_2 со скалярным произведением

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \bar{y}_k,$$

где $x = (x_1, x_2, \dots)$ и $y = (y_1, y_2, \dots)$.

- Пространство $L_2(\mu)$ со скалярным произведением

$$\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} d\mu.$$

Для того, чтобы нормированное пространство E являлось гильбертовым, необходимо и достаточно выполнения *тождества параллелограмма*: $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$ для любых $x, y \in E$ (сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех сторон параллелограмма).

Задача 1.45. Покажите, что $C[-1, 1]$ с нормой $\|\cdot\|_\infty$ нельзя превратить в гильбертово пространство.

Теорема 1.46. Каждое гильбертово пространство равномерно выпукло и поэтому рефлексивно.

Теорема 1.47 (Ф. Рисс). Пусть H — гильбертово пространство и $\varphi \in H^*$. Тогда существует единственный $y \in H$, для которого $\varphi(x) = \langle x, y \rangle$ при всех $x \in H$. При этом $\|\varphi\| = \|y\|$.

Для каждого x из гильбертова пространства H положим $f_x(y) = \langle y, x \rangle$, тогда $f_x \in H^*$ и, по теореме Рисса, все элементы из H^* могут быть получены таким способом. Положим $\langle f_x, f_y \rangle_* = \langle y, x \rangle$. Легко проверяется, что эта операция на H^* является скалярным произведением, причем $\|f_x\|^2 = \langle f_x, f_x \rangle_* = \|x\|^2$. Тем самым, мы

превратили H^* в гильбертово пространство (напомним, что двойственное пространство каждого нормированного является банаховым, задача 1.9). Аналогично гильбертовым становится пространство H^{**} . Таким образом, определены два отображения из H в H^{**} : первое $x \mapsto J_x$, построенное выше, а второе $x \mapsto f_{f_x}$, построенное только что. Несложно проверить, что эти отображения совпадают. Действительно, для каждого $\varphi = f_y \in H^*$ имеем

$$f_{f_x}(\varphi) = f_{f_x}(f_y) = \langle f_y, f_x \rangle_* = \langle x, y \rangle = f_y(x) = \varphi(x) = J_x(\varphi).$$

Замечание 1.48. По теореме 1.47, отображение $y \mapsto f_y$ является изометрией между H и H^* . В случае вещественного H эта изометрия линейна, а в случае комплексного — сопряженно линейна.

Пусть теперь $A \in \mathcal{B}(H)$ — ограниченный линейный оператор. Тогда для любого $y \in H$ отображение $\varphi: x \mapsto \langle A(x), y \rangle$ — непрерывный линейный функционал на H . По теореме 1.47, в H существует единственный вектор, который мы обозначим через $A^*(y)$, такой, что $\varphi(x) = \langle x, A^*(y) \rangle$. Иными словами, мы построили отображение $A^*: H \rightarrow H$, для которого

$$\langle x, A^*(y) \rangle = \langle A(x), y \rangle$$

при всех $x, y \in H$. Из этой формулы видно, что A^* — непрерывный линейный оператор, который называется **сопряженным** с A .

Задача 1.49. Пусть H — гильбертово пространство, $A, A_1, A_2 \in \mathcal{B}(H)$ и $a \in \mathbb{F}$. Докажите, что

- (1) $\|A\| = \|A^*\|$;
- (2) $\|A^*A\| = \|A\|^2$;
- (3) $A^{**} = A$;
- (4) $(A_1 + A_2)^* = A_1^* + A_2^*$;
- (5) $(A_1A_2)^* = A_2^*A_1^*$;
- (6) $(aA)^* = \bar{a}A^*$.

Таким образом, для гильбертова пространства H банахова алгебра $\mathcal{B}(H)$ его непрерывных линейных операторов обладает еще одной операцией, а именно, инволюцией $A \mapsto A^*$, удовлетворяющей свойствам из задачи 1.49. Такая банахова алгебра является примером C^* -алгебр, которые мы будем изучать в дальнейшем. Отметим также, что для хаусдорфова локально компактного пространства X банахова алгебра $C_0(X)$ с операцией сопряжения также представляет собой пример C^* -алгебры. При этом последняя алгебра коммутативна, а первая — некоммутативна. Оказывается, все C^* -алгебры исчерпываются в некоммутативном случае подалгебрами в $\mathcal{B}(H)$, замкнутыми относительно сильной топологии и инволюции, а в коммутативном — совпадают с $C_0(X)$ для соответствующих хаусдорфовых локально-компактных пространств.

Тема 2

Банаховы алгебры

План. Алгебра, унитарная алгебра, единица унитарной алгебры, подалгебра; подалгебра, порожденная данным подмножеством; субмультипликативность, нормированная алгебра, нормированная унитарная алгебра; замкнутая подалгебра нормированной алгебры, порожденная данным подмножеством; банахова алгебра, унитарная банахова алгебра; банахова подалгебра, порожденная данным подмножеством; примеры банаховых алгебр, прямая сумма семейства банаховых алгебр, ограниченная сумма семейства банаховых алгебр, теорема Вейерштрасса–Стоуна (компактная и локально-компактная версии); левый, правый и (двусторонний) идеалы алгебры; тривиальный идеал, собственный идеал, факторалгебра, модулярный идеал, связь модулярности идеала с унитарностью факторалгебры, свойства модулярных идеалов; идеал, порожденный данным подмножеством алгебры; замкнутый идеал, порожденный данным подмножеством нормированной алгебры; фактор нормированной алгебры по замкнутому идеалу; гомоморфизм алгебр, нулевой гомоморфизм, унитарный гомоморфизм унитарных алгебр, примеры гомоморфизмов, унитализация алгебры, канонический гомоморфизм, свойства унитализации, унитализация нормированной алгебры, обратимые элементы унитарной алгебры, мультипликативная группа обратимых элементов унитарной алгебры, резольвентное множество, спектр элемента унитарной алгебры, примеры вычисления спектров, свойства обратимых и необратимых элементов, свойства спектров элементов унитарной алгебры, унитарные банаховы алгебры; сумма геометрической прогрессии элемента, оценка частичной суммы этой прогрессии, норма которого меньше 1; открытость множества обратимых элементов унитарной банаховой алгебры и дифференцируемость отображения перехода к обратному элементу, компактность спектра элемента унитарной банаховой алгебры, непустота спектра (теорема Гельфанда); теорема Гельфанда–Мазура об унитарной банаховой алгебре, все элементы которой обратимы; спектральный радиус элемента унитарной алгебры, свойства спектрального радиуса, примеры вычисления спектрального радиуса, теорема Бёрлинга о вычислении спектрального радиуса, пример использования теоремы Бёрлинга, спектры элементов содержащей единицу замкнутой подалгебры унитарной банаховой алгебры, спектры и спектральные радиусы элементов неунитарной алгебры, экспоненты элементов унитарной банаховой алгебры, модулярные идеалы банаховой алгебры, их замыкания, максимальные модулярные идеалы, характеры коммутативной алгебры, их свойства, связь со спектром, непрерывность характеров коммутативной банаховой алгебры, их связь с максимальными идеалами, характеры коммутативной алгебры и ее унитализации, связь между характерами и спектрами элементов коммутативной банаховой алгебры, топология пространства характеров коммутативной банаховой алгебры, пространство характеров банаховой алгебры непрерывных функций, заданных на компактном хаусдорфовом топологическом пространстве, отождествление пространства характеров коммутативной банаховой алгебры с подпространством в пространстве характеров ее унитализации, преобразования Гельфанда, представление Гельфанда коммутативной банаховой алгебры, согласованность преобразований Гельфанда элементов унитализации коммутативной банаховой алгебры с отождествлениями, радикал алгебры, квазинильпотентные элементы, полупростая алгебра, применение представления Гельфанда для доказательства свойств спектрального радиуса, отсутствие субаддитивности и субмультипликативности спектрального радиуса в общем случае; гомеоморфность пространства характеров унитарной банаховой алгебры, порожденной одним элементом, со спектром этого элемента; гомеоморфность пространства характеров неунитарной банаховой алгебры, порожденной одним элементом, со спектром этого элемента, из которого выкинут 0.

Начнем с определения разных типов алгебр и более детально обсудим так называемые банаховы алгебры. Содержание этого раздела является базой теории C^* -алгебр, к которой мы обратимся в следующих лекциях. Для более детального изучения материала мы рекомендуем монографию [16]. Впрочем, многие излагаемые там факты приводятся без доказательств и пояснений. В наших лекциях мы постарались заполнить эти пробелы.

В дальнейшем, мы будем иметь дело лишь с алгебрами над полем \mathbb{C} , не оговаривая это каждый раз.

2.1 Элементы теории алгебр

Напомним сначала определение алгебры.

2.1.1 Алгебра, унитарная алгебра

Алгебра A — это векторное пространство с билинейным ассоциативным умножением: для любых $a, b, c \in A$ и $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ имеем

$$(a, b) \mapsto ab, \quad (\lambda a + \mu b, c) = \lambda ac + \mu bc, \quad (c, \lambda a + \mu b) = \lambda ca + \mu cb, \quad a(bc) = (ab)c.$$

Если в алгебре A есть **единица**, т.е. элемент $1 \in A$, для которого $a1 = 1a = a$ для всех $a \in A$, то A называется **унитарной алгеброй**. Разумеется, единица в унитарной алгебре единственна.

Подалгебра B алгебры A — это линейное подпространство, замкнутое относительно умножения: для любых $a, b \in B$ выполняется $ab \in B$. Таким образом, подалгебра сама является алгеброй.

Пересечение произвольного семейства подалгебр снова является подалгеброй. В частности, если $S \subset A$ — произвольное подмножество, то пересечение всех подалгебр в A , содержащих S , называется **подалгеброй, порожденной S** .

Пример 2.1. Пусть $S = \{a\}$ — одноэлементное подмножество алгебры A . Тогда подалгебра $B \subset A$, порожденная S , является линейной оболочкой всех степеней a^n , $n \in \mathbb{N}$.

2.1.2 Нормированные и унитарные нормированные алгебры

Пусть на алгебре A задана норма $\|\cdot\|$. Эта норма называется **субмультипликативной**, если для любых $a, b \in A$ выполняется $\|ab\| \leq \|a\| \|b\|$. Алгебра с субмультипликативной нормой называется **нормированной**. **Унитарной нормированной алгеброй** называется нормированная алгебра, содержащая единицу 1 , причем $\|1\| = 1$.

Замечание 2.2. Всякая подалгебра нормированной алгебры сама является нормированной алгеброй.

Задача 2.3. Убедитесь, что замыкание нормированной подалгебры — также нормированная подалгебра.

Замечание 2.4. Выше мы определили понятие подалгебры алгебры A , порожденной ее подмножеством S . В случае, когда A — нормированная алгебра, определено понятие **замкнутой подалгебры $C \subset A$, порожденной S** . По определению, C — наименьшая замкнутая подалгебра, содержащая S (напомним, что пересечение любого набора замкнутых множеств замкнуто, поэтому пересечение замкнутых подалгебр — замкнутая подалгебра). Отметим, что если B — подалгебра, порожденная S , то $C = \bar{B}$, так как замыкание пересечения равно пересечению замыканий.

Замечание 2.5. Из субмультипликативности нормы вытекает, что умножение в нормированной алгебре непрерывно. Это мгновенно следует из неравенства

$$\|ab - a'b'\| = \|ab - ab' + ab' - a'b' + a'b' - a'b'\| \leq \|a(b - b')\| + \|(a - a')b'\| \leq \|a\| \|b - b'\| + \|a - a'\| \|b'\|.$$

2.1.3 Банаховы алгебры

Полная нормированная алгебра называется **банаховой**, а полная унитарная нормированная алгебра — **унитарной банаховой алгеброй**.

Замечание 2.6. Отметим, что замкнутая подалгебра банаховой алгебры сама является банаховой алгеброй. Таким образом, для каждого подмножества S банаховой алгебры A пересечение всех замкнутых подалгебр в A , содержащих S , что совпадает с замыканием пересечения всех подалгебр в A , содержащих S , — наименьшая банахова подалгебра A , содержащая S , которая называется **банаховой подалгеброй, порожденной S** .

Следующее простое утверждение будет неоднократно использоваться в дальнейшем.

Предложение 2.7. Пусть A — банахова алгебра и $S \subset A$ состоит из попарно коммутирующих элементов. Тогда банахова подалгебра $B \subset A$, порожденная S , — коммутативна.

Доказательство. Отметим, что семейство $\mathbb{C}[S]$ всевозможных многочленов от всевозможных конечных наборов элементов, содержащихся в S , является подалгеброй в A , порожденной S , так что B — замыкание $\mathbb{C}[S]$. Каждая пара многочленов из $\mathbb{C}[S]$ коммутирует, так как коммутируют все элементы из S .

Пусть a и b — произвольные элементы из B . Так как B — замыкание $\mathbb{C}[S]$, существуют последовательности a_n и b_n элементов из $\mathbb{C}[S]$, сходящиеся в a и b соответственно. Так как умножение в нормированной алгебре непрерывно (замечание 2.5), то $a_n b_n \rightarrow ab$ и $b_n a_n \rightarrow ba$. Но $a_n b_n = b_n a_n$ при всех $n \in \mathbb{N}$, поэтому, в силу единственности предела в нормированном пространстве, имеем $ab = ba$, что и требовалось. \square

Пример 2.8. Приведем примеры банаховых алгебр (сравните с примерами из раздела 1.1):

- алгебра $\mathcal{B}(E)$ ограниченных линейных отображений банахова пространства E в себя, наделенное операторной нормой, в частности, алгебра $M_n(\mathbb{C})$ всех комплексных матриц размера $n \times n$ (эти банаховы алгебры унитарны);

- пространство $\mathcal{B}(S)$ всех ограниченных комплекснозначных функций на множестве S , наделенное суп-нормой (эта банахова алгебра унитарна);
- пространство $C_b(X) \subset \mathcal{B}(X)$ всех непрерывных ограниченных функций на топологическом пространстве X (эта банахова алгебра также унитарна);
- пространство $C(X) \subset \mathcal{B}(X)$ всех непрерывных функций на хаусдорфовом компактном топологическом пространстве X (в этом случае $C(X) = C_b(X)$, так что эта банахова алгебра также унитарна);
- подпространство $C_0(X) \subset C_b(X)$ всех непрерывных функций, заданных на хаусдорфовом локально компактном топологическом пространстве X и *исчезающих (обращающихся в нуль)* на бесконечности (эта банахова алгебра унитарна, если и только если пространство X компактно);
- пространство $m = \ell_\infty$ всех ограниченных последовательностей $a = (a_1, a_2, \dots)$ комплексных чисел с суп-нормой (эта банахова алгебра унитарна);
- замкнутое подпространство c пространства ℓ_∞ , состоящее из всех сходящихся последовательностей;
- замкнутое подпространство c_0 пространства c , состоящее из всех последовательностей, сходящихся к 0;
- подпространство $\mathcal{B}^\infty(\Omega) \subset \mathcal{B}(\Omega)$, состоящее из всех (ограниченных) измеримых функций $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, заданных на измеримом пространстве Ω (эта банахова алгебра унитарна);
- пространство $L^\infty(\mu)$ классов эквивалентности существенно ограниченных комплекснозначных функций с нормой $\|f\|_\infty$ (здесь — существенный супремум функции $|f|$) на измеримом пространстве $(\Omega, \mathcal{S}, \mu)$ с мерой μ (эта банахова алгебра унитарна).

Замечание 2.9. Пространство $L^p(\mu)$, $1 \leq p < \infty$, вообще говоря, не является банаховой алгеброй, поскольку норма может не являться субмультипликативной. Например, пусть $\Omega = [0, a]$, $0 < a < 1$, μ — мера Лебега, $f = g = 1$, тогда $\|f\|_p = \|g\|_p = \|fg\|_p = \sqrt[p]{\int_0^a 1 d\lambda} = a^{1/p}$, откуда $\|fg\|_p = a^{1/p}$, $\|f\|_p \|g\|_p = a^{2/p}$, поэтому $\|fg\|_p > \|f\|_p \|g\|_p$.

Следующая конструкция будет особенно полезна в дальнейшем.

Конструкция 2.10. Пусть $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — произвольное семейство банаховых алгебр. Положим

$$\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \left\{ (a_\lambda) \in \prod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda : \|(a_\lambda)\| := \sup_{\lambda \in \Lambda} \|a_\lambda\| < \infty \right\}.$$

Доказательство следующего утверждения тривиально.

Предложение 2.11. Множество $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ с покомпонентными операциями

$$(a_\lambda) + (b_\lambda) = (a_\lambda + b_\lambda), \quad \mu(a_\lambda) = (\mu a_\lambda), \quad (a_\lambda)(b_\lambda) = (a_\lambda b_\lambda)$$

и определенной выше нормой $(a_\lambda) \mapsto \|(a_\lambda)\|$ является банаховой алгеброй.

Множество $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$, вместе с определенными выше поточечными операциями и нормой, называется *прямой суммой*¹ семейства $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ *банаховых алгебр*.

Следующий объект является модификацией конструкции 2.10.

Конструкция 2.12. Пусть $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — произвольное семейство банаховых алгебр. *Ограниченной суммой*² этого семейства называется множество $B = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda}^{c_0} A_\lambda \subset \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$, состоящее из всех (a_λ) таких, что для каждого $\varepsilon > 0$ множество $\{\lambda \in \Lambda : \|a_\lambda\| > \varepsilon\}$ конечно.

Задача 2.13. Покажите, что $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda}^{c_0} A_\lambda$ является замкнутым идеалом в $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ (определение идеала мы напомним в разделе 2.1.4).

¹Имеется несколько разных определений прямой суммы. Стандартное состоит из всех элементов декартова произведения, у которых все координаты, за исключением конечного числа, равны нулю. Приводимый здесь вариант прямой суммы некоторые авторы называют *ℓ_∞ -прямая сумма*.

²Этот вариант прямой суммы некоторые авторы называют *c_0 -прямая сумма*.

Особую роль в дальнейшем будут играть банаховы алгебры $C(X)$, где X — компактное хаусдорфово топологическое пространство, а также $C_0(X)$, где X — локально компактное хаусдорфово топологическое пространство (см. выше). Знаменитая теорема Вейерштрасса–Стоуна описывает условия, при которых подалгебра этих алгебр является всюду плотной. Имеется много разновидностей теоремы Вейерштрасса–Стоуна. Мы приведем те, которые понадобятся нам.

Теорема 2.14 (Вейерштрасс–Стоун, компактная версия). Пусть X — компактное хаусдорфово топологическое пространство и $A \subset C(X)$ — унитарная подалгебра,

- замкнутая относительно сопряжения (т.е. для каждого $a \in A$ выполняется $\bar{a} \in A$) и
- разделяющая точки (т.е. для любых $x, y \in X$, $x \neq y$ существует $a \in A$ такое, что $a(x) \neq a(y)$).

Тогда A — всюду плотна в $C(X)$.

Теорема 2.15 (Вейерштрасс–Стоун, локально-компактная версия). Пусть X — локально компактное хаусдорфово топологическое пространство и $A \subset C_0(X)$ — подалгебра,

- замкнутая относительно сопряжения,
- разделяющая точки и
- нигде не зануляющаяся (т.е. для любого $x \in X$ существует $a \in A$ такое, что $a(x) \neq 0$).

Тогда A — всюду плотна в $C_0(X)$.

2.1.4 Идеалы, модулярные идеалы

Левым (правым) идеалом I в алгебре A называется векторное подпространство такое, что $AI \subset I$ ($IA \subset I$). Если I одновременно левый и правый идеал, то он называется просто **идеалом**. Ясно, что $\{0\}$ и A — идеалы. Они называются **тривиальными**. Идеал, отличный от A , называется **собственным**. Собственный идеал называется **максимальным**, если он не содержится ни в одном отличном от него собственном идеале. Аналогично определяются максимальные левые и правые идеалы.

Если I — идеал в алгебре A , то на факторпространстве A/I естественным образом определено умножение: $(a+I)(b+I) = ab+I$, превращающее A/I в алгебру, которая называется **факторалгеброй**. Интересный вопрос: для каких идеалов $I \subset A$ алгебра A/I является унитарной? Назовем собственный идеал I **модулярным**, если существует такой элемент $u \in A$, что для всех $a \in A$ выполняется $a - au \in I$ и $a - ua \in I$. При этом u называется **I -модулярным элементом**.

Предложение 2.16. Пусть A — алгебра, а $I \subset A$ — ее собственный идеал. Тогда алгебра A/I унитарна, если и только если идеал I — модулярный. Более того, для модулярного I и любого I -модулярного элемента u класс $u + I$ — единица в A/I .

Доказательство. Пусть I — модулярный идеал. Покажем, что $u + I$ — единица в A/I . Имеем $(a+I)(u+I) = au+I = a+I$, где последнее равенство вытекает из того, что $a - au \in I$. Аналогично, $(u+I)(a+I) = a+I$.

Обратно, пусть A/I — унитарная алгебра, а $u + I$ — единица в A/I . Тогда $(a+I)(u+I) = au+I = a+I$, поэтому $a - au \in I$. Аналогично, $a - ua \in I$. \square

Опишем некоторые свойства модулярных идеалов.

Предложение 2.17. Пусть I — модулярный идеал в алгебре A , а $u \in A$ — соответствующий I -модулярный элемент. Тогда

- (1) $u \notin I$;
- (2) каждый собственный идеал $J \subset A$, содержащий I , также модулярен, и в качестве J -модулярного элемента можно выбрать тот же u ;
- (3) идеал I содержится в некотором максимальном в A идеале (который, в силу предыдущего пункта, также является модулярным);

- (4) если алгебра A унитарна, то все ее собственные идеалы модулярны, так что для каждого собственного идеала $I \subset A$ факторалгебра A/I унитарна и $1 + I$ — ее единица, т.е. $1 \in A$ является I -унитарным элементом для всех таких I ;
- (5) в унитарной алгебре такой, что $0 \neq 1$, множество максимальных идеалов непусто.

Доказательство. (1) Предположим противное, т.е. $u \in I$, и выберем произвольный $a \in A$. Тогда $ua \in I$ в силу того, что I — идеал, и $a - ua \in I$ в силу модулярности I , поэтому $a \in I$, так что $I = A$, противоречие с тем, что I — собственный идеал (по определению модулярного идеала).

(2) Для каждого $a \in A$ выполняется $a - ua \in I \subset J$ и $a - au \in I \subset J$, так что J , будучи собственным, тоже модулярен, а u — один из J -модулярных элементов.

(3) Обозначим \mathcal{M}_I множество всех идеалов в A , содержащих I и не содержащих u . Отметим, что множество \mathcal{M}_I частично упорядочено отношением включения. Рассмотрим произвольную цепочку в \mathcal{M}_I , тогда объединение K ее элементов является собственным идеалом, так как все элементы этой цепочки, а, значит, и K , не содержат u . Таким образом, $K \in \mathcal{M}_I$ и, по лемме Цорна, в \mathcal{M}_I имеется максимальный элемент M . Покажем, что M — максимальный идеал в A . Действительно, если это не так, то существует собственный идеал L , отличный от M и такой, что $L \supset M \supset I$. Но тогда $u \in L$ (иначе $L \in \mathcal{M}_I$, что противоречит максимальнойности M). По пункту (2), идеал L модулярен, а элемент u является L -модулярным. Но, по пункту (1), $u \notin L$, противоречие.

(4) Положим $u = 1$, тогда для каждого идеала $I \subset A$ имеем $a - ua = a - au = 0 \in I$.

(5) Так как $0 \neq 1$ по условию, то $\{0\}$ — собственный идеал. По пункту (4), собственный идеал $\{0\} \subset A$ является модулярным. По пункту (3), идеал $\{0\}$ содержится в некотором идеале, максимальном в A , так что множество максимальных в A идеалов непусто. \square

Пусть $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — семейство идеалов в алгебре A , тогда $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$ — тоже идеал. Таким образом, для каждого $S \subset A$ существует наименьший идеал, содержащий S . Говорят, что такой идеал **порожден** S .

Замечание 2.18. Если A — нормированная алгебра, то замыкание идеала — также идеал. Пересечение всех замкнутых идеалов, содержащих S , — наименьший замкнутый идеал, содержащий S . Такой идеал называется **замкнутым идеалом, порожденным** S . Если I — идеал, порожденный S , то его замыкание совпадает с замкнутым идеалом, порожденным S .

Теорема 2.19. Пусть I — замкнутый идеал в нормированной алгебре A . Тогда на алгебре A/I определена факторнорма

$$\|a + I\| = \inf_{a' \in I} \|a + a'\|,$$

для которой умножение субмультипликативно. Таким образом, A/I — нормированная алгебра.

Доказательство. Для произвольных $a, b \in A$ и любого $\varepsilon > 0$ существуют $a', b' \in I$, для которых выполняется

$$\|a + a'\| < \|a + I\| + \varepsilon, \quad \text{и} \quad \|b + b'\| < \|b + I\| + \varepsilon.$$

Но тогда

$$(\|a + I\| + \varepsilon)(\|b + I\| + \varepsilon) > \|a + a'\| \|b + b'\| \geq \|(a + a')(b + b')\| = \|ab + ab' + a'b + a'b'\| \geq \|ab + I\|,$$

где второе неравенство — следствие того, что алгебра A нормированная, а последнее вытекает из того, что $ab' + a'b + a'b' \in I$. Так как итоговое неравенство выполняется для любого $\varepsilon > 0$, имеем

$$\|a + I\| \|b + I\| \geq \|ab + I\| = \|(a + I)(b + I)\|,$$

так что введенная норма на A/I субмультипликативна и, значит, A/I — нормированная алгебра. \square

2.1.5 Гомоморфизмы алгебр

Гомоморфизмом алгебр $\varphi: A \rightarrow B$ называется всякое линейное отображение, сохраняющее умножение: $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. Множество всех гомоморфизмов из A в B обозначим $\text{Hom}(A, B)$. Так как каждый гомоморфизм $\varphi \in \text{Hom}(A, B)$ является линейным отображением, для него определено ядро $\ker \varphi$. Легко видеть, что ядро $\ker \varphi$ — идеал алгебры A , а образ $\text{im } \varphi$ — подалгебра в B . При этом факторалгебра $A/\ker \varphi$ изоморфна $\text{im } \varphi$. Гомоморфизм $\varphi: A \rightarrow B$, для которого $\varphi(a) = 0$ при всех $a \in A$, назовем **нулевым**. У такого гомоморфизма φ ядро $\ker \varphi$ совпадает со всей алгеброй A .

Замечание 2.20. Хотя каждый гомоморфизм алгебр — линейное отображение, $\text{Hom}(A, B)$ не является векторным пространством (линейные комбинации не сохраняют произведение).

Гомоморфизм φ унитарных алгебр, сохраняющий 1, т.е. $\varphi(1) = 1$, называется **унитарным**. Отметим, что если A и $B \neq \{0\}$ — унитарные алгебры, то нулевой гомоморфизм $\varphi: A \rightarrow B$ не является унитарным. Существуют ли ненулевые неунитарные гомоморфизмы унитарных алгебр? Ответ положительный, хотя в некоторых случаях это не так, например, когда $B = \mathbb{C}$ (см. ниже предложение 2.54). Множество всех унитарных гомоморфизмов между унитарными алгебрами обозначим $\text{Hom}_1(A, B)$. Приведем примеры гомоморфизмов алгебр, в частности, продемонстрируем, что ненулевой гомоморфизм унитарных алгебр не обязан быть унитарным.

Пример 2.21. (1) Рассмотрим определенное выше факторотображение $\pi: A \rightarrow A/I$, где I — идеал, $\pi: a \rightarrow a+I$. Тогда $\pi \in \text{Hom}(A, A/I)$.

(2) Пусть $A = \mathbb{C}$ и $B = M_2(\mathbb{C})$. Тогда A и B — унитарные алгебры. Построим ненулевой гомоморфизм $\varphi: A \rightarrow B$, не являющийся унитарным. Положим $b = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\varphi: 1 \mapsto b$ и продолжим это отображение по линейности. Так как $b^2 = b$, то φ сохраняет произведение. Тем самым, $\varphi \in \text{Hom}(A, B)$, но $\varphi \notin \text{Hom}_1(A, B)$. Если вместо φ рассмотреть отображение $\psi: A \rightarrow B$, являющееся продолжением по линейности отображения $1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, то ψ — унитарный гомоморфизм.

(3) Обозначим $\mathbb{C}[z]$ алгебру комплексных многочленов переменной z (она, разумеется, унитарна). Пусть A — унитарная алгебра, тогда для каждого $a \in A$ и $p(z) \in \mathbb{C}[z]$, $p(z) = \lambda_0 + \lambda_1 z + \dots + \lambda_n z^n$ определен элемент $p(a) = \lambda_0 1 + \lambda_1 a + \dots + \lambda_n a^n$ алгебры A . Легко видеть, что отображение $\varphi: \mathbb{C}[z] \rightarrow A$, $\varphi: p \mapsto p(a)$, является унитарным гомоморфизмом, т.е. $\varphi \in \text{Hom}_1(\mathbb{C}[z], A)$.

2.1.6 Унитаризация

Каждую неунитарную алгебру A можно расширить до унитарной. Мы приведем конструкцию, применяемую к произвольной алгебре, даже унитарной. Отметим, что при таком расширении унитарной алгебры ее исходная единица перестает быть единицей.

Итак, пусть A — произвольная алгебра. Положим $\tilde{A} = A \oplus \mathbb{C}$ (в смысле векторных пространств) и зададим умножение так: $(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \lambda b + \mu a, \lambda\mu)$. Легко проверяется, что это умножение билинейно, ассоциативно, и $(0, 1)$ является единицей в \tilde{A} . Алгебра \tilde{A} называется **унитаризацией алгебры A** . Отметим, что отображение $a \mapsto (a, 0)$ из A в \tilde{A} является инъективным гомоморфизмом, который позволяет отождествить A с ее образом в \tilde{A} (в дальнейшем мы будем писать $A \subset \tilde{A}$, имея в виду это отождествление). Для удобства, элементы (a, λ) алгебры \tilde{A} будем записывать в виде $a + \lambda$. Имеется важный гомоморфизм алгебр $\tilde{A} \rightarrow \mathbb{C}$, $a + \lambda \mapsto \lambda$, который называется **каноническим**.

Замечание 2.22. Если алгебра A унитарна, то в \tilde{A} образ единицы $1_A \in A$ имеет вид $(1_A, 0)$. Этот элемент уже не является единицей в \tilde{A} , так как, например, $(1_A, 0)(0, \lambda) = (\lambda 1_A, 0) \neq (0, \lambda)$ при $\lambda \neq 0$. Однако $(1_A, 0)$ является единицей в подалгебре $A \subset \tilde{A}$, так как $(a, 0)(1_A, 0) = (1_A, 0)(a, 0) = (a, 0)$.

Замечание 2.23. В дальнейшем мы выясним, что определенная нами унитаризация иногда оказывается не вполне пригодной для ряда задач. В связи с этим мы также введем другой прием, моделирующий единицу, а именно, так называемую аппроксимативную единицу.

Приведем ряд простейших свойств унитаризации \tilde{A} алгебры A .

Предложение 2.24. Пусть \tilde{A} — унитаризация алгебры A . Тогда справедливы следующие утверждения.

- (1) Подалгебра $A \subset \tilde{A}$ является модулярным идеалом в \tilde{A} и $\tilde{A}/A \approx \mathbb{C}$.
- (2) Если A — коммутативная алгебра, то \tilde{A} — тоже.
- (3) Если A — нормированная алгебра, то \tilde{A} , на которой задана функция $\|a + \lambda\| = \|a\| + |\lambda|$, является нормированной.
- (4) Подалгебра A замкнута в \tilde{A} .

(5) Если A — банахова алгебра, то \tilde{A} — тоже.

(6) Если $\varphi: A \rightarrow B$ — гомоморфизм алгебр и алгебра B унитарна, то отображение $\tilde{\varphi}: \tilde{A} \rightarrow B$, заданное формулой $a + \lambda \mapsto \varphi(a) + \lambda 1_B$ для всех $a \in A$ и $\lambda \in \mathbb{C}$, является единственным унитарным гомоморфизмом, продолжающим φ . Здесь 1_B — единица алгебры B .

Доказательство. (1) В силу предложения 2.17, достаточно проверить, что A — идеал в \tilde{A} , т.е. $(b, \mu)A \subset A$ для всех $(b, \mu) \in \tilde{A}$. Но это так в силу $(b, \mu)(a, 0) = (ba + \mu a, 0) \in A$. Аналогично, $(a, 0)(b, \mu) \in A$.

Рассмотрим канонический гомоморфизм $\varphi: \tilde{A} \rightarrow \mathbb{C}$, $a + \lambda \mapsto \lambda$. Тогда его ядро состоит из всех (a, λ) таких, что $\varphi(a, \lambda) = \lambda = 0$, т.е. это ядро совпадает с $A \subset \tilde{A}$. По известной теореме из линейной алгебры, $\tilde{A}/A \approx \text{im } \varphi = \mathbb{C}$, что и утверждалось.

(2) Это мгновенно видно из формулы умножения.

(3) Свойства нормы проверяются непосредственно. Для проверки субмультипликативности заметим, что

$$\begin{aligned} \|(a + \lambda)(b + \mu)\| &= \|ab + \lambda b + \mu a + \lambda \mu\| = \|ab + \lambda b + \mu a\| + |\lambda \mu| \leq \|ab\| + \|\lambda b\| + \|\mu a\| + |\lambda \mu| \leq \\ &\leq \|a\| \|b\| + |\lambda| \|b\| + |\mu| \|a\| + |\lambda| |\mu| = (\|a\| + |\lambda|)(\|b\| + |\mu|) = \|a + \lambda\| \|b + \mu\|. \end{aligned}$$

(4) Если $a + \lambda \notin A \subset \tilde{A}$, то $\lambda \neq 0$ и $\inf_{b \in A} \|a + \lambda - b\| \geq |\lambda| > 0$, поэтому $a + \lambda$ не является точкой прикосновения для A .

(5) Пусть (a_k, λ_k) — фундаментальная последовательность в \tilde{A} , тогда для каждого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что для всех $p, q \geq N$ выполняется $\|a_p - a_q\| + |\lambda_p - \lambda_q| < \varepsilon$, откуда $\|a_p - a_q\| < \varepsilon$ и $|\lambda_p - \lambda_q| < \varepsilon$, т.е. последовательности a_k в A и λ_k в \mathbb{C} фундаментальны. Но A и \mathbb{C} — полные пространства, поэтому $a_k \rightarrow a \in A$ и $\lambda_k \rightarrow \lambda \in \mathbb{C}$, поэтому $(a_k, \lambda_k) \rightarrow (a, \lambda)$, что и доказывает полноту \tilde{A} .

(6) Действительно, линейность $\tilde{\varphi}$ очевидна из определения. Далее,

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}((a + \lambda)(b + \mu)) &= \tilde{\varphi}(ab + \lambda b + \mu a + \lambda \mu) = \varphi(ab + \lambda b + \mu a) + \lambda \mu 1_B = \varphi(a)\varphi(b) + \lambda \varphi(b) + \mu \varphi(a) + \lambda \mu 1_B = \\ &= \varphi(a)(\varphi(b) + \mu 1_B) + \lambda 1_B(\varphi(b) + \mu 1_B) = (\varphi(a) + \lambda 1_B)(\varphi(b) + \mu 1_B) = \tilde{\varphi}(a + \lambda)\tilde{\varphi}(b + \mu), \end{aligned}$$

поэтому $\tilde{\varphi}$ — гомоморфизм. Кроме того, $\tilde{\varphi}(0_A + 1) = \varphi(0) + 1 \cdot 1_B = 1_B$, поэтому $\tilde{\varphi}$ унитарен, и $\tilde{\varphi}(a + 0) = \varphi(a)$, поэтому $\tilde{\varphi}$ — продолжение φ . Наконец, если ψ — унитарное продолжение гомоморфизма $\tilde{\varphi}$, то $\psi(a + 0) = \varphi(a)$, $\psi(0_A + 1) = 1_B$, поэтому

$$\psi(a + \lambda) = \psi(a + 0 + 0_A + \lambda 1) = \psi(a + 0) + \psi(0_A + \lambda 1) = \varphi(a) + \lambda \psi(1) = \varphi(a) + \lambda 1_B,$$

что и требовалось. □

Замечание 2.25. Хотя определенная выше норма на унитаризации \tilde{A} нормированной алгебры A вполне подходит для изучения банаховых алгебр, при переходе к C^* -алгебрам она оказывается непригодной, так как для нее не выполняется условие, определяющее C^* -алгебры. Для C^* -алгебры A мы заменим норму на \tilde{A} так, чтобы это условие выполнялось. А пока, вплоть до раздела 3.3.1, будем рассматривать унитаризацию \tilde{A} именно с той нормой, которая была введена в пункте (3) предложения 2.24.

Важным понятием в рассматриваемой теории является спектр элемента унитарной банаховой алгебры и обобщение этого понятия на неунитарные банаховы алгебры. Приведем ряд важных для дальнейшего результатов.

2.2 Резольвентные множества и спектры в унитарной алгебре

Элемент a унитарной алгебры A называется **обратимым**, если существует такой $b \in A$, что $ab = ba = 1$. Элемент b однозначно определен, так как если есть еще один такой b' , то $b'ab = b'(ab) = b' = (b'a)b = b$. Элемент b обозначается a^{-1} , а множество всех обратимых элементов из A — через $\text{Inv}(A)$.

Предложение 2.26. Для унитарной алгебры A множество $\text{Inv}(A)$ — группа по умножению, и для любых $a, b \in \text{Inv}(A)$ выполняется $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Доказательство. Если $a, b \in \text{Inv}(A)$, то $abb^{-1}a^{-1} = 1 = b^{-1}a^{-1}ab$, поэтому $ab \in \text{Inv}(A)$ и $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. Кроме того, $1 \cdot 1 = 1$, откуда $1 \in \text{Inv}(A)$. Очевидно также, что для каждого $a \in \text{Inv}(A)$ имеем $a^{-1} \in \text{Inv}(A)$. □

Для каждого элемента a унитарной алгебры A определим следующие два подмножества поля \mathbb{C} :

- **резольвентное множество** $\rho_A(a) = \rho(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda 1 \in \text{Inv}(A)\}$ и
- **спектр** $\sigma_A(a) = \sigma(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda 1 \notin \text{Inv}(A)\} = \mathbb{C} \setminus \rho(a)$.

Кроме того, если $\lambda \in \rho(a)$, то элемент $(a - \lambda 1)^{-1} \in A$ называется **резольвентой** элемента $a \in A$. В дальнейшем, для краткости, вместо $\lambda 1$ будем писать просто λ .

Приведем некоторые примеры вычисления спектров.

- Пусть $A = C(X)$, где X — хаусдорфов компакт. Тогда $f \in A$ обратим, если и только если он всюду отличен от нуля. Поэтому $\sigma(f) = f(X)$.
- Пусть $A = C_b(X)$, где X — произвольное топологическое пространство. Элемент $f \in A$ обратим, если он всюду отличен от нуля и, кроме того, множество $1/f(X)$ ограничено. Последнее имеет место, если и только если 0 не является точкой прикосновения множества $f(X)$. Таким образом, необратимость $\lambda - f$ равносильно тому, что $\lambda \in \overline{f(X)}$, где $\overline{f(X)}$ обозначает замыкание множества $f(X)$. Итак, $\sigma(f) = \overline{f(X)}$.
- Пусть $A = M_n(\mathbb{C})$, тогда спектр $a \in A$ — это множество всех собственных значений матрицы a , т.е. ее спектр в смысле линейной алгебры.

В предложении 2.26 мы показали, что в унитарной алгебре произведение любых двух обратимых элементов — также обратимый элемент. А что можно сказать про другие произведения?

Предложение 2.27. Пусть a и b — элементы унитарной алгебры A . Тогда

- (1) если a обратим, b — необратим, то ab и ba необратимы;
- (2) если a и b необратимы, то ab — может быть обратимым;
- (3) если a и b коммутируют, то элемент ab обратим, если и только если a и b обратимы;
- (4) если $a_1, \dots, a_n \in A$ попарно коммутируют, то элемент $a_1 \cdots a_n$ обратим, если и только если все a_k обратимы;
- (5) если $p(z) \in \mathbb{C}[z]$ — ненулевой комплексный многочлен, $p(z) = \lambda_0(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_n)$, $\lambda_0 \neq 0$, — его разложение на множители, то $p(a)$ обратим, если и только если все сомножители $a - \lambda_k 1$ обратимы.

Доказательство. (1) Предположим противное, и пусть сначала ab обратим. Тогда $ab = c \in \text{Inv}(A)$ и $b = a^{-1}c \in \text{Inv}(A)$ по предложению 2.26, противоречие. Случай обратимости ba разбирается аналогично.

(2) Рассмотрим алгебру линейных отображений пространства ℓ_2 в себя (можно ограничиться непрерывными отображениями), и пусть $a: (x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, \dots)$ — сдвиг вправо, а $b: (x_1, x_2, \dots) \mapsto (x_2, x_3, \dots)$ — сдвиг влево. Тогда a необратим, так как не сюръективен, ведь его образ не содержит, скажем, $(1, 0, 0, \dots)$. Элемент b также необратим, так как не инъективен, поскольку его ядро содержит ненулевой элемент, скажем тот же $(1, 0, 0, \dots)$. Но ba — тождественное отображение.

(3) Если a и b — обратимы, то обратимость ab следует из предложения 2.26. Докажем обратное утверждение. Пусть теперь элемент ab обратим, т.е. $ab = ba = c \in \text{Inv}(A)$, тогда $ac = aba = ca$ и аналогично $cb = bab = bc$. Далее, умножая равенство $ac = ca$ справа и слева на c^{-1} , получаем $c^{-1}a = ac^{-1}$. Аналогично, $c^{-1}b = bc^{-1}$. Наконец,

$$1 = (ab)c^{-1} = a(bc^{-1}) = c^{-1}ab = c^{-1}ba = (bc^{-1})a,$$

где третье равенство следует из того, что c^{-1} коммутирует с a и b , четвертое — из коммутируемости a и b , а пятое — снова из коммутируемости c^{-1} и b . Таким образом, $a \in \text{Inv}(A)$. Аналогично, $b \in \text{Inv}(B)$.

(4) Если все a_k обратимы, то обратимость $a_1 \cdots a_n$ вытекает из предложения 2.26. Обратно, пусть элемент $a_1 \cdots a_n$ обратим. Покажем, что все a_k обратимы. Положим b равным произведению все a_i , кроме a_k . Тогда, в силу пункта (3), элементы b и a_k обратимы, что и требовалось.

(5) Доказательство вытекает из пункта (4) и того, что все $a - \lambda_k 1$ коммутируют между собой и с λ_0 . \square

Задача 2.28. Выяснить, могут ли некоммутирующие элементы a и b унитарной алгебры A быть необратимыми, но иметь оба произведения ab и ba обратимыми.

Предложение 2.29. Пусть A — унитарная алгебра. Тогда

- (1) для $a \in A$ и $\mu \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ имеем $\sigma(\mu a) = \mu \sigma(a)$ и $\rho(\mu a) = \mu \rho(a)$;
- (2) для $a \in A$ и $\mu \in \mathbb{C}$ имеем $\sigma(a + \mu) = \sigma(a) + \mu$;
- (3) для $a, b \in A$ элемент $1 - ab$ обратим, если и только если $1 - ba$ обратим;
- (4) для любых $a, b \in A$ имеем $\sigma(ab) \setminus \{0\} = \sigma(ba) \setminus \{0\}$;
- (5) равенство $\sigma(ab) = \sigma(ba)$ может не иметь места;
- (6) если B — унитарная алгебра и $\varphi: A \rightarrow B$ — унитарный гомоморфизм, то $\varphi(\text{Inv}(A)) \subset \text{Inv}(B)$, поэтому для любого $a \in A$ выполняется $\sigma(\varphi(a)) \subset \sigma(a)$.

Доказательство. (1) Пусть $\lambda \in \rho(a)$, тогда $a - \lambda \in \text{Inv}(A)$, откуда $\mu a - \mu \lambda 1 \in \text{Inv}(A)$ и, значит, $\mu \lambda \in \rho(\mu a)$. Аналогично доказывается и обратное утверждение. Таким образом, $\lambda \in \rho(a)$, если и только если $\lambda \in \rho(\mu a)/\mu$, откуда $\rho(a) = \rho(\mu a)/\mu$ и, значит, $\rho(\mu a) = \mu \rho(a)$. Соотношение на спектры равносильно доказанному.

(2) Условие $\lambda \in \sigma(a)$ означает, что $a - \lambda \notin \text{Inv}(A)$, а это равносильно условию $a + \mu - (\lambda + \mu) \notin \text{Inv}(A)$, которое означает $\lambda + \mu \in \sigma(a + \mu)$. Таким образом, $\sigma(a) + \mu \subset \sigma(a + \mu)$. Обратное включение проверяется точно так же.

(3) Пусть $1 - ab$ обратим и $c = (1 - ab)^{-1}$. Положим $d = 1 + bca$, тогда

$$\begin{aligned} d(1 - ba) &= (1 + bca)(1 - ba) = 1 - ba + bca - bcaba = 1 - ba + bc(1 - ab)a = 1 - ba + ba = 1, \\ (1 - ba)d &= (1 - ba)(1 + bca) = 1 - ba + bca - babca = 1 - ba + b(1 - ab)ca = 1 - ba + ba = 1, \end{aligned}$$

поэтому $1 - ba$ обратим и $d = (1 - ba)^{-1}$.

(4) Пусть $\lambda \notin \sigma(ab)$, $\lambda \neq 0$, тогда $\lambda - ab \in \text{Inv}(A)$ и, значит, $1 - ab/\lambda \in \text{Inv}(A)$. По предыдущему пункту, $1 - ba/\lambda \in \text{Inv}(A)$, откуда $\lambda - ba \in \text{Inv}(A)$, так что $\lambda \notin \sigma(ba)$. Отсюда вытекает, что $\sigma(ab) \setminus \{0\} = \sigma(ba) \setminus \{0\}$.

(5) Рассмотрим пример из доказательства пункта (2) предложения 2.27, т.е. унитарную алгебру линейных операторов на пространстве ℓ_2 , пусть, как и выше a — оператор сдвига вправо, а b — сдвига влево. Тогда $ba = 1$, поэтому $\sigma(ba) = \{1\} \not\equiv 0$, а элемент ab необратим, так что $\sigma(ab) \ni 0$. Заметим, что, в силу предыдущего пункта, $\sigma(ab) = \{0, 1\}$.

(6) Пусть $a \in \text{Inv}(A)$, тогда существует $b \in A$ такой, что $ab = ba = 1$, так что $\varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab) = \varphi(1) = 1 = \varphi(ba) = \varphi(b)\varphi(a)$, поэтому $\varphi(a) \in \text{Inv}(B)$. Отсюда вытекает, что если $\lambda \notin \sigma(a)$, т.е. $a - \lambda \in \text{Inv}(A)$, то $\varphi(a - \lambda) = \varphi(a) - \lambda \in \text{Inv}(B)$, откуда $\lambda \notin \sigma(\varphi(a))$, откуда и вытекает требуемое. \square

Замечание 2.30. В пункте (1) предложения 2.29 условие $\mu \neq 0$ существенно. Хотя в унитарной банаховой алгебре спектр каждого элемента ограничен (см. лемму 2.36), в общем случае спектр элемента унитарной алгебры ограничен быть не обязан. В качестве примера рассмотрим унитарную алгебру \mathbb{C} -линейных отображений алгебры $\mathbb{C}[z]$ комплексных многочленов в себя. Пусть T — умножение на z . Покажем, что $\sigma(T) = \mathbb{C}$. Рассмотрим оператор $T - \lambda E$, где E — тождественное отображение, $\lambda \in \mathbb{C}$. Этот оператор не является обратимым, так как он не сюръективен: для любого ненулевого многочлена $p = \sum_{k=0}^n c_k z^k$, $c_n \neq 0$, имеем $q = (T - \lambda E)(p) = c_n z^{n+1} + \dots$, где \dots означает сумму членов порядка меньше $n + 1$. Таким образом, степень q не меньше 1, поэтому q никогда не равен 1. Если же $p = 0$, то $(T - \lambda E)(0) = 0$. Итак, для любого $\lambda \in \mathbb{C}$ образ отображения $T - \lambda E$ не содержит 1, что и требовалось.

Предложение 2.31. Пусть A — унитарная алгебра. Тогда

- (1) элемент $a \in A$ обратим, если и только если $0 \notin \sigma(a)$;
- (2) для $a \in \text{Inv}(A)$ имеем $\sigma(a^{-1}) = 1/\sigma(a)$, иными словами, $\lambda \in \sigma(a)$, если и только если $\lambda^{-1} \in \sigma(a^{-1})$.

Доказательство. (1) Условие $0 \in \sigma(a)$ означает в точности, что $a - 0 = a$ необратим.

(2) Пусть $\lambda \in \sigma(a)$. По предыдущему пункту, $\lambda \neq 0$. По определению, элемент $a - \lambda$ необратим, но тогда и $a^{-1}(a - \lambda) = 1 - \lambda a^{-1} = \lambda(\lambda^{-1} - a^{-1})$, а с ним и $a^{-1} - \lambda^{-1}$ необратимы, см. предложение 2.27. Следовательно, $\lambda^{-1} \in \sigma(a^{-1})$. Меняя местами a и a^{-1} , получаем требуемое. \square

Теорема 2.32. Пусть A — унитарная алгебра и $p(z)$ — комплексный многочлен. Тогда для каждого $a \in A$ такого, что $\sigma(a) \neq \emptyset$, выполняется $\sigma(p(a)) = p(\sigma(a))$.

Доказательство. Если $p = 0$, то $\sigma(p(a)) = \{0\} = p(\{0\})$. Если $p = \lambda_0 = \text{const} \neq 0$, то $\sigma(p(a)) = \{\lambda_0\} = p(\sigma(a))$.

Пусть теперь $p(z) \neq \text{const}$. Тогда для каждого $\mu \in \mathbb{C}$ существуют $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, $\lambda_0 \neq 0$, $n \geq 1$, такие, что $p(z) - \mu = \lambda_0(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_n)$ и, значит, $p(a) - \mu = \lambda_0(a - \lambda_1) \cdots (a - \lambda_n)$. По предложению 2.27, $p(a) - \mu$ необратим, т.е. $\mu \in \sigma(p(a))$, если и только если необратим хотя бы один из элементов $a - \lambda_k$, т.е. когда $\lambda_k \in \sigma(a)$. Заметим, что $\lambda \in \mathbb{C}$ равно одному из λ_k , если и только если $p(\lambda) = \mu$. Таким образом, $p(a) - \mu$ необратим в точности для тех μ , которые равны $p(\lambda)$ для некоторого $\lambda \in \sigma(a)$. Иными словами, все такие μ образуют множество $p(\sigma(a))$, что и требовалось. \square

2.2.1 Случай унитарных банаховых алгебр

Теорема 2.33. Пусть A — унитарная банахова алгебра и $a \in A$ такой, что $\|a\| < 1$. Тогда $1 - a \in \text{Inv}(A)$ и $(1 - a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n$, где $a^0 = 1$.

Доказательство. Так как $\sum_{n=0}^{\infty} \|a^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|a\|^n = (1 - \|a\|)^{-1} < \infty$, то последовательность $s_m = \sum_{n=0}^m a^n$ фундаментальна, поэтому, в силу полноты A , она сходится в некоторому b . Так как, по замечанию 2.5, умножение в A непрерывно, последовательность $(1 - a)s_m = s_m(1 - a) = 1 - a^{m+1}$ сходится одновременно к $(1 - a)b = b(1 - a)$ и к 1. Таким образом, в силу единственности предела, имеем $(1 - a)b = b(1 - a) = 1$, поэтому $1 - a \in \text{Inv}(A)$ и $b = \sum_{n=0}^{\infty} a^n$ — обратный элемент к $1 - a$. \square

В дальнейшем нам будет полезна следующая лемма.

Лемма 2.34. Пусть A — унитарная банахова алгебра и $a \in A$ такой, что $\|a\| < 1$. Тогда $1 - a \in \text{Inv}(A)$ и

$$\left\| (1 - a)^{-1} - \sum_{k=0}^m a^k \right\| \leq \frac{\|a\|^{m+1}}{1 - \|a\|}.$$

Доказательство. Действительно, $1 - a \in \text{Inv}(A)$ вытекает из теоремы 2.33. Далее,

$$\left\| (1 - a)^{-1} - \sum_{k=0}^m a^k \right\| = \left\| \sum_{k=0}^{\infty} a^k - \sum_{k=0}^m a^k \right\| = \left\| \sum_{k=m+1}^{\infty} a^k \right\| = \|a^{m+1}(1 - a)^{-1}\| \leq \|a\|^{m+1} \sum_{k=0}^{\infty} \|a\|^k = \frac{\|a\|^{m+1}}{1 - \|a\|},$$

что и требовалось. \square

Теорема 2.35. Пусть A — унитарная банахова алгебра. Тогда

- (1) множество $\text{Inv}(A)$ открыто в A ;
- (2) отображение $\varphi: \text{Inv}(A) \rightarrow A$, $\varphi: a \mapsto a^{-1}$, — дифференцируемо;
- (3) дифференциал отображения φ в точке a вычисляется по формуле $d\varphi|_a(b) = -a^{-1}ba^{-1}$.

Доказательство. (1) Берем произвольный $a \in \text{Inv}(A)$ и любой $b \in A$ такой, что $\|b - a\| < \|a^{-1}\|^{-1}$, тогда

$$\|ba^{-1} - 1\| = \|(b - a)a^{-1}\| \leq \|b - a\| \|a^{-1}\| < \|a^{-1}\|^{-1} \|a^{-1}\| = 1,$$

поэтому, в силу теоремы 2.33, элемент $1 - (1 - ba^{-1}) = ba^{-1}$ — обратим, откуда, в силу предложения 2.27, имеем $b \in \text{Inv}(A)$. Итак, вместе с каждым $a \in \text{Inv}(A)$ в $\text{Inv}(A)$ лежат все элементы из A , принадлежащие открытому шару с центром в a и радиусом $\|a^{-1}\|^{-1}$, что доказывает открытость $\text{Inv}(A)$.

(2), (3) Докажем теперь дифференцируемость отображения φ в точке $a \in \text{Inv}(A)$ в предположении, что $d\varphi|_a(b) = -a^{-1}ba^{-1}$ (заметим, что линейное отображение $d\varphi|_a$ непрерывно, так как $\|d\varphi|_a\| \leq \|a^{-1}\|^2$, где последнее неравенство вытекает из субмультипликативности нормы). Для этого мы должны проверить, что

$$(2.1) \quad \lim_{b \rightarrow 0} \frac{\|(a + b)^{-1} - a^{-1} - d\varphi|_a(b)\|}{\|b\|} = 0$$

Имеем: $(a + b)^{-1} = (a(1 + a^{-1}b))^{-1} = (1 + a^{-1}b)^{-1}a^{-1}$, поэтому

$$\|(a + b)^{-1} - a^{-1} - d\varphi|_a(b)\| = \|(1 + a^{-1}b)^{-1}a^{-1} - a^{-1} + a^{-1}ba^{-1}\| \leq \|(1 + a^{-1}b)^{-1} - 1 + a^{-1}b\| \|a^{-1}\|.$$

Отметим, что нас интересует последнее выражение при b сколь угодно близких к 0. Положим $c = a^{-1}b$ и будем считать, что $\| -c \| < 1/2$. По лемме 2.34 для $a = -c$ и $m = 1$,

$$\|(1+c)^{-1} - 1 + c\| \leq \frac{\|c\|^2}{1-\|c\|} < 2\|c\|^2,$$

где последнее равенство вытекает из того, что $\|c\| < 1/2$. Следовательно,

$$\frac{\|(a+b)^{-1} - a^{-1} - d\varphi|_a(b)\|}{\|b\|} \leq \frac{\|(1+c)^{-1} - 1 + c\| \|a^{-1}\|}{\|b\|} < \frac{2\|c\|^2 \|a^{-1}\|}{\|b\|} \leq \frac{2\|a^{-1}\|^3 \|b\|^2}{\|b\|} = 2\|a^{-1}\|^3 \|b\|,$$

что мгновенно влечет (2.1). \square

Лемма 2.36. Пусть A — унитарная банахова алгебра и $a \in A$. Тогда

- (1) спектр $\sigma(a)$ — замкнутое подмножество \mathbb{C} ;
- (2) спектр $\sigma(a)$ содержится в замкнутом круге радиуса $\|a\|$ с центром в $0 \in \mathbb{C}$, тем самым, с учетом предыдущего пункта, спектр $\sigma(a)$ — компакт;
- (3) отображение $\psi: \mathbb{C} \setminus \sigma(a) \rightarrow A$, определенное на резольвентном множестве $\rho(a) = \mathbb{C} \setminus \sigma(a)$ элементом a формулой $\psi: \lambda \mapsto (a - \lambda)^{-1}$, дифференцируемо.

Доказательство. (1) Если множество $\sigma(a)$ незамкнуто, то существует точка прикосновения $\lambda \in \mathbb{C}$ множества $\sigma(a)$, не лежащая в $\sigma(a)$. Тогда $a - \lambda 1 \in \text{Inv}(A)$, а для некоторой последовательности $\lambda_n \rightarrow \lambda$ элементы $a - \lambda_n 1$ необратимы. Заметим, что $\|(a - \lambda_n 1) - (a - \lambda 1)\| = |\lambda - \lambda_n| \|1\| = |\lambda - \lambda_n|$, так что $a - \lambda_n 1 \rightarrow a - \lambda 1$. Однако последнее противоречит открытости $\text{Inv}(A)$ (теорема 2.35).

(2) Пусть $|\lambda| > \|a\|$, тогда $\|\lambda^{-1}a\| < 1$, так что, в силу теоремы 2.33, $1 - \lambda^{-1}a \in \text{Inv}(A)$, откуда и $\lambda - a \in \text{Inv}(A)$. Следовательно, все такие λ не содержатся в $\sigma(a)$.

(3) Отображения $\mathbb{C} \rightarrow A$, $\lambda \mapsto \lambda 1$ и $A \rightarrow A$, $\lambda 1 \mapsto a - \lambda 1$ аффинны и ограничены, поэтому дифференцируемы. Отображение $A \rightarrow A$, $b \mapsto b^{-1}$ также дифференцируемо в силу теоремы 2.35. Осталось заметить, что отображение ψ является композицией этих трех дифференцируемых отображений и, поэтому, само дифференцируемо. \square

Следующая теорема является фундаментальным результатом в теории банаховых алгебр.

Теорема 2.37 (Гельфанд). Пусть A — унитарная банахова алгебра и $a \in A$. Тогда $\sigma(a) \neq \emptyset$.

Доказательство. Предположим противное, т.е. что существуют A и $a \in A$, для которых $\sigma(a) = \emptyset$. Рассмотрим отображение $\psi: \lambda \mapsto (a - \lambda)^{-1}$ из \mathbb{C} в A . По лемме 2.36, это отображение дифференцируемо, поэтому для каждого непрерывного линейного функционала $\tau: A \rightarrow \mathbb{C}$ композиция $\tau \circ \psi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ — голоморфное отображение. Мы покажем, что образ $\tau \circ \psi$ ограничен и, значит, по теореме Лиувилля, $\tau \circ \psi$ — постоянная функция.

В силу непрерывности отображения ψ , достаточно показать, что ψ ограничено вне какого-нибудь круга. Мы докажем это для круга радиуса $2\|a\|$. Итак, пусть $\|\lambda\| > 2\|a\|$, тогда $\|\lambda^{-1}a\| < 1/2$. По лемме 2.34, получим $\|(1 - \lambda^{-1}a)^{-1} - 1\| \leq \|\lambda^{-1}a\| / (1 - \|\lambda^{-1}a\|) < 1$, откуда

$$\|(1 - \lambda^{-1}a)^{-1}\| = \|(1 - \lambda^{-1}a)^{-1} - 1 + 1\| \leq \|(1 - \lambda^{-1}a)^{-1} - 1\| + \|1\| < 2.$$

Таким образом,

$$\|(a - \lambda)^{-1}\| = \|(\lambda - a)^{-1}\| = \|\lambda^{-1}(1 - \lambda^{-1}a)^{-1}\| = |\lambda^{-1}| \|(1 - \lambda^{-1}a)^{-1}\| < 2/|\lambda| < \|a\|^{-1}.$$

Итак, мы показали, что для любого непрерывного линейного функционала $\tau \in A^*$ функция $f_\tau(\lambda) = \tau(\psi(\lambda))$, $f_\tau: \lambda \mapsto \tau((a - \lambda)^{-1})$ постоянна, в частности,

$$f_\tau(0) = \tau(a^{-1}) = f_\tau(1) = \tau((a - 1)^{-1}).$$

Так как, в силу следствия 1.12, для каждой пары точек нормированного пространства существует непрерывный линейный функционал, различающий эти точки, имеем $a^{-1} = (a - 1)^{-1}$, откуда $a = a - 1$, противоречие. \square

Теорема 2.38 (Гельфанд–Мазур). Пусть A — унитарная банахова алгебра, в которой каждый ненулевой элемент обратим. Тогда $A = \mathbb{C} \cdot 1$.

Доказательство. Пусть в A существует элемент a , отличный от $\lambda 1$ при всех $\lambda \in \mathbb{C}$. Так как $a - \lambda \neq 0$ при всех $\lambda \in \mathbb{C}$, то, по условию, $a - \lambda \in \text{Inv}(A)$, так что $\sigma(a) = \emptyset$, противоречие с теоремой 2.37. \square

2.3 Спектральный радиус в унитарной алгебре

Пусть A — унитарная алгебра и $a \in A$. Величину $r(a) = \sup_{\lambda \in \sigma(a)} |\lambda|$ назовем **спектральным радиусом** элемента a .

Следствие 2.39. Пусть A — унитарная банахова алгебра. Тогда для любых $a, b \in A$ имеем $r(ab) = r(ba)$.

Доказательство. Если $r(ab) > 0$, то существует $\lambda \in \sigma(ab)$, $\lambda \neq 0$, и так как, в силу предложения 2.29, $\sigma(ab) \setminus \{0\} = \sigma(ba) \setminus \{0\}$, то $r(ba) > 0$ и $r(ba) = r(ab)$. Далее, если неверно, что $r(ab) > 0$, то также неверно, что $r(ba) > 0$, но тогда, по теореме 2.37, $\sigma(ab)$ и $\sigma(ba)$ непусты и, значит, $\sigma(ab) = \sigma(ba) = \{0\}$, откуда $r(ab) = 0 = r(ba)$. \square

Следствие 2.40. Пусть A и B — унитарные алгебры, $\varphi: A \rightarrow B$ — унитарный гомоморфизм, и $a \in A$. Тогда $r(\varphi(a)) \leq r(a)$.

Доказательство. По предложению 2.29, для каждого $a \in A$ имеем $\sigma(\varphi(a)) \subset \sigma(a)$, откуда и вытекает требуемое. \square

Пример 2.41. Приведем примеры вычисления спектральных радиусов.

- Если $A = C(X)$, где X — хаусдорфов компакт, то для $f \in A$ имеем $r(f) = \sup_{\lambda \in f(X)} |\lambda| = \|f\|_\infty$.
- Если $A = M_n(\mathbb{C})$, то для $a \in A$ величина $r(a)$ равна максимуму модулей собственных чисел матрицы a . В частности, у матрицы $a = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ все собственные числа равны нулю, поэтому $r(a) = 0$. Тем не менее, $\|a\| = 1$.

Теорема 2.42 (Бёрлинг). Пусть A — унитарная банахова алгебра и $a \in A$, тогда

$$r(a) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \|a^n\|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}.$$

Доказательство. Если $a = 0$, то $r(a) = 0$ и равенство имеет место. Предположим теперь, что $a \neq 0$, в частности, $\|a\| \neq 0$. Отметим, что при этом $r(a)$ может равняться нулю.

Если $\lambda \in \sigma(a)$, то $\lambda^n \in \sigma(a^n)$ по теореме 2.32, откуда $|\lambda^n| \leq \|a^n\|$ (лемма 2.36). Следовательно, $\|\lambda\| \leq \|a^n\|^{1/n}$ для каждого $\lambda \in \sigma(a)$ и, значит,

$$r(a) \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \|a^n\|^{1/n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}.$$

Для завершения доказательства мы покажем, что $r(a) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}$.

Для доказательства этого факта мы выберем произвольное $|\lambda| < 1/r(a)$ (если $r(a) = 0$, то полагаем $1/r(a) = \infty$) и докажем, что $\|a^n\|^{1/n} \leq M^{1/n}/|\lambda|$, где M — положительная вещественная константа, вообще говоря, зависящая от выбора λ , но не зависящая от n . Если это неравенство выполнено, то

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} M^{1/n}/|\lambda| = 1/|\lambda|.$$

Так как последнее неравенство имеет место для всех λ , удовлетворяющих $|\lambda| < 1/r(a)$, то

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} \leq r(a).$$

Итак, нам осталось показать, что при каждом λ , $|\lambda| < 1/r(a)$, выполняется $\|a^n\|^{1/n} \leq M^{1/n}/|\lambda|$, т.е. последовательность $\lambda^n a^n$ равномерно ограничена (нормы $\|\lambda^n a^n\|$ ограничены некоторой константой M).

Рассмотрим открытый круг $\Delta \subset \mathbb{C}$ с центром в нуле и радиусом $1/r(a)$ (при $r(a) = 0$ положим $\Delta = \mathbb{C}$).

Лемма 2.43. При каждом $\lambda \in \Delta$ выполняется $1 - \lambda a \in \text{Inv}(A)$.

Доказательство. Действительно, если $\lambda = 0$, то $1 - \lambda a = 1 \in \text{Inv}(A)$. Если же $\lambda \neq 0$, то $1 - \lambda a = -\lambda(a - 1/\lambda)$, и так как $|\lambda| < 1/r(a)$, то $|1/\lambda| > r(a)$, поэтому $1/\lambda \notin \sigma(a)$ и, значит, $a - 1/\lambda$, а вместе с ним и $1 - \lambda a$, обратимы. \square

Выберем произвольный непрерывный линейный функционал $\tau \in A^*$. Так как отображения $\lambda \mapsto 1 - \lambda a$ и τ дифференцируемы (как непрерывные аффинные отображения), отображение $b \mapsto b^{-1}$ дифференцируемо в каждой точке $b \in \text{Inv}(A)$ (теорема 2.35), и $1 - \lambda a \in \text{Inv}(A)$ при всех $\lambda \in \Delta$ по лемме 2.43, то функция $f(\lambda) = \tau((1 - \lambda a)^{-1})$ дифференцируема (голоморфна) во всем круге Δ . Значит, f раскладывается в ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n \lambda^n$ с центром в 0, причем этот ряд однозначно определен и равномерно сходится к самой функции на каждом замкнутом подкруге.

Выберем теперь λ так, чтобы $|\lambda| < 1/\|a\|$. В силу леммы 2.36, $r(a) \leq \|a\|$, откуда $|\lambda| < 1/r(a)$, поэтому выбранное λ лежит в круге Δ . Кроме того, для выбранного λ выполняется $\|\lambda a\| < 1$, поэтому, в силу теоремы 2.33, имеем

$$(1 - \lambda a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n a^n,$$

откуда $f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n \tau(a^n)$. Это — тоже разложение голоморфной функции f в ряд в 0, поэтому, в силу единственности такого разложения, имеем $\tau(a^n) = \lambda_n$. Таким образом, при каждом $\lambda \in \Delta$ ряд $f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n \tau(a^n)$ сходится, поэтому $\lambda^n \tau(a^n) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, в частности, при каждом $\tau \in A^*$ и фиксированном $\lambda \in \Delta$ семейство $\tau(\lambda^n a^n)$ ограничено. Будем рассматривать каждое $\lambda^n a^n$ как непрерывное отображение из пространства A^* (оно — банахово в силу задачи 1.9) в нормированное пространство \mathbb{C} , т.е. как элемент из A^{**} . Тогда, по теореме 1.14 Банаха–Штейнгауза, семейство норм этих отображений ограничено. По следствию 1.12 (см. также обсуждение после этого следствия), норма каждого функционала $\lambda^n a^n \in A^{**}$ совпадает с его нормой как элемента из A . Итак, мы показали, что при каждом $\lambda \in \Delta$ существует $M > 0$, вообще говоря, зависящее от λ , для которого при всех n выполняется $\|\lambda^n a^n\| \leq M$, а это и завершает доказательство. \square

Замечание 2.44. Обратите внимание, что теорема 2.42 гарантирует существование предела $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}$ для каждого элемента a унитарной банаховой алгебры, что априори совсем не очевидно.

По лемме 2.36, для каждого элемента a унитарной банаховой алгебры A выполняется $r(a) \leq \|a\|$. Проиллюстрируем, как работает теорема 2.42, показав, что последнее неравенство может быть строгим.

Пример 2.45. Пусть A — множество всех непрерывно дифференцируемых комплекснозначных функций на отрезке $[0, 1]$. Тогда A — алгебра относительно поточечных операций. Для каждого $f \in A$ положим $\|f\| = \|f\|_{\infty} + \|f'\|_{\infty}$, тогда $\|\cdot\|$ — субмультипликативная норма на A , относительно которой линейное пространство A полно. Тем самым, мы превратили A в банахову алгебру. Постоянная функция 1 является единицей в A , так что алгебра A унитарна.

Пусть $x: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ — включение, тогда $x \in A$ и $\|x^n\| = 1 + n$. По теореме 2.42, имеем

$$r(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + n)^{1/n} = 1 < 2 = \|x\|.$$

Пусть $K \subset \mathbb{C}$ — непустое компактное подмножество. Тогда ограниченные связные компоненты множества $\mathbb{C} \setminus K$ называются **дырами в K** . Отметим, что множество $\mathbb{C} \setminus K$ имеет ровно одну неограниченную компоненту связности. Заметим также, что, в силу леммы 2.36, спектр $\sigma(a)$ каждого элемента a унитарной банаховой алгебры замкнут и ограничен, а потому является компактом, так что и для него определено понятие дыр.

Теорема 2.46. Пусть B — замкнутая подалгебра унитарной банаховой алгебры A , содержащая единицу алгебры A . Тогда

- (1) множество $\text{Inv}(B)$ открыто и замкнуто в $B \cap \text{Inv}(A)$;
- (2) для всех $b \in B$ справедливы включения $\sigma_A(b) \subset \sigma_B(b)$ и $\partial \sigma_B(b) \subset \partial \sigma_A(b)$;
- (3) для всех $b \in B$ множество $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$ открыто и замкнуто в $\mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$;
- (4) если для $b \in B$ множество $\sigma_A(b)$ не имеет дыр, то $\sigma_A(b) = \sigma_B(b)$.

Доказательство. (1) Так как $1_A \in B$, то 1_A является также единицей и в подалгебре B . Поэтому $\text{Inv}(B) \subset \text{Inv}(A)$ и, значит, $\text{Inv}(B) \subset B \cap \text{Inv}(A) \subset B$. По теореме 2.35, множество $\text{Inv}(B)$ открыто в B , поэтому $\text{Inv}(B) = \text{Inv}(B) \cap (B \cap \text{Inv}(A))$ — открыто в индуцированной на $B \cap \text{Inv}(A)$ топологии.

Докажем, что $\text{Inv}(B)$ — замкнуто в $B \cap \text{Inv}(A)$. Так как A — метрическое пространство, достаточно проверить, что предел каждой последовательности из $\text{Inv}(B)$, сходящейся в $B \cap \text{Inv}(A)$, содержится в $\text{Inv}(B)$. Пусть $b_n \in \text{Inv}(B)$ — последовательность такая, что $b_n \rightarrow b \in B \cap \text{Inv}(A)$. Так как $\text{Inv}(B)$ — группа по умножению в силу

предложения 2.26, то $b_n^{-1} \in \text{Inv}(B) \subset B$ при всех $n \in \mathbb{N}$. По теореме 2.35, отображение $a \mapsto a^{-1}$, определенное на $\text{Inv}(A)$, дифференцируемо и, значит, непрерывно, поэтому $b_n^{-1} \rightarrow b^{-1}$ в $\text{Inv}(A)$. Так как подалгебры B — замкнута, то $b^{-1} \in B$. Таким образом, $b, b^{-1} \in B$, откуда $b \in \text{Inv}(B)$ и, значит, мы доказали замкнутость $\text{Inv}(B)$ в $B \cap \text{Inv}(A)$.

(2) Так как $\text{Inv}(B) \subset \text{Inv}(A)$, то для каждого $b \in B$ и $\lambda \notin \sigma_B(b)$ имеем $b - \lambda \in \text{Inv}(B) \subset \text{Inv}(A)$, откуда $\lambda \notin \sigma_A(b)$ и, значит, $\sigma_A(b) \subset \sigma_B(b)$.

Пусть теперь $\lambda \in \partial\sigma_B(b)$, тогда существует последовательность $\lambda_n \in \mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$, сходящаяся к λ . Но это означает, что $b - \lambda_n \in \text{Inv}(B) \subset \text{Inv}(A)$, но $b - \lambda \notin \text{Inv}(B)$, поскольку $\sigma_B(b)$ замкнут и, значит, содержит $\partial\sigma_B(b)$. Покажем, что $b - \lambda \notin \text{Inv}(A)$.

Предположим противное, т.е. $b - \lambda \in \text{Inv}(A)$. Так как B — подалгебра и $1_A \in B$, то $b - \lambda \in B$. Таким образом, $b - \lambda \in B \cap \text{Inv}(A)$. В силу первого утверждения, $\text{Inv}(B)$ замкнуто в $B \cap \text{Inv}(A)$, поэтому, так как $b - \lambda_n \in \text{Inv}(B)$, имеем $b - \lambda \in \text{Inv}(B)$, противоречие. Итак, мы показали, что $b - \lambda \notin \text{Inv}(A)$. Напомним, что $b_n - \lambda_n \in \text{Inv}(A)$, поэтому $\lambda_n \in \mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$ и $\lambda \in \sigma_A(b)$, так что $\lambda \in \partial\sigma_A(b)$.

(3) Как мы уже отмечали, спектр элемента — компакт, поэтому $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$ и $\mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$ — открытые подмножества \mathbb{C} , причем, в силу предыдущего пункта, $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b) \subset \mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$, откуда вытекает открытость.

Покажем теперь, что $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$ замкнуто в $\mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$. Предположим противное, т.е. $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$ не замкнуто в $\mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$. Это означает, что существует $x \in \mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$, являющаяся в $\mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$ точкой прикосновения для $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$, но не лежащая в $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$. Но тогда каждая окрестность $U^x \subset \mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$ точки x , а вместе с ней и каждая окрестность V^x этой точки в \mathbb{C} пересекает $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$, так что x — точка прикосновения $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$ в \mathbb{C} . Так как $x \notin \mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$, то $x \in \sigma_B(b)$, откуда $x \in \partial\sigma_B(b)$. Но, по пункту (2), имеем $x \in \partial\sigma_A(b) \subset \sigma_A(b)$, поэтому $x \notin \mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$, противоречие.

(4) Пусть теперь $\sigma_A(b)$ не имеет дыр. Тогда $\mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$ связно. По пункту (3), множество $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$ открыто и замкнуто в $\mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$, поэтому $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b) = \mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$ и, значит, $\sigma_B(b) = \sigma_A(b)$. \square

2.4 Спектры и спектральные радиусы в неунитальной алгебре

С помощью операции унитализации мы определим спектр и спектральный радиус также и для элементов неунитальной алгебры A . А именно, если \tilde{A} , как и выше, обозначает унитализацию алгебры A , то положим $\sigma_A(a) = \sigma_{\tilde{A}}(a)$ и $r(a) = \sup_{\lambda \in \sigma_A(a)} |\lambda|$.

Замечание 2.47. Из определения спектра элемента произвольной, не обязательно унитарной алгебры, а также теоремы 2.37, вытекает, что для алгебры A и любого ее элемента $a \in A$ всегда выполняется $\sigma(a) \neq \emptyset$.

Напомним, что конструкция унитализации применима не только к неунитальным, но и к унитарным алгебрам. При этом, если считать спектр элемента унитарной алгебры A в ее унитализации \tilde{A} , то этот спектр может измениться (это будет заведомо так для обратимого a , см. ниже), так как при унитализации $1_{\tilde{A}} \neq 1_A$. Одно из таких изменений приведено в следующем утверждении.

Предложение 2.48. Пусть A — произвольная банахова алгебра (унитарная или нет), \tilde{A} — унитализация A и $a \in A \subset \tilde{A}$. Тогда $0 \in \sigma_{\tilde{A}}(a)$, т.е. в унитализации \tilde{A} все элементы алгебры $A \subset \tilde{A}$ необратимы. В частности, спектры всех элементов неунитальной алгебры содержат 0.

Доказательство. Действительно, $a \in A \subset \tilde{A}$ не является обратимым элементом в \tilde{A} , так как $(a, 0)(b, \mu) = (ab + \mu a, 0) \neq (0, 1)$ ни при каком (b, μ) , поэтому $0 \in \sigma_{\tilde{A}}(a)$. \square

Приведем еще один результат. Он вытекает из леммы 2.36.

Следствие 2.49. Пусть A — банахова алгебра (не обязательно унитарная), и $a \in A$. Тогда $r(a) \leq \|a\|$.

Доказательство. Действительно, если алгебра A унитарна, то утверждение содержится в лемме 2.36. Если же A не унитарна, $r(a)$ вычисляется для унитализации \tilde{A} . Лемма 2.36 дает оценку $r(a) \leq \|(a, 0)\|$, но это — та же оценка, так как норма $(a, 0)$ в \tilde{A} равна норме a в A . \square

2.5 Экспоненты в унитарной банаховой алгебре

Пусть A — унитарная банахова алгебра и $a \in A$. Так как

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|a^n/n!\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|a^n\|/n! \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|a\|^n/n! < \infty,$$

то ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a^n/n!$ сходится в A (частичные суммы образуют фундаментальную последовательность, которая сходится в силу полноты пространства A). Сумму этого ряда обозначим e^a .

Напомним, что понятие дифференцируемости определено для отображений линейных нормированных пространств. Нас будут интересовать отображения из \mathbb{R} в унитарную банахову алгебру A . В этом случае для отображений $f, g: \mathbb{R} \rightarrow A$ определено произведение $f(t)g(t)$ при всех $t \in \mathbb{R}$. Непосредственно проверяется, что если f и g — дифференцируемы, то fg также дифференцируемо, и имеет место правило Лейбница: $(fg)' = f'g + fg'$.

Лемма 2.50. Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow A$ — дифференцируемое отображение в произвольную банахову алгебру A , причем $f' = 0$ тождественно. Тогда f — постоянное отображение.

Доказательство. Выберем произвольный $\tau \in A^*$ и рассмотрим функцию $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, заданную так: $h(t) = \tau(f(t))$. Тогда, по теореме о производной сложной функции, h дифференцируема, и $h' = 0$. Поэтому функция h постоянна, то есть $\tau(f(t)) = \tau(f(0))$ для всех $t \in \mathbb{R}$. Так как последнее равенство выполняется для всех $\tau \in A^*$, а, по следствию 1.12, для каждой пары точек из A существует τ , различающий эти точки, имеем $f(t) = f(0)$ для всех t , что и требовалось. \square

Теорема 2.51. Пусть A — унитарная банахова алгебра. Тогда

- (1) для каждого $a \in A$ элемент e^a обратим, причем $(e^a)^{-1} = e^{-a}$;
- (2) если $a \in A$, функция $f: \mathbb{R} \rightarrow A$ дифференцируема, $f(0) = 1$, $f'(t) = a f(t)$, то $f(t) = e^{ta}$ при всех $t \in \mathbb{R}$;
- (3) для любых коммутирующих $a, b \in A$ выполняется $e^{a+b} = e^a e^b$.

Доказательство. (1) Пусть $f(t) = e^{ta} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n a^n/n!$. Так как этот ряд абсолютно сходится, его можно почленно дифференцировать (доказательство такое же, как и в случае обычных рядов), поэтому $f'(t) = a f(t)$.

Пусть теперь $f, g: \mathbb{R} \rightarrow A$ — дифференцируемые отображения такие, что $f'(t) = a f(t)$, $g'(t) = a g(t)$, $f(0) = g(0) = 1$, и a коммутирует с $f(t)$ при всех t (например, это так, если $f(t) = e^{ta}$). Рассмотрим отображение $h: \mathbb{R} \rightarrow A$, заданное так: $h(t) = f(t)g(-t)$, тогда h дифференцируемо и

$$h'(t) = f'(t)g(-t) - f(t)g'(-t) = a f(t)g(-t) - f(t)a g(-t) = a f(t)g(-t) - a f(t)g(-t) = 0.$$

Но тогда, по лемме 2.50, имеем $h(t) = \text{const}$, и так как $h(0) = f(0)g(0) = 1$, то $h(t) = 1$ при всех t . В частности, если положить $f(t) = g(t) = e^{ta}$, то $e^{ta}e^{-ta} = 1$. В частности, $e^a e^{-a} = 1$, так что, заменяя a на $-a$, получаем $e^{-a}e^a = 1$, откуда $(e^a)^{-1} = e^{-a}$.

(2) Пусть теперь $f(t)$ дифференцируема, $f'(t) = a f(t)$ и $f(0) = 1$. Положим $g(t) = e^{ta}$, тогда $f(t)g(-t) = f(t)e^{-ta} = 1$, откуда, в силу пункта (1), имеем $f(t) = (e^{-ta})^{-1} = e^{ta}$.

(3) Пусть теперь a и b коммутируют. Положим $f(t) = e^{ta}e^{tb}$. Тогда $f(0) = 1$ и $f'(t) = a e^{ta}e^{tb} + e^{ta} b e^{tb} = (a + b)f(t)$ (последнее равенство вытекает из того, что a и b коммутируют). В силу доказанного выше, имеем $f(t) = e^{t(a+b)}$ для всех t . В частности, $f(1) = e^{a+b} = e^a e^b$. \square

2.6 Модулярные идеалы, продолжение

В настоящем разделе мы приведем несколько необходимых для дальнейшего результатов, связанных с модулярными идеалами. Определение этих идеалов была дано в разделе 2.1.4. Там же мы показали, что это в точности такие идеалы, факторы по которым являются унитарными.

Теорема 2.52. Пусть I — модулярный идеал в банаховой алгебре A . Тогда его замыкание \bar{I} — собственный идеал. В частности, каждый максимальный модулярный идеал замкнут.

Доказательство. Замыкание идеала — идеал, поэтому остается проверить, что \bar{I} — собственный. Пусть $u \in A$ такой, что для всех $a \in A$ выполняется $a - ua \in I$ и $a - au \in I$ (такой элемент u существует по определению модулярного идеала). Покажем, что $u \notin \bar{I}$. Возьмем произвольный $b \in I$. Оказывается, $\|u - b\| \geq 1$, откуда следует $u \notin \bar{I}$. Проверим неравенство $\|u - b\| \geq 1$.

Предположим противное, т.е. что существует $b \in I$, для которого $\|u - b\| < 1$. Тогда, в силу теоремы 2.33, элемент $c = 1 - u + b \in \bar{A}$ обратим в \bar{A} и, так как A — идеал в \bar{A} по предложению 2.24, то $cA = A$ (равенство вытекает из обратимости c). С другой стороны, для каждого $a \in A$ имеем $ca = (a - ua) + ba \in I$, откуда $A = cA \subset I$, так что $I = A$, а это противоречит тому, что I собственный (I должен быть собственным по определению модулярного идеала).

Пусть теперь I — модулярный максимальный идеал. Тогда, как было показано выше, \bar{I} — собственный идеал. Но тогда $I = \bar{I}$ в силу максимальнойности. \square

Лемма 2.53. Пусть A — коммутативная алгебра, а $I \subset A$ — максимальный модулярный идеал. Тогда A/I — поле.

Доказательство. Заметим, что алгебра A/I коммутативна и, в соответствии с разделом 2.1.4, унитарна. Осталось проверить, что каждый ненулевой элемент из A/I обратим.

Покажем сначала, что в A/I нет нетривиальных идеалов, т.е. отличных от $\{0\}$ и A/I . Предположим противное, и пусть J — такой идеал, а $\pi: A \rightarrow A/I$ — каноническая проекция. Тогда $\pi^{-1}(J)$ — идеал в A , содержащий I и отличный от I . Так как I — максимальный идеал, $\pi^{-1}(J) = A$, поэтому $J = A/I$, противоречие.

Используем этот факт для того, чтобы показать обратимость произвольного ненулевого $a \in A/I$. Заметим, что $a(A/I)$ — ненулевой идеал в A/I , так как A/I коммутативна и унитарна. По доказанному выше, $a(A/I) = A/I$, в частности, существует $b \in A/I$ такой, что $ab = 1 \in A/I$, поэтому a — обратим. \square

2.7 Характеры коммутативной алгебры, ее спектр

Для коммутативной алгебры мы определим характеры, которые играют важную роль в теореме Гельфанда, позволяющей отождествить коммутативную банахову алгебру с алгеброй непрерывных функций на некотором топологическом пространстве.

Пусть A — коммутативная алгебра. Каждый ненулевой гомоморфизм алгебр $\tau: A \rightarrow \mathbb{C}$ называется *характером* этой алгебры. Множество всех характеров алгебры A обозначается $\Omega(A)$ или $\text{Spec } A$. Напомним, что для произвольных алгебр B и C через $\text{Hom}(B, C)$ мы обозначали множество всех гомоморфизмов $\varphi: B \rightarrow C$. Тем самым, $\text{Hom}(A, \mathbb{C}) = \Omega(A) \cup \{0\}$, где 0 — нулевой гомоморфизм.

Приведем некоторые простейшие свойства характеров на унитарной алгебре. Отметим, что, вообще говоря, в определении характера $\tau: A \rightarrow \mathbb{C}$ на унитарной алгебре A не требуется выполнение условия $\tau(1) = 1$. Однако, как мы покажем, это автоматически имеет место.

Предложение 2.54. Пусть A — унитарная коммутативная алгебра и $\tau \in \Omega(A)$ — характер. Тогда

- (1) $\tau(1) = 1$, т.е. каждый характер унитарной алгебры является унитарным гомоморфизмом;
- (2) для каждого обратимого элемента $a \in A$ имеем $\tau(a) \neq 0$ и, более того, $\tau(a^{-1}) = \tau(a)^{-1}$;
- (3) для произвольного $a \in A$ выполняется $\tau(a) \in \sigma(a)$.

Доказательство. (1) Покажем сначала, что $\tau(1) \neq 0$. Действительно, если это не так, то $\tau(1a) = \tau(1)\tau(a) = 0$ для любого $a \in A$, поэтому τ — нулевой гомоморфизм, противоречие. Далее, $\tau(1) = \tau(1 \cdot 1) = \tau(1)^2$, и так как $\tau(1) \neq 0$, то $\tau(1) = 1$.

(2) Если $a \in \text{Inv}(A)$, то $\tau(aa^{-1}) = \tau(a)\tau(a^{-1}) = \tau(1) = 1$, где последнее равенство вытекает из предыдущего пункта. Поэтому $\tau(a)\tau(a^{-1}) = 1$, откуда мгновенно следует требуемое.

(3) Мы должны показать, что элемент $a - \tau(a)1$ необратим. Заметим, что $\tau(a - \tau(a)1) = \tau(a) - \tau(a)\tau(1) = 0$, поэтому, в силу предыдущего пункта, $a - \tau(a)1$ — необратимый элемент. \square

Теорема 2.55. Пусть A — унитарная коммутативная банахова алгебра. Тогда

- (1) для каждого $\tau \in \Omega(A)$ выполняется $\|\tau\| = 1$, в частности, линейный функционал τ непрерывен, так что $\Omega(A) \subset A^*$;
- (2) множество $\Omega(A)$ непусто и отображение $\varkappa: \tau \mapsto \ker(\tau)$ — биекция между $\Omega(A)$ и множеством всех максимальных идеалов в A .

Доказательство. (1) Из предложения 2.54 вытекает, что для каждого $a \in A$ имеем $\tau(a) \in \sigma(a)$, следовательно, $|\tau(a)| \leq r(a) \leq \|a\|$, где последнее неравенство вытекает из леммы 2.36. Таким образом, $\|\tau\| \leq 1$. С другой стороны, $\tau(1) = 1$ и $\|1\| = 1$, поэтому $\|\tau\| = 1$.

(2) Покажем сначала, что $I := \ker(\tau)$ — максимальный идеал в A . Так как τ — гомоморфизм алгебр, то I — идеал. В силу того, что $\tau \neq 0$, идеал I собственный. Так как, по пункту (1), отображение τ непрерывно, то I — замкнутое подмножество в A . Итак, I — замкнутый идеал. Наконец, для каждого $a \in A$ выполняется $\tau(a - \tau(a)1) = 0$, так что $a - \tau(a)1 \in I$. Если идеал I не максимальный, то существует отличный от I собственный идеал $M \supset I$. Выберем произвольный $a \in M \setminus I$. Тогда, по определению I , имеем $\tau(a) \neq 0$. В силу сказанного выше, $a - \tau(a)1 \in I \subset M$, поэтому $\tau(a)1 \in M$, и раз $\tau(a) \neq 0$, то и $1 \in M$. Но тогда $M = A$, противоречие. Итак, мы показали, что I — максимальный идеал.

Покажем, что отображение \varkappa инъективно. Предположим, что для $\tau_1, \tau_2 \in \Omega(A)$ выполняется $\ker(\tau_1) = \ker(\tau_2)$. Так как для каждого $a \in A$ имеем $a - \tau_1(a)1 \in \ker(\tau_1)$, и так как $\ker(\tau_1) = \ker(\tau_2)$, то и $\tau_2(a - \tau_1(a)1) = 0$ при всех a , откуда $\tau_2(a) = \tau_1(a)$ при всех $a \in A$, поэтому $\tau_1 = \tau_2$.

Докажем сюръективность отображения \varkappa , т.е. что каждый максимальный идеал в A является ядром некоторого характера.

Лемма 2.56. *Пусть A — унитарная коммутативная банахова алгебра и $I \subset A$ — максимальный идеал. Тогда $A = \mathbb{C} \oplus I$ (здесь равенство не учитывает норму).*

Доказательство. Так как алгебра A унитарна, то идеал I — модулярный (см. предложение 2.17) и, по теореме 2.52, идеал I замкнут (как максимальный модулярный идеал). По лемме 2.53, факторалгебра A/I является полем, т.е. унитарной алгеброй, в которой все ненулевые элементы обратимы. По теореме 2.38, имеем $A/I = \mathbb{C}(1 + I)$, поэтому для каждого $a \in A$ существует $\lambda \in \mathbb{C}$, для которого $a + I = \lambda(1 + I) = \lambda 1 + I$. Следовательно, существует $b \in I$ такое, что $a = a + 0 = \lambda 1 + b$. Это представление однозначно, так как если $\lambda 1 + b = \lambda' 1 + b'$, то $b - b' = (\lambda' - \lambda)1$, поэтому если $\lambda \neq \lambda'$, то $1 \in I$, что невозможно, так как I — собственный. Таким образом, $\lambda = \lambda'$ и, значит, $b = b'$. Согласованность операций в A и $\mathbb{C} \oplus I$ проверяется непосредственно. \square

Воспользуемся леммой 2.56 и определим $\tau: A \rightarrow \mathbb{C}$, положив $\tau(\lambda 1 + a) = \lambda$. Тогда τ — характер, причем $\tau(\lambda 1 + a) = 0$, если и только если $\lambda = 0$, т.е. $\lambda 1 + a \in I$. Иными словами, $\ker \tau = I$, что и доказывает сюръективность \varkappa .

Для завершения доказательства теоремы напомним, что, по предложению 2.17, множество максимальных идеалов унитарной алгебры непусто, поэтому и $\Omega(A) \neq \emptyset$. \square

2.7.1 Характеры коммутативной алгебры и ее унитаризации

Выясним, как связаны множества всех характеров коммутативной алгебры A и ее унитаризации \tilde{A} . Пусть $F: \Omega(\tilde{A}) \rightarrow \text{Hom}(A, \mathbb{C})$ — отображение, ставящее в соответствие каждому характеру $\tilde{\tau} \in \Omega(\tilde{A})$ гомоморфизм $\tilde{\tau}|_A \in \text{Hom}(A, \mathbb{C})$, полученный ограничением $\tilde{\tau}$ на A .

Лемма 2.57. *Отображение F инъективно.*

Доказательство. Мы должны показать, что если $\tilde{\tau}_1 \neq \tilde{\tau}_2$, то и $\tilde{\tau}_1|_A \neq \tilde{\tau}_2|_A$. Так как $\tilde{\tau}_1 \neq \tilde{\tau}_2$, существует $(a, \lambda) \in \tilde{A}$, для которого, $\tilde{\tau}_1(a, \lambda) \neq \tilde{\tau}_2(a, \lambda)$. По предложению 2.54, каждый характер является унитарным гомоморфизмом, поэтому

$$\tilde{\tau}_1(a, \lambda) = \tilde{\tau}_1((a, 0) + \lambda(0, 1)) = \tilde{\tau}_1|_A(a) + \lambda \neq \tilde{\tau}_2(a, \lambda) = \tilde{\tau}_2|_A(a) + \lambda,$$

откуда $\tilde{\tau}_1|_A(a) \neq \tilde{\tau}_2|_A(a)$, так что $\tilde{\tau}_1|_A \neq \tilde{\tau}_2|_A$ и, значит, отображение F — инъективно. \square

Лемма 2.58. *Отображение F сюръективно.*

Доказательство. Рассмотрим произвольный гомоморфизм $\varphi \in \text{Hom}(A, \mathbb{C})$ и продолжим его до гомоморфизма $\tilde{\tau}: \tilde{A} \rightarrow \mathbb{C}$, положив $\tilde{\tau}(a, \lambda) = \varphi(a) + \lambda$ (то, что это — гомоморфизм проверяется непосредственно). Далее, $\tilde{\tau}$ — ненулевой гомоморфизм, так как $\tilde{\tau}(1) = 1$, поэтому $\tilde{\tau} \in \Omega(\tilde{A})$ и $\tilde{\tau}|_A = \varphi$, что и требовалось. \square

Следствие 2.59. *Отображение F — биективно.*

Заметим, что в нулевой гомоморфизм $0 \in \text{Hom}(A, \mathbb{C})$ переходит ровно один гомоморфизм, а именно, канонический гомоморфизм $\tilde{\tau}_\infty: \tilde{A} \rightarrow \mathbb{C}$, $\tilde{\tau}_\infty(a, \lambda) = \lambda$. Итак, мы доказали следующий результат.

Следствие 2.60. *Если $F: \Omega(\tilde{A}) \rightarrow \text{Hom}(A, \mathbb{C})$ — построенная выше биекция, то*

$$\Omega(A) = F(\Omega(\tilde{A}) \setminus \{\tilde{\tau}_\infty\}) = F(\Omega(\tilde{A})) \setminus \{0\}.$$

2.7.2 Характеры, спектры, топология пространства характеров

Продолжим изучать характеры коммутативной банаховой алгебры.

Теорема 2.61. Пусть A — коммутативная банахова алгебра. Тогда

- (1) если A унитарна, то для каждого $a \in A$ имеем $\sigma(a) = \{\tau(a) : \tau \in \Omega(A)\}$;
- (2) если A не унитарна, то для каждого $a \in A$ имеем $\sigma(a) = \{\tau(a) : \tau \in \Omega(A)\} \cup \{0\}$.

Доказательство. (1) Выберем произвольное $a \in A$ и любое $\lambda \in \sigma(a)$, тогда $a - \lambda$ — необратимый элемент. Положим $I = (a - \lambda)A$. Покажем, что I — собственный идеал. Действительно, если $I = A$, то $1 \in I$, так что существует $b \in I$, для которого $(a - \lambda)b = 1$ и, значит, $a - \lambda$ — обратимый элемент, противоречие.

По предложению 2.17, идеал I модулярный и, по тому же предложению, I содержится в некотором максимальном идеале M . По теореме 2.55, $M = \ker \tau$ для некоторого характера $\tau \in \Omega(A)$. Так как $a - \lambda \in I \subset M$, то $0 = \tau(a - \lambda) = \tau(a) - \lambda$, поэтому $\tau(a) = \lambda$. Так как мы выбрали произвольное $\lambda \in \sigma(a)$, заключаем, что $\sigma(a) \subset \{\tau(a) : \tau \in \Omega(A)\}$. Обратное включение содержится в предложении 2.54.

(2) Пусть \tilde{A} — унитаризация A . Тогда, по следствию 2.60, имеем $\Omega(A) = F(\Omega(\tilde{A}) \setminus \{\tilde{\tau}_\infty\})$, где $\tilde{\tau}_\infty: \tilde{A} \rightarrow \mathbb{C}$ — канонический гомоморфизм, а $F: \Omega(\tilde{A}) \rightarrow \text{Hom}(A, \mathbb{C})$ — построенная выше биекция, см. следствие 2.60. По определению спектра элемента a неунитарной алгебры A , он равен спектру этого элемента в унитаризации \tilde{A} . Таким образом, используя результат пункта (1) и следствие 2.60, имеем

$$\sigma(a) = \{\tilde{\tau}(a) : \tilde{\tau} \in \Omega(\tilde{A})\} = \{\tau(a) : \tau \in \Omega(A)\} \cup \{\tilde{\tau}_\infty(a)\} = \{\tau(a) : \tau \in \Omega(A)\} \cup \{0\},$$

что и требовалось. \square

Следствие 2.62. Пусть A — коммутативная банахова алгебра, тогда $\Omega(A) \subset A^*$, причем $\Omega(A)$ лежит в замкнутом единичном шаре из A^* .

Доказательство. Из теоремы 2.61 и следствия 2.49 вытекает, что для каждого $a \in A$, $\|a\| \leq 1$, и $\tau \in \Omega(A)$ выполняется $|\tau(a)| \leq r(a) \leq \|a\| \leq 1$. Следовательно, τ — ограниченный линейный функционал, т.е. $\tau \in A^*$, и τ лежит в замкнутом единичном шаре относительно нормы на A^* . \square

Превратим $\Omega(A)$ в топологическое пространство, ограничив на него $*$ -слабую топологию из A^* . Полученное топологическое пространство называется **пространством характеров** или **спектром** алгебры A .

Теорема 2.63. Пусть A — коммутативная банахова алгебра. Тогда, по отношению к $*$ -слабой топологии,

- (1) пространство $\Omega(A) \cup \{0\}$ хаусдорфово и компактно;
- (2) пространство $\Omega(A)$ хаусдорфово и локально компактно;
- (3) если алгебра A унитарна, то $\Omega(A)$ — хаусдорфов компакт.

Доказательство. (1) То, что $\Omega(A) \cup \{0\}$ — хаусдорфово в $*$ -слабой топологии, вытекает из теоремы 1.31.

Покажем, что $\Omega(A) \cup \{0\}$ замкнуто в $*$ -слабой топологии. Пусть $\varphi: A \rightarrow \mathbb{C}$ — непрерывный линейный функционал, не лежащий в $\Omega(A) \cup \{0\}$. Мы должны показать, что существует окрестность функционала φ в $*$ -слабой топологии, не пересекающая $\Omega(A) \cup \{0\}$. Так как $\varphi \notin \Omega(A)$ и $\varphi \neq 0$, то существуют такие $a, b \in A$, что $\varphi(ab) \neq \varphi(a)\varphi(b)$. Так как умножение в поле \mathbb{C} непрерывно, существуют такие окрестности $U^{\varphi(a)}$, $U^{\varphi(b)}$ и $U^{\varphi(ab)}$, что $(U^{\varphi(a)}U^{\varphi(b)}) \cap U^{\varphi(ab)} = \emptyset$. Напомним, что для $a \in A$ мы определили непрерывный линейный функционал $J_a: A^* \rightarrow \mathbb{C}$, $J_a(f) = f(a)$, а предбаза $*$ -слабой топологии состоит из прообразов $J_a^{-1}(U)$ всевозможных открытых множеств $U \subset \mathbb{C}$ по всем $a \in A$. В частности, множества $V_a := J_a^{-1}(U^{\varphi(a)})$, $V_b := J_b^{-1}(U^{\varphi(b)})$, $V_{ab} := J_{ab}^{-1}(U^{\varphi(ab)})$ и их пересечение $W = V_a \cap V_b \cap V_{ab}$ являются открытыми в $*$ -слабой топологии. В явном виде,

$$W = \{f \in A^* : f(a) \in U^{\varphi(a)}, f(b) \in U^{\varphi(b)}, f(ab) \in U^{\varphi(ab)}\}.$$

Ясно, что $\varphi \in W$, поэтому W — окрестность φ в $*$ -слабой топологии. В силу выбора окрестностей $U^{\varphi(a)}$ и $U^{\varphi(b)}$, для любого $f \in W$ имеем $f(a)f(b) \neq f(ab)$, поэтому f не является характером и не равен 0, т.е. $W \cap (\Omega(A) \cup \{0\}) = \emptyset$. Тем самым, мы доказали замкнутость $\Omega(A) \cup \{0\}$ в $*$ -слабой топологии.

По следствию 2.62, $\Omega(A)$ содержится в замкнутом единичном шаре пространства A^* . Также там содержится 0. По теореме 1.33, этот шар компактен в *-слабой топологии. В силу замкнутости $\Omega(A) \cup \{0\}$ в этой топологии, $\Omega(A) \cup \{0\}$ — тоже компакт в *-слабой топологии.

(2) Напомним, что топологическое пространство X называется **локально компактным**, если каждая его точка имеет базу окрестностей, замыкания которых компактны.

Лемма 2.64. Пусть X — хаусдорфово. Тогда

- (a) пространство X локально компактно, если и только если у любой точки $x \in X$ существует окрестность U такая, что ее замыкание \bar{U} — компактно;
- (b) если пространство X компактно, то для каждой точки $p \in X$ пространство $Y := X \setminus \{p\}$ — локально компактно.

Доказательство. (a) Достаточно проверить, что из существования у каждой точки окрестности с компактным замыканием вытекает существование базы окрестностей, замыкания которых компактны. Пусть $x \in X$ — произвольная точка и U — ее окрестность, для которой \bar{U} — компакт. Выберем произвольную окрестность V точки x и положим $W = V \cap U$, тогда $\bar{W} \subset \bar{U}$ — замкнутое подмножество, и так \bar{U} компактно и хаусдорфово, то \bar{W} — компакт.

(b) В силу пункта (a) достаточно показать, что у каждой точки $y \in Y$ имеется окрестность $U \subset Y$ с компактным замыканием $\bar{U} \subset Y$. Так как X — хаусдорфово, в X существуют непересекающиеся окрестности V и W точек p и y соответственно. Множество $X \setminus V$ замкнуто как в X , так и Y , поэтому, в силу хаусдорфовости X , это $X \setminus V$ — компакт. С другой стороны, $W \subset X \setminus V \subset Y$, поэтому замыкание \bar{W} в Y , будучи замкнутым подмножеством хаусдорфова компакта $X \setminus V$, также компактно в Y . \square

Напомним, что $\Omega(A)$ не содержит нулевой гомоморфизм, поэтому $\Omega(A) = (\Omega(A) \cup \{0\}) \setminus \{0\}$. По пункту (1), пространство $\Omega(A) \cup \{0\}$ компактно, поэтому, в силу леммы 2.64, пространство $\Omega(A)$ — локально компактно.

(3) Пусть теперь алгебра A унитарна. Покажем, что 0 не лежит в замыкании $\Omega(A)$ в *-слабой топологии. Действительно, пусть $V_0 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1/2\}$, тогда множество $U_0 = J_1^{-1}(V_0) = \{f \in A^* : f(1) \in V_0\}$ открыто в *-слабой топологии и содержит нулевой функционал 0, т.е. U_0 — окрестность 0. С другой стороны, по предложению 2.54, для каждого $\tau \in \Omega(A)$ выполняется $\tau(1) = 1$, так что U_0 не пересекает $\Omega(A)$. Таким образом, в этом случае $\Omega(A)$ само является замкнутым подмножеством компакта $\Omega(A) \cup \{0\}$ в *-слабой топологии и, значит, компактно. \square

Приведем пример описания пространства характеров конкретной банаховой алгебры.

Теорема 2.65. Пусть X — компактное хаусдорфово топологическое пространство и $C(X)$ — банахова алгебра непрерывных функций на X , наделенная суп-нормой. Тогда пространство характеров $\Omega(C(X))$ гомеоморфно X .

Доказательство. Для каждого $x \in X$ обозначим δ_x отображение $\delta_x : C(X) \rightarrow \mathbb{C}$, $\delta_x(f) = f(x)$. Тогда δ_x — характер алгебры $C(X)$, т.е. $\delta_x \in \Omega(C(X))$. Таким образом, мы определили отображение $\delta : X \rightarrow \Omega(C(X))$, $\delta(x) = \delta_x$. Покажем, что отображение δ — гомеоморфизм.

Докажем, что δ инъективно. Для этого воспользуемся леммой Урысона. Напомним, что топологическое пространство Y называется **нормальным**, если любые два непустых замкнутых непересекающихся подмножества $A, B \subset Y$ отделимы, т.е. существуют открытые множества $U \supset A$ и $V \supset B$ такие, что $U \cap V = \emptyset$.

Задача 2.66. Покажите, что каждое компактное хаусдорфово пространство нормально.

Таким образом, рассматриваемое нами пространство X является нормальным.

Лемма 2.67 (Урысон). Топологическое пространство Y нормально, если и только если для любых двух непустых непересекающихся замкнутых множеств $A, B \subset Y$ существует непрерывная функция $f : Y \rightarrow [0, 1]$ такая, что $f|_A = 0$ и $f|_B = 1$.

В случае пространства X в качестве A и B возьмем произвольные две разных точки x и x' , тогда, по лемме Урысона, существует функция $f \in C(X)$ такая, что $f(x) \neq f(x')$, откуда $\delta_x(f) \neq \delta_{x'}(f)$, следовательно, $\delta_x \neq \delta_{x'}$ и, значит, отображение δ инъективно.

Докажем теперь сюръективность отображения δ . Для каждой точки $x \in X$ положим $I_x = \{f \in C(X) : f(x) = 0\}$, тогда I_x — идеал в $C(X)$.

Лемма 2.68. *Идеал $I \subset C(X)$ максимальный, если и только если $I = I_x$ для некоторого $x \in X$.*

Доказательство. Покажем сначала, что каждый идеал I_x — максимальный. Предположим противное, т.е. для некоторого I_x имеется отличный от I_x собственный идеал $I \supset I_x$. Тогда $I \setminus I_x \neq \emptyset$ и, значит, существует $f \in I \setminus I_x$. По определению I_x , имеем $f(x) \neq 0$. Но тогда $g := f - f(x) \in I_x$, откуда $h = f - g \in I$. Но функция h постоянная и не равная нулю, поэтому она обратима в $C(X)$ и, значит, $I = C(X)$, противоречие.

Докажем теперь, что каждый максимальный идеал в $C(X)$ совпадает с некоторым I_x . Предположим противное, и пусть I — максимальный идеал в $C(X)$, отличный от всех I_x . Это означает, что для каждого $x \in X$ идеал I содержит функцию f_x , для которой $f_x(x) \neq 0$ (если это не так, то для некоторого x имеем $I_x \subset I$ и, значит, $I_x = I$, что противоречит уже доказанному). Так как каждая функция f_x непрерывна, существует окрестность U^x точки x , в которой f_x отлична от нуля. Семейство $\{U^x\}_{x \in X}$ является открытым покрытием X , поэтому, в силу компактности X , это семейство содержит конечное подпокрытие $\{U^{x_k}\}_{k=1}^n$. Заметим, что вместе с каждой $f_{x_k} \in C(X)$ сопряженная с ней функция \bar{f}_{x_k} также лежит в $C(X)$, и так как I — идеал, что $|f_{x_k}|^2 = \bar{f}_{x_k} f_{x_k} \in I$, откуда $f := \sum_{k=1}^n f_{x_k} \bar{f}_{x_k} = \sum_{k=1}^n |f_{x_k}|^2 \in I$. Но f всюду отлична от нуля, поэтому f обратима в $C(X)$ и, значит, $I = C(X)$, противоречие. \square

Вернемся к доказательству сюръективности δ . Выберем произвольный $\tau \in \Omega(C(X))$. По теореме 2.55, $\ker \tau$ — максимальный идеал в $C(X)$. По лемме 2.68, существует $x \in X$ такой, что $\ker \tau = I_x$, т.е. $\tau(f) = 0$ для всех функций из I_x . Но δ_x также зануляет все эти функции: $\delta_x(f) = f(x) = 0 = \tau(f)$ для $f \in I_x$. Далее, по предложению 2.54, $\tau(\lambda) = \lambda = \delta_x(\lambda)$ для всех $\lambda \in \mathbb{C}$. Заметим также, что для любой $g \in C(X)$ функция $f := g - g(x)$ лежит в I_x , так что для $\lambda := g(x)$ имеем $g = f + \lambda$ и, значит,

$$\tau(g) = \tau(f + \lambda) = \tau(f) + \lambda = \delta_x(f) + \lambda = \delta_x(f + \lambda) = \delta_x(g),$$

откуда $\tau = \delta_x$.

Итак, мы доказали, что δ — биективное отображение. Покажем, что отображение δ непрерывно. Для этого рассмотрим произвольную направленность $\{x_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ в X , сходящуюся к некоторой точке $x \in X$. Тогда $\lim_{\lambda \in \Lambda} f(x_\lambda) = f(x)$ для всех $f \in C(X)$, так как все эти функции непрерывны. Так как $\delta_{x_\lambda}(f) = f(x_\lambda)$ и $\delta_x(f) = f(x)$, то по теореме 1.31, пункт (2), направленность δ_{x_λ} является *-слабо сходящейся к δ_x . Напомним, что пространство характеров мы наделяем *-слабой топологией. Поэтому, в силу теоремы 1.20, отображение δ непрерывно.

Таким образом, мы показали, что отображение δ непрерывно и биективно отображает компактное пространство X на пространство $\Omega(C(X))$, являющееся хаусдорфовым в силу теоремы 2.63. По известной теореме из общей топологии, отображение δ — гомеоморфизм, что и требовалось. \square

Замечание 2.69. В доказательстве теоремы 2.63 утверждается, что 0 не лежит в замыкании пространства характеров унитарной алгебры. Возьмем в качестве унитарной алгебры унитаризацию \tilde{A} неунитарной алгебры A . Тогда и для \tilde{A} точка 0 не содержится в замыкании $\Omega(\tilde{A})$. С другой стороны, пространство характеров из $\Omega(A)$ получается ограничением всех характеров из $\Omega(\tilde{A}) \setminus \{\tilde{\tau}_\infty\}$ на A , если отождествлять A с соответствующим идеалом в \tilde{A} . При этом ограничение $\tilde{\tau}_\infty$ на A дает нулевой гомоморфизм, и при выбрасывании этого нуля мы, как декларируется, получаем локально компактное пространство, т.е. этот 0 не предполагается изолированной точкой в образе всего $\Omega(\tilde{A})$, т.е. в $\text{Hom}(A, \mathbb{C})$. Тем самым, возникает видимость противоречия. Ниже мы покажем, как связаны друг с другом $\Omega(\tilde{A})$ и $\Omega(A)$, откуда будет видно, почему на самом деле никакого противоречия нет.

2.7.3 Отождествления

Напомним, что алгебра A , рассматриваемая как подалгебра в ее унитаризации \tilde{A} , является идеалом, в частности, линейным подпространством. Более того, по предложению 2.24, если A — банахова алгебра, то \tilde{A} — тоже банахова, и A является замкнутым подпространством в \tilde{A} .

Пусть A — банахова алгебра, тогда A^* и \tilde{A}^* — банаховы пространства. Каждому непрерывному линейному функционалу $\varphi \in A^*$ поставим в соответствие линейный функционал $\varphi' : \tilde{A} \rightarrow \mathbb{C}$, однозначно определяемый условием $\varphi'(a, \lambda) = \varphi(a)$. Так как

$$\|\varphi'\| = \sup_{\|a\| + |\lambda| = 1} |\varphi'(a, \lambda)| = \sup_{\|a\| + |\lambda| = 1} |\varphi(a)| = \sup_{\|a\| = 1} |\varphi(a)| = \|\varphi\|,$$

то φ' — непрерывный, т.е. $\varphi' \in \tilde{A}^*$, поэтому определено отображение $F^*: A^* \rightarrow \tilde{A}^*$, $F^*: \varphi \mapsto \varphi'$, являющееся изометричным вложением.

Далее, вложение F^* линейно, так как для любых $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{C}$ и $\varphi_1, \varphi_2 \in A^*$ выполняется

$$F^*(\mu_1\varphi_1 + \mu_2\varphi_2)(a, \lambda) = (\mu_1\varphi_1 + \mu_2\varphi_2)(a) = \mu_1\varphi_1(a) + \mu_2\varphi_2(a) = \mu_1F^*(\varphi_1)(a, \lambda) + \mu_2F^*(\varphi_2)(a, \lambda).$$

Тем самым, мы изометрично и линейно вкладываем A^* в виде линейного подпространства в \tilde{A}^* . Подпространство $F^*(A^*)$ замкнуто, так как для любой последовательности $F^*(\varphi_k)$, сходящейся в \tilde{A}^* к некоторому элементу $\psi \in \tilde{A}^*$, имеем $F^*(\varphi_k)(a, \lambda) = (\varphi_k(a), 0)$, поэтому $\psi(a, \lambda)$ также имеет вид $(b, 0)$, так что ψ является образом функционала $\varphi \in A^*$, $\varphi(a) = b$ для всех таких a и b (линейность и непрерывность φ вытекает из этих же свойств функционала ψ).

Пусть теперь алгебра A коммутативна. Будем отождествлять A^* с подпространством $F^*(A^*) \subset \tilde{A}^*$, что задается отождествлением каждого $\varphi \in A^*$ с соответствующим $\varphi' \in \tilde{A}^*$. По следствию 2.62, $\text{Hom}(A, \mathbb{C}) \subset A^*$, таким образом, мы также можем отождествить множество $\text{Hom}(A, \mathbb{C})$ с соответствующим подмножеством в $F^*(A^*) \subset \tilde{A}^*$. Отметим, что при таком отождествлении нулевой гомоморфизм $0 \in \text{Hom}(A, \mathbb{C})$ соответствует нулю в \tilde{A}^* .

Рассмотрим теперь $\text{Hom}(\tilde{A}, \mathbb{C})$. По предложению 2.54, для каждого ненулевого $\tilde{\tau} \in \text{Hom}(\tilde{A}, \mathbb{C})$, т.е. для характера $\tilde{\tau} \in \Omega(\tilde{A})$, выполняется $\tilde{\tau}(0, 1) = 1$. С другой стороны, $\varphi := \tilde{\tau}|_A$, т.е. ограничение $\tilde{\tau}$ на $A \subset \tilde{A}$, является гомоморфизмом, т.е. $\varphi \in \text{Hom}(A, \mathbb{C})$, причем $\varphi \in \Omega(A) \subset \text{Hom}(A, \mathbb{C})$, если и только если $\tilde{\tau} \neq \tilde{\tau}_\infty$, где $\tilde{\tau}_\infty: \tilde{A} \rightarrow \mathbb{C}$ — канонической гомоморфизм, $\tilde{\tau}_\infty(a, \lambda) = \lambda$. Более того, имеет место очевидное равенство: $\tilde{\tau} = \varphi' + \tilde{\tau}_\infty$, где, как и выше, $\varphi': \tilde{A} \rightarrow \mathbb{C}$ — продолжение гомоморфизма φ нулем на $1_{\tilde{A}}$. Тем самым, для каждого гомоморфизма $\varphi \in \text{Hom}(A, \mathbb{C})$ мы построили два продолжения на \tilde{A} : продолжение φ' нулем на $1_{\tilde{A}}$ и продолжение $\tilde{\tau}$, равное 1 на $1_{\tilde{A}}$. Из сказанного вытекает, что если отождествить $\text{Hom}(A, \mathbb{C})$ с соответствующим подмножеством в $A^* \subset \tilde{A}^*$, т.е. отождествить каждое $\varphi \in \text{Hom}(A, \mathbb{C})$ с $\varphi' \in \tilde{A}^*$, то получим

$$\Omega(\tilde{A}) = \tilde{\tau}_\infty + \text{Hom}(A, \mathbb{C}) = (\tilde{\tau}_\infty + \Omega(A)) \sqcup \{\tilde{\tau}_\infty\} \subset \tilde{\tau}_\infty + A^*,$$

где второе равенство имеет место в силу того, что $\Omega(A)$ не содержит нулевой гомоморфизм. Отметим, что $\tilde{\tau}_\infty + A^*$ — аффинное подпространство в \tilde{A}^* , не являющееся линейным, так как $\tilde{\tau}_\infty \notin A^*$.

Итак, $\Omega(A)$ лежит в линейном подпространстве $A^* \subset \tilde{A}^*$, а $\Omega(\tilde{A})$ — в аффинном подпространстве $\tilde{\tau}_\infty + A^* \subset \tilde{A}^*$, получающемся сдвигом пространства A^* . Напомним, что на множестве характеров мы рассматриваем *-слабую топологию. Положим $V = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1/2\}$ и $U = J_{1_{\tilde{A}}}^{-1}(V)$, где, как и выше, $J_{\tilde{a}}: \tilde{A}^* \rightarrow \mathbb{C}$, $J_{\tilde{a}}(g) = g(\tilde{a})$. Тогда в *-слабой топологии на \tilde{A}^* множество U открыто и является окрестностью нуля, так как $J_{1_{\tilde{A}}}(0) = 0(1_{\tilde{A}}) = 0 \in V$. С другой стороны, для каждой точки $g := f + \tilde{\tau}_\infty \in \tilde{\tau}_\infty + A^*$, $f \in A^*$, имеем

$$J_{1_{\tilde{A}}}(g) = (f + \tilde{\tau}_\infty)(1_{\tilde{A}}) = f(1_{\tilde{A}}) + \tilde{\tau}_\infty(1_{\tilde{A}}) = 1 \notin V,$$

так что $g \notin U$ и, значит, $U \cap (\tilde{\tau}_\infty + A^*) = \emptyset$. Теперь видно, почему $0 \in \tilde{A}^*$ не является точкой прикосновения для $\Omega(\tilde{A})$, но может являться точкой прикосновения для $\Omega(A)$, см. замечание 2.69. С другой стороны, часто бывает удобно отождествлять $\Omega(A)$ с $\tilde{\tau}_\infty + \Omega(A) \subset \Omega(\tilde{A})$. Имея в виду это отождествление, будем писать $\Omega(A) \subset \Omega(\tilde{A})$ и, значит, $\Omega(A) = \Omega(\tilde{A}) \setminus \{\tilde{\tau}_\infty\}$.

Предложение 2.70. Пусть A — банахова алгебра и \tilde{A} — ее унитализация. Тогда

- (1) топология, индуцированная на $A^* \subset \tilde{A}^*$ из \tilde{A}^* со *-слабой топологией совпадает со *-слабой топологией на A^* ;
- (2) отображение $\psi: \tilde{A}^* \rightarrow \tilde{A}^*$, $\psi: \tilde{a}^* \mapsto \tilde{a}^* + c$, $c \in \tilde{A}^*$, является гомеоморфизмом в *-слабой топологии.

Доказательство. (1) Достаточно проверить это на предбазах, состоящих из прообразов открытых в \mathbb{C} множеств при всевозможных отображениях $J_a: A^* \rightarrow \mathbb{C}$ и $J_b: \tilde{A}^* \rightarrow \mathbb{C}$, $a, c \in A$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $b = c + \lambda 1_{\tilde{A}} \in \tilde{A}$. Пусть $U \subset \mathbb{C}$ — открытое подмножество, тогда $J_b^{-1}(U) = \{f \in \tilde{A}^* : f(b) \in U\}$. По определению отождествления A^* и соответствующего подмножества \tilde{A}^* , каждому $g \in A^*$ ставится в соответствии функционал $g': \tilde{A} \rightarrow \mathbb{C}$ такой, что $g'(a + \lambda 1_{\tilde{A}}) = g(a)$, и, значит, $g'(1_{\tilde{A}}) = 0$. Следовательно, $f \in A^* \subset \tilde{A}^*$, если и только если $f(a + \lambda 1_{\tilde{A}}) = f(a)$ при всех λ . Заметим, что

$$J_b^{-1}(U) \cap A^* = \{g' \in A^* \subset \tilde{A}^* : g'(b) \in U\} = \{g' \in A^* \subset \tilde{A}^* : g'(c) \in U\} = \{g \in A^* : g(c) \in U\} = J_c^{-1}(U).$$

Тем самым, мы показали, что индуцированная база $*$ -слабой топологии из \tilde{A}^* содержится в базе $*$ -слабой топологии на $A^* \subset \tilde{A}^*$ (после отождествления).

Обратно, рассмотрим произвольное $J_c^{-1}(U) \subset A^*$, тогда на $A^* \subset \tilde{A}^*$ это множество выглядит так:

$$\{g' \in A^* \subset \tilde{A}^* : g'(c) \in U\} = J_b^{-1}(U) \cap A^*,$$

где в качестве b можно взять $c + \lambda 1_{\tilde{A}}$ с любым $\lambda \in \mathbb{C}$. Таким образом, базы совпадают и, значит, топологии — тоже.

(2) Снова проверим, что при сдвиге каждое открытое множество из базы $*$ -слабой топологии остается открытым. Имеем

$$\psi(J_b^{-1}(U)) = \{f + c : f \in \tilde{A}^*, f(b) \in U\} = \{f + c \in \tilde{A}^* : (f + c)(b) \in U + c\} = J_b^{-1}(U + c),$$

что и требовалось. \square

Предложение 2.70 позволяет извлечь из теоремы 2.63, в соответствии с которой пространство $\Omega(\tilde{A})$ со $*$ -слабой топологией является хаусдорфовым компактом, что $\Omega(A)$ — локально компактно в силу леммы 2.64.

В дальнейшем, для **неунитальной коммутативной банаховой алгебры** A , мы будем часто отождествлять алгебру A с $F(A) \subset \tilde{A}$, а множество всех характеров $\Omega(A)$ алгебры A — с подмножеством $\tilde{\tau}_\infty + \Omega(A)$ в $\Omega(\tilde{A})$.

2.8 Представление Гельфанда коммутативной банаховой алгебры

Начнем со следующего замечания, объясняющего, почему представление Гельфанда, которое мы определим ниже, имеется не для всякой коммутативной банаховой алгебры.

Замечание 2.71. Для коммутативной алгебры A множество $\Omega(A)$ может быть пустым. В качестве примера можно рассмотреть $A = \{0\}$.

Пусть A — коммутативная банахова алгебра с непустым $\Omega(A)$. Для каждого $a \in A$ определим отображение

$$\hat{a}: \Omega(A) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \tau \mapsto \tau(a).$$

Иными словами, \hat{a} равно ограничению $J_a: A^* \rightarrow \mathbb{C}$ на $\Omega(A)$. Так как каждое J_a непрерывно в $*$ -слабой топологии, то $\hat{a} \in C(\Omega(A))$. По теореме 2.63, если A — унитарная алгебра, то $\Omega(A)$ — хаусдорфов компакт. Если же A — не унитарна, то, по той же теореме 2.63, $\Omega(A) \cup \{0\}$ — хаусдорфов компакт, поэтому, в силу леммы 2.64, пространство $\Omega(A)$ локально компактно.

Лемма 2.72. Пусть X — хаусдорфов компакт, $p \in X$ — произвольная точка, $Y = X \setminus \{p\}$ и $f \in C(X)$. Тогда $f|_Y \in C_0(Y)$, если и только если $f(p) = 0$.

Доказательство. Пусть сначала $f(p) = 0$, тогда для любого $\varepsilon > 0$ множество $\{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ — замкнуто в X и, значит, компактно и в X , и в Y , поэтому $f \in C_0(Y)$.

Обратно, если $f \in C_0(Y)$, то $T := \{x \in Y : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ компактно в Y , а, значит, и в X . Так как X — хаусдорфов компакт, то T замкнуто в X , поэтому $U := X \setminus T$ — открыто в X , причем $p \in U$. Значит, U — окрестность p , и мы доказали, что для любого $\varepsilon > 0$ существует такая окрестность U точки p , что $|f| < \varepsilon$ в этой окрестности. Так как f непрерывна в p , то $f(p) = 0$, что и требовалось. \square

Заметим, что для непрерывного в $*$ -слабой топологии отображения J_a выполняется $J_a(0) = 0(a) = 0$, поэтому \hat{a} , будучи ограничением J_a на $(\Omega(A) \cup \{0\}) \setminus \{0\}$, непрерывно и зануляется на бесконечности по лемме 2.72, т.е. $\hat{a} \in C_0(\Omega(A))$.

Функция \hat{a} называется **преобразованием Гельфанда** элемента a .

Теорема 2.73 (Представление Гельфанда). Пусть A — коммутативная банахова алгебра с непустым спектром. Тогда отображение

$$\Gamma: A \rightarrow C_0(\Omega(A)), \quad \Gamma: a \mapsto \hat{a},$$

— гомоморфизм алгебр, причем $\|\hat{a}\|_\infty = r(a) \leq \|a\|$ для всех $a \in A$, так что $\|\Gamma\| \leq 1$, и, значит, гомоморфизм Γ является 1-липшицевым.

Если алгебра A унитарна, то $C_0(\Omega(A)) = C(\Omega(A))$ и гомоморфизм Γ унитарный.

Далее, для каждого $a \in A$,

- если алгебра A унитарна, то $\sigma(a) = \widehat{a}(\Omega(A))$,
- если алгебра A не унитарна, то $\sigma(a) = \widehat{a}(\Omega(A)) \cup \{0\}$.

Доказательство. То, что Γ — гомоморфизм алгебр, вытекает из ограничения отображений J_a на характеры, что приводит к сохранению мультипликативной структуры. Действительно,

$$\Gamma(ab)(\tau) = \widehat{ab}(\tau) = \tau(ab) = \tau(a)\tau(b) = \widehat{a}(\tau)\widehat{b}(\tau) = \Gamma(a)(\tau)\Gamma(b)(\tau)$$

для любого характера τ . Далее,

$$\widehat{a}(\Omega(A)) = \{\widehat{a}(\tau) : \tau \in \Omega(A)\} = \{\tau(a) : \tau \in \Omega(A)\},$$

поэтому $\sigma(a)$ совпадает с образом отображения \widehat{a} , с добавленным нулем для не унитарной алгебры, содержится в теореме 2.61. Отсюда мгновенно вытекает равенство $r(a) = \|\widehat{a}\|_\infty$, и так как $r(a) \leq \|a\|$ по следствию 2.49, заключаем, что $\|\Gamma\| \leq 1$.

Наконец, если алгебра A унитарна, то $\Gamma(1): \tau \mapsto \tau(1) = 1$, где последнее равенство содержится в предложении 2.54, т.е. $\Gamma(1)$ — единица алгебры $C(\Omega(A))$. \square

Замечание 2.74. Пусть A — коммутативная банахова алгебра и \widetilde{A} — ее унитаризация. Тогда \widetilde{A} также коммутативна и для нее имеется представление Гельфанда $\widetilde{\Gamma}: \widetilde{A} \rightarrow C(\Omega(\widetilde{A}))$ из теоремы 2.73. Покажем, как из этого представления получается представление Гельфанда $\Gamma: A \rightarrow C_0(\Omega(A))$ для A .

Как мы уже выяснили в разделе 2.7.3, имеются естественные отождествления, которые, в частности, позволяют рассматривать $\Omega(A)$ как множество $\Omega(\widetilde{A}) \setminus \{\tilde{\tau}_\infty\} \subset \Omega(\widetilde{A})$. Однако априори не ясно, насколько это отождествление согласовано с функциями из представления Гельфанда. Покажем, что имеется полное согласование, т.е. функции $\widehat{a}: \Omega(A) \rightarrow \mathbb{C}$ можно рассматривать как ограничения на $\Omega(A) \subset \Omega(\widetilde{A})$ функций $\widehat{a}: \Omega(\widetilde{A}) \rightarrow \mathbb{C}$, где обе функции \widehat{a} и \widehat{a} построены по элементам $a \in A$ и $(a, 0) \in \widetilde{A}$ соответственно (эти элементы мы тоже отождествляем).

Напомним (см. раздел 2.7.3), что каждый элемент $\tau \in \Omega(A)$ мы, рассматривая A как подпространство в \widetilde{A} , продолжаем до $\tau' \in \widetilde{A}^*$, полагая $\tau'(1_{\widetilde{A}}) = 0$, и затем получаем соответствующий характер $\tilde{\tau}$ так: $\tilde{\tau} = \tau' + \tilde{\tau}_\infty$. Отождествление $\Omega(A)$ с подмножеством в $\Omega(\widetilde{A})$ происходит по правилу $\tau \mapsto \tilde{\tau}$. Таким образом, нам нужно сравнить $\widehat{a}(\tau)$ и $\widehat{a}(\tilde{\tau})$. Имеем

$$\widehat{a}(\tau) = \tau(a) = \tau'(a, 0) = \tau'(a, 0) + \tilde{\tau}_\infty(a, 0) = \tilde{\tau}(a, 0) = \widehat{a}(\tilde{\tau}),$$

что и доказывает согласованность функций \widehat{a} и \widehat{a} .

Как мы уже отмечали в разделе 2.7.3, множество $\Omega(\widetilde{A})$, наделенное *-слабой топологией, — хаусдорфов компакт, а его подмножество $\Omega(A) = \Omega(\widetilde{A}) \setminus \{\tilde{\tau}_\infty\}$ — локальный компакт. Заметим, что для $a \in A$ имеем $\widehat{a}(\tilde{\tau}_\infty) = \tilde{\tau}_\infty(a, 0) = 0$, так что, в силу непрерывности функции \widehat{a} , ее ограничение на локальный компакт $\Omega(\widetilde{A}) \setminus \{\tilde{\tau}_\infty\}$ зануляется на бесконечности. Таким образом, ограничения функций $\widehat{a} \in C(\Omega(\widetilde{A}))$ на $\Omega(A)$ — это функции $\widehat{a} \in C_0(\Omega(A))$. Обратно, каждая функция $\widehat{a} \in C_0(\Omega(A))$, будучи продолженной нулем в $\tilde{\tau}_\infty$, непрерывна на всем $\Omega(\widetilde{A})$ и равна \widehat{a} . Тем самым, мы показали, что ограничение функций из $C(\Omega(\widetilde{A}))$ на $\Omega(A) = \Omega(\widetilde{A}) \setminus \{\tilde{\tau}_\infty\}$ задает биективное соответствие между $\widetilde{\Gamma}(A) \subset C(\Omega(\widetilde{A}))$ и $\Gamma(A) \subset C_0(\Omega(A))$, согласованное с представлениями Гельфанда: $\widetilde{\Gamma}(a)|_{\Omega(A)} = \Gamma(a)$ для всех $a \in A$.

Замечание 2.75. Ядро представления Гельфанда может быть ненулевым. Это ядро называется **радикалом алгебры** A . По теореме 2.73, оно состоит из всех элементов $a \in A$, для которых $r(a) = 0$, т.е. у которых все спектр нулевой. В частности, радикал содержит все нильпотентные элементы, т.е. такие $a \in A$, для которых $a^n = 0$ при некотором $n \in \mathbb{N}$ (в общей алгебре элементы с нулевым спектром называются **квазинильпотентными**). Если радикал равен нулю, то алгебра A называется **полупростой**.

Приведем пример приложения теоремы 2.73.

Пример 2.76. Пусть $a, b \in A$ — коммутирующие элементы произвольной (не обязательно коммутативной) банаховой алгебры. Покажем, что

$$r(a + b) \leq r(a) + r(b) \quad \text{и} \quad r(ab) \leq r(a)r(b).$$

Пусть B — замкнутая унитарная подалгебра в \tilde{A} , порожденная элементами a , b и 1 , тогда B — коммутативная унитарная банахова алгебра в силу предложения 2.7. Рассмотрим представление Гельфанда для алгебры B , а именно, унитарный гомоморфизм $\Gamma: B \rightarrow C(\Omega(B))$, $\Gamma: b \mapsto \hat{b}$. По теореме 2.73, имеем

$$\begin{aligned} r(a+b) &= \|\widehat{a+b}\|_\infty = \|\hat{a} + \hat{b}\|_\infty \leq \|\hat{a}\|_\infty + \|\hat{b}\|_\infty = r(a) + r(b); \\ r(ab) &= \|\widehat{ab}\|_\infty = \|\hat{a}\hat{b}\|_\infty \leq \|\hat{a}\|_\infty \|\hat{b}\|_\infty = r(a)r(b). \end{aligned}$$

Отметим, что без теоремы о представлении Гельфанда субаддитивность спектрального радиуса на коммутирующих элементах доказывается весьма громоздко.

Замечание 2.77. В общем случае, спектральный радиус не является ни субаддитивным, ни субмультипликативным. В качестве примера рассмотрим алгебру $M_2(\mathbb{C})$, и пусть

$$a = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

тогда $r(a) = r(b) = 0$ (обе матрицы нильпотентны), но $r(a+b) = r(ab) = 1$.

Пространство характеров можно воспринимать как обобщенный спектр благодаря следующему результату.

Теорема 2.78. Пусть B_a — банахова алгебра, порожденная 1 и некоторым элементом $a \in A$ унитарной банаховой алгебры A . Тогда B_a унитарна, коммутативна и отображение $\hat{a}: \Omega(B_a) \rightarrow \sigma(a)$, $\hat{a}: \tau \mapsto \tau(a)$, является гомеоморфизмом.

Доказательство. Алгебра B_a коммутативна в силу предложения 2.7. Непрерывность отображения \hat{a} обсуждалась непосредственно перед теоремой 2.73. Сюръективность содержится в теореме 2.73. Инъективность \hat{a} вытекает предложения 2.54, в соответствии с которым каждый характер на унитарной банаховой алгебре переводит единицу алгебры в 1 и, поэтому, если два характера совпадают на a , то они совпадают и на всей B_a . Наконец, гомеоморфность \hat{a} вытекает из того, что $\Omega(A)$ — компакт (см. теорему 2.63), а спектр $\sigma(a) \subset \mathbb{C}$ хаусдорфов. \square

Теорема 2.79. Пусть A — неунитарная банахова алгебра, порожденная некоторым элементом $a \in X$ банаховой алгебры X . Тогда A коммутативна и отображение $\hat{a}: \Omega(A) \rightarrow \sigma(a) \setminus \{0\}$, $\hat{a}: \tau \mapsto \tau(a)$, является гомеоморфизмом.

Доказательство. Алгебра A коммутативна в силу предложения 2.7. Пусть \tilde{A} — унитаризация A , тогда, в обозначениях замечания 2.74, отображение $\hat{a}: \Omega(\tilde{A}) \rightarrow \sigma(a)$ является гомеоморфизмом в силу теоремы 2.78. В разделе 2.7.3 мы объяснили, что $\Omega(A)$ можно отождествить с $\Omega(\tilde{A}) \setminus \{\tilde{\tau}_\infty\}$, где $\tilde{\tau}_\infty: \tilde{A} \rightarrow \mathbb{C}$ — канонический гомоморфизм, причем это отождествление является гомеоморфизмом с образом в $*$ -слабой топологии. В замечании 2.74 мы также выяснили, что отображения \hat{a} и \hat{a} согласованы в том смысле, что \hat{a} равно ограничению \hat{a} на $\Omega(A) \subset \Omega(\tilde{A})$. Так как $\hat{a}(\tilde{\tau}_\infty) = \tilde{\tau}_\infty(\tilde{a}) = 0$, то заключаем, что \hat{a} — гомеоморфизм между $\Omega(A)$ и $\sigma(a) \setminus \{0\}$. \square

Тема 3

Элементы теории C^* -алгебр

План. Инволюция или сопряжение на алгебре, самосопряженное подмножество, инволютивная или $*$ -алгебра, $*$ -подалгебра $*$ -алгебры; $*$ -подалгебра, порожденная данным подмножеством; самосопряженный или эрмитов элемент, вещественное подпространство всех эрмитовых элементов, разложение каждого элемента $*$ -алгебры на эрмитовы элементы (вещественную и мнимую части), эрмитовость произведения элемента и его сопряженного, нормальные элементы; $*$ -подалгебра, порожденная нормальным элементом; инволюция в унитарной $*$ -алгебре коммутирует со взятием обратного элемента и неподвижна на единице, проектор; эрмитовость элемента, обратного к эрмитову; элемент-изометрия, элемент-коизометрия, унитарный элемент, мультипликативная группа унитарных элементов, равенство обратного к унитарному элементу его сопряженному, $*$ -гомоморфизм и $*$ -изоморфизм, ядро и образ $*$ -гомоморфизма, $*$ -гомоморфизмы сохраняют эрмитовость элементов, факторизация $*$ -алгебры по самосопряженному идеалу, унитарный $*$ -гомоморфизм, унитарный $*$ -гомоморфизм сохраняет унитарность, автоморфизм $*$ -алгебры, автоморфизм унитарной $*$ -алгебры, внутренний автоморфизм унитарной $*$ -алгебры, действие мультипликативной группы унитарных элементов унитарной $*$ -алгебры на этой алгебре, унитарно эквивалентные элементы, равенство спектров унитарно эквивалентных элементов, нормированная $*$ -алгебра, банахова $*$ -алгебра, оценка норм вещественной и мнимой частей элементов нормированной $*$ -алгебры, банаховость вещественного подпространства всех эрмитовых элементов банаховой $*$ -алгебры, унитарная банахова $*$ -алгебра, унитарность экспоненты от элемента, полученного умножением эрмитова элемента на мнимую единицу, C^* -алгебра, определяющее свойство C^* -алгебры, унитарная C^* -алгебра, C^* -подалгебра, норма единицы и унитарного элемента, спектр унитарного элемента, примеры C^* -алгебр, прямая сумма и ограниченная прямая сумма C^* -алгебр, совпадения спектрального радиуса с нормой эрмитова элемента, невырожденность спектра ненулевого эрмитова элемента, равенство нулю нильпотентного эрмитова элемента; единственность нормы, превращающей $*$ -алгебру в C^* -алгебру; унитаризация банаховой $*$ -алгебры, невыполнение определяющего свойства C^* -алгебры для стандартной нормы на унитаризации, унитаризация C^* -алгебры, продолжение $*$ -гомоморфизма C^* -алгебр на их унитаризации, 1-липшицевость $*$ -гомоморфизма из $*$ -банаховой алгебры в C^* -алгебру, вещественность спектров эрмитовых элементов C^* -алгебры, уважение инволюции характерами коммутативной C^* -алгебры, непустота спектра ненулевой C^* -алгебры, теорема Гельфанда о представлении Гельфанда для коммутативной C^* -алгебры; C^* -подалгебра, порожденная данным подмножеством C^* -алгебры; коммутативность и нормальность всех элементов C^* -подалгебры, порожденной нормальным элементом C^* -алгебры; совпадение спектров унитарной C^* -алгебры и любой ее C^* -подалгебры, содержащей единицу; равенство нормы и спектрального радиуса у нормального элемента C^* -алгебры; представление унитарного элемента со спектром, отличным от окружности, в виде экспоненты эрмитова элемента, умноженного на мнимую единицу.

Мы определим C^* -алгебры в три шага: зададим алгебры с инволюцией, затем добавим банаховость, что приведет еще и к двум другим, помимо полноты, дополнительным свойствам нормы (одно из них накладывается на нормированные алгебры, другое — новое; такие алгебры называются банаховыми $*$ -алгебрами), и, наконец, наложим на норму еще одно важное ограничение, в результате, придем к C^* -алгебрам.

3.1 Алгебры с инволюцией или $*$ -алгебры

Инволюцией или *сопряжением* алгебры A называется такое отображение $a \mapsto a^*$ алгебры A в себя, которое

- является сопряженно линейным, то есть $(\lambda a + \mu b)^* = \bar{\lambda} a^* + \bar{\mu} b^*$ для всех $a, b \in A$ и $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$,
- удовлетворяет $a^{**} := (a^*)^* = a$, и
- $(ab)^* = b^* a^*$.

Алгебра A , на которой задана инволюция $*$, называется *инволютивной* или *$*$ -алгеброй*. Элемент a^* называется *сопряженным с a* .

Всюду ниже, если не оговорено противное, A обозначает некоторую $*$ -алгебру.

Подмножество $S \subset A$ называется *самосопряженным*, если $S^* := \{a^* : a \in S\} = S$. Всякая самосопряженная подалгебра в A является $*$ -алгеброй и называется *$*$ -подалгеброй*. Отметим также, что пересечение любого набора $*$ -алгебр — снова $*$ -алгебра, поэтому для каждого множества $S \subset A$ определена наименьшая $*$ -подалгебра, содержащая S , которая называется *порожденной S* .

Элемент $a \in A$ называется *самосопряженным* или *эрмитовым*, если $a^* = a$. Множество всех эрмитовых элементов обозначим A_{sa} .

Предложение 3.1. Множество A_{sa} является вещественным линейным подпространством в A .

Доказательство. Действительно, для любых $a, b \in A_{sa}$ и любых $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ имеем

$$(\lambda a + \mu b)^* = \lambda a^* + \mu b^* = \lambda a + \mu b,$$

что и требовалось. \square

Предложение 3.2. Пусть A — это *-алгебра. Тогда для каждого $a \in A$ существуют и единственны эрмитовы элементы $b, c \in A_{sa}$ такие, что $a = b + ic$, а именно, $b = (a + a^*)/2$ и $c = (a - a^*)/(2i)$.

Доказательство. Действительно, b и c , очевидно, подходят. Для доказательства единственности заметим, что $a^* = b^* - ic^* = b - ic$, откуда и вытекают приведенные выше формулы для b и c . \square

Эрмитовы элементы b и c в разложении из предложения 3.2 назовем соответственно **вещественной** и **мнимой частями** элемента a .

Предложение 3.3. Пусть A — это *-алгебра. Тогда для каждого $a \in A$ элементы aa^* и a^*a — эрмитовы.

Доказательство. Имеем $(aa^*)^* = a^{**}a^* = aa^*$. Аналогично доказывается эрмитовость a^*a . \square

Элемент $a \in A$ называется **нормальным**, если $a^*a = aa^*$.

Задача 3.4. Пусть A — это *-алгебра и $a \in A$ — нормальный элемент. Покажите, что порожденная им *-подалгебра коммутативна и совпадает с линейной оболочкой элементов вида $a^m(a^*)^n$, где m и n — неотрицательные целые, одновременно не обращающиеся в 0. Аналогично, для унитарной *-алгебры A и любого ее нормального элемента a унитарная *-подалгебра, порожденная a , совпадает с линейной оболочкой элементов вида $a^m(a^*)^n$, где m и n — неотрицательные целые (если $m = n = 0$, то $a^m(a^*)^n = 1$).

Следующее важное для дальнейшего утверждение очевидно.

Предложение 3.5. Пусть A — произвольная *-алгебра, $a \in A$ — нормальный элемент, и $P(a, a^*)$ — комплексный многочлен, имеющий нулевой свободный член. Тогда $P(a, a^*)$ — нормальный элемент в A . Если же A — унитарная *-алгебра, то в качестве $P(a, a^*)$ можно взять произвольный комплексный многочлен, не обязательно с нулевым свободным членом. И снова $P(a, a^*)$ — нормальный элемент из A . Таким образом, (унитарная) *-подалгебра в (унитарной) *-алгебре A , порожденная нормальным элементом, состоит из нормальных элементов алгебры A .

Предложение 3.6. Пусть A — унитарная *-алгебра, тогда инволюция коммутирует со взятием обратного элемента, т.е. для любого $a \in A$ выполняется $(a^*)^{-1} = (a^{-1})^*$, в частности, $1^* = 1$.

Доказательство. Покажем сначала, что $1^* = 1$. Имеем

$$1^* = 1 \cdot 1^* = (1 \cdot 1^*)^* = (1^*)^* = 1.$$

Далее, пусть $a \in \text{Inv}(A)$, тогда $1 = (a^{-1}a)^* = a^*(a^{-1})^*$ и, аналогично, $(a^{-1})^*a^* = 1$, откуда и вытекает требуемое. \square

Элемент $p \in A$ называется **проектором**, если $p = p^* = p^2$. Из сказанного выше вытекает, что 1 унитарной алгебры является проектором.

Задача 3.7. Приведите пример проектора в неунитарной алгебре.

Следствие 3.8. Пусть a — обратимый эрмитов элемент унитарной *-алгебры A , тогда элемент a^{-1} — также эрмитов.

Доказательство. По предложению 3.6,

$$(a^{-1})^* = (a^*)^{-1} = a^{-1},$$

что и требовалось. \square

Элемент $a \in A$ унитарной *-алгебры называется

- **изометрией**, если $a^*a = 1$,
- **коизометрией**, если $aa^* = 1$,
- **унитарным**, если $aa^* = a^*a = 1$, т.е. если он одновременно — изометрия и коизометрия.

Предложение 3.9. Множество $U(A)$ всех унитарных элементов *-алгебры A образуют подгруппу (по умножению) в группе $\text{Inv}(A)$ всех обратимых элементов. При этом, для унитарного элемента обратный к нему равен сопряженному.

Доказательство. То, что 1 — унитарный элемент фактически доказано в предложении 3.6. То, что все унитарные элементы обратимы и для них обратный равен сопряженному есть мгновенное следствие определения.

Покажем, что $U(A)$ замкнуто относительно умножения. Пусть $a, b \in U(A)$, тогда $ab(ab)^* = abb^*a^* = 1$ и, аналогично, $(ab)^*ab = 1$, поэтому $ab \in U(A)$.

Наконец, проверим, что переход к обратному элементу сохраняет унитарность элемента. Пусть $a \in U(A)$. Тогда $a^{-1}(a^{-1})^* = a^{-1}(a^*)^{-1} = (a^*a)^{-1} = 1$, где первое равенство вытекает из предложения 3.6 (взятие обратного элемента коммутирует с сопряжением). Аналогично, $(a^{-1})^*a^{-1} = 1$, что и требовалось. \square

Гомоморфизм *-алгебр $\varphi: A \rightarrow B$, сохраняющий сопряжение, т.е. $\varphi(a^*) = (\varphi(a))^*$ для всех $a \in A$, называется ***-гомоморфизмом**. Если φ при этом биективен, то он называется ***-изоморфизмом**. Отметим, что для *-гомоморфизма φ ядро $\ker \varphi$ — самосопряженный идеал в A , а образ $\varphi(A)$ — это *-подалгебра в B .

Предложение 3.10. Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ является *-гомоморфизмом *-алгебр, тогда для каждого эрмитова $a \in A$ элемент $\varphi(a) \in B$ — также эрмитов. Таким образом, $\varphi(A_{sa}) \subset B_{sa}$.

Доказательство. Так как $a^* = a$ и φ сохраняет сопряжение, имеем $\varphi(a) = \varphi(a^*) = \varphi(a)^*$, что и требовалось. \square

Примером *-гомоморфизма является факторизация по идеалу. Следующее предложение проверяется непосредственно.

Предложение 3.11. Пусть A — произвольная *-алгебра, а $I \subset A$ — самосопряженный идеал. Тогда A/I является *-алгеброй с инволюцией $(a+I)^* = a^*+I$, а каноническая проекция $\pi: A \rightarrow A/I$ — *-гомоморфизмом.

Унитарным *-гомоморфизмом называется *-гомоморфизм унитарных *-алгебр $\varphi: A \rightarrow B$, сохраняющий единицу, т.е. $\varphi(1) = 1$.

Предложение 3.12. Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ — унитарный *-гомоморфизм унитарных *-алгебр. Тогда φ сохраняет унитарность элементов: если $a \in A$ — унитарный, то $\varphi(a) \in B$ — также унитарный.

Доказательство. Применим к равенству $a^*a = aa^* = 1$ гомоморфизм φ и воспользуемся тем, что он сохраняет сопряжение и 1 . Имеем

$$1 = \varphi(1) = \varphi(a^*a) = \varphi(a^*)\varphi(a) = \varphi(a)^*\varphi(a) = \varphi(a)\varphi(a)^*,$$

что и требовалось. \square

Автоморфизмом *-алгебры A называется *-изоморфизм $\varphi: A \rightarrow A$. Если алгебра A еще и унитарна, то ее **автоморфизмом** называется унитарный *-изоморфизм.

Предложение 3.13. Пусть A — унитарная *-алгебра, а $u \in A$ — унитарный элемент. Тогда отображение $\text{Ad}_u: a \mapsto uau^*$ является автоморфизмом.

Доказательство. Линейность отображения Ad_u очевидна. Биективность следует из того, что Ad_{u^*} — отображение, обратное к Ad_u . Далее, $\text{Ad}_u(1) = u1u^* = uu^* = 1$ и $\text{Ad}_u(ab) = uabu^* = uau^*ubu^* = \text{Ad}_u(a)\text{Ad}_u(b)$. Таким образом, Ad сохраняет 1 и умножение. Наконец, $\text{Ad}_u(a^*) = ua^*u^* = (uau^*)^* = (\text{Ad}_u(a))^*$. Таким образом, Ad_u сохраняет сопряжение. \square

Описанный в предложении 3.13 автоморфизм Ad_u называется **внутренним**.

Предложение 3.14. Пусть A — унитарная *-алгебра, тогда отображение Ad задает действие мультипликативной группы $U(A)$ унитарных элементов на алгебре A .

Доказательство. Пусть $u, v \in U(A)$ и $a \in A$, тогда $\text{Ad}_{uv}(a) = vva(uv)^* = u(vav^*)u^* = \text{Ad}_u(\text{Ad}_v(a))$, откуда $\text{Ad}_{uv} = \text{Ad}_u \text{Ad}_v$. Кроме того, $\text{Ad}_1(a) = 1a1^* = a$, так что Ad_a — тождественное отображение. Последнее завершает доказательство предложения. \square

Из предложения 3.14 вытекает, что Ad разбивает A на орбиты этого действия. Элементы a и b , попавшие в одну орбиту, то есть связанные равенством $b = uau^*$ для некоторого унитарного u , называются **унитарно эквивалентными**.

Предложение 3.15. Пусть A — унитарная *-алгебра, и $a, b \in A$ — унитарно эквивалентные элементы. Тогда $\sigma(a) = \sigma(b)$.

Доказательство. Действительно, $b = uau^*$ и $a = u^*bu$ для некоторого унитарного u . Так как $u, u^* \in \text{Inv}(A)$, а $\text{Inv}(A)$ — группа по умножению, то a и b одновременно или обратимы, или необратимы. Так как при всех $\lambda \in \mathbb{C}$

$$b - \lambda 1 = uau^* - \lambda 1 = uau^* - u\lambda 1u^* = u(a - \lambda 1)u^*,$$

то $b - \lambda 1$ и $a - \lambda 1$ также являются унитарно эквивалентными и, значит, одновременно или обратимы, или необратимы, откуда и вытекает равенство $\sigma(a) = \sigma(b)$. \square

3.2 Нормированные и банаховы *-алгебры

Напомним, что нормированная алгебра A — это алгебра с субмультипликативной нормой. Если в дополнение на алгебре задана инволюция, уважающая норму, т.е. $\|a\| = \|a^*\|$ для всех $a \in A$, то такая A называется **нормированной *-алгеброй**. Если при этом алгебра еще и банахова, то она называется **банаховой *-алгеброй**. Итак, нормированная (банахова) *-алгебра является одновременно нормированной (банаховой) алгеброй и *-алгеброй, причем норма уважает сопряжение.

Уточним предложение 3.2 в случае нормированных *-алгебр.

Предложение 3.16. Пусть A — нормированная *-алгебра, $a \in A$, и $b, c \in A_{sa}$ — эрмитовы элементы, для которых $a = b + ic$. Тогда $\|b\| \leq \|a\|$ и $\|c\| \leq \|a\|$.

Доказательство. Имеем

$$\|b\| \leq \frac{1}{2}(\|a\| + \|a^*\|) = \frac{1}{2}(\|a\| + \|a\|) = \|a\|$$

и, аналогично, $\|c\| \leq \|a\|$, что и требовалось. \square

Уточним предложение 3.1 в случае банаховых *-алгебр.

Предложение 3.17. Пусть A — произвольная банахова *-алгебра. Тогда множество A_{sa} всех эрмитовых элементов в A является вещественным банаховым подпространством в A .

Доказательство. То, что A_{sa} — вещественное подпространство, было доказано в предложении 3.1. Рассмотрим произвольную фундаментальную последовательность $a_n \in A_{sa}$. Так как пространство A — банахово, существует $a \in A$ такое, что $a_n \rightarrow a$. Покажем, что $a = a^*$, т.е. $a \in A_{sa}$, чем и завершим доказательство. Имеем

$$\|a^* - a_n^*\| = \|(a - a_n)^*\| = \|a - a_n\| \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty,$$

поэтому $a_n = a_n^* \rightarrow a^*$ и $a_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$, откуда $a^* = a$, так как A — хаусдорфово пространство. \square

Предложение 3.18. Пусть A — произвольная нормированная, в частности, банахова, *-алгебра и $a \in A$. Тогда $\|a^*a\| \leq \|a\|^2$.

Доказательство. Действительно, так как алгебра A нормированная, то $\|a^*a\| \leq \|a^*\| \|a\|$. Так как A — нормированная *-алгебра, то $\|a\| = \|a^*\|$, что и требовалось. \square

Если в банаховой *-алгебре есть еще и 1, т.е. она является унитарной *-алгеброй, то, при дополнительном условии $\|1\| = 1$ алгебра A называется **унитарной банаховой *-алгеброй**.

Пример 3.19. Приведем важный пример унитарного элемента в унитарной банаховой $*$ -алгебре A . В разделе 2.5 мы определили экспоненту элемента произвольного элемента $a \in A$ (даже в случае, когда A — унитарная банахова алгебра). Напомним, что $e^a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$. Кроме того, по теореме 2.51, для коммутирующих $a, b \in A$ имеем $e^{a+b} = e^a e^b$. Отсюда вытекает, что $e^{ia} e^{-ia} = e^0 = 1 = e^{-ia} e^{ia}$, т.е. $(e^{ia})^{-1} = e^{-ia}$. С другой стороны, из свойств инволюции вытекает, что для всякого $b \in A$ имеем $(ib)^* = -ib^*$ и $(e^b)^* = \sum_{n=0}^{\infty} (b^*)^n$, откуда

$$(e^{ia})^* = \sum_{n=0}^{\infty} ((ia)^*)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-ia^*)^n = e^{-ia^*}$$

Пусть теперь a — эрмитов элемент, т.е. $a^* = a$, тогда $(e^{ia})^* = e^{-ia} = (e^{ia})^{-1}$, поэтому e^{ia} — унитарный элемент алгебры A .

Итак, мы доказали следующий результат.

Предложение 3.20. Пусть A — унитарная банахова $*$ -алгебра и $a \in A$ — эрмитов элемент. Тогда элемент $e^{ia} \in A$ — унитарный.

3.3 C^* -алгебры

Дадим наконец определение C^* -алгебры. А именно, C^* -алгебра A — это банахова $*$ -алгебра с дополнительным условием $\|aa^*\| = \|a\|^2$ для всех $a \in A$. Это последнее условие будем называть *определяющим для C^* -алгебры*. Отметим, что так как сопряжение согласовано с нормой, для C^* -алгебры выполняется $\|a^*a\| = \|a\|^2$, так что определяющее условие можно писать и как $\|a^*a\| = \|a\|^2$, и как $\|aa^*\| = \|a^*a\| = \|a\|^2$.

Далее, если C^* -алгебра A содержит единицу 1 , то такую A будем называть *унитарной C^* -алгеброй*. Отметим, что, в отличие от унитарных $*$ -банаховых алгебр, для C^* -алгебры мы не требуем, чтобы $\|1\| = 1$. Тем не менее, последнее свойство непосредственно вытекает из определяющего свойства C^* -алгебр, см. предложение 3.21 ниже.

Отметим также следующее очевидное свойство C^* -алгебр: замкнутая $*$ -алгебра в C^* -алгебре является C^* -алгеброй (называем их *C^* -подалгебрами*).

Предложение 3.21. Пусть A — унитарная C^* -алгебра, в которой $0 \neq 1$, и $u \in A$ — унитарный элемент. Тогда

- (1) $\|1\| = 1$,
- (2) $\|u\| = 1$, u
- (3) $\sigma(u) \subset S^1 \subset \mathbb{C}$, где S^1 — единичная окружность с центром в нуле.

Доказательство. (1) Так как сопряжение согласовано с нормой, имеем $\|1\| = \|1^*\| = \|1^*1\|$. Так как A — это C^* -алгебра, то выполняется $\|1^*1\| = \|1\|^2$. Таким образом, $\|1\| = \|1\|^2$. По предположению, $0 \neq 1$ и, значит, $\|1\| \neq 0$, поэтому $\|1\| = 1$.

(2) Так как A — это C^* -алгебра, имеем $\|u\|^2 = \|uu^*\|$. Так как элемент u — унитарный, то $uu^* = 1$. По предыдущему пункту, $\|1\| = 1$, откуда $\|u\|^2 = \|uu^*\| = \|1\| = 1$, и, значит, $\|u\| = 1$, так как $\|u\| \geq 0$.

(3) Пусть $\lambda \in \sigma(u)$. Тогда, по предложению 2.31, имеем $\lambda^{-1} \in \sigma(u^{-1}) = \sigma(u^*)$. В силу следствия 2.49, справедливо $|\lambda| \leq \|u\| = 1$ (см. предыдущий пункт) и, аналогично, $|\lambda^{-1}| \leq \|u^*\| = 1$, поэтому $|\lambda| = 1$, так что $\lambda \in S^1$. \square

Пример 3.22. Приведем некоторые примеры C^* -алгебр. Простейшим примером является само поле \mathbb{C} с инволюцией, заданной сопряжением.

- Пространство $\mathcal{B}(S)$ всех ограниченных комплекснозначных функций на множестве S .
- Пространство $C_b(X) \subset \mathcal{B}(X)$ всех непрерывных ограниченных комплекснозначных функций на топологическом пространстве X .
- Подпространство $C_0(X) \subset C_b(X)$ всех непрерывных функций $f: X \rightarrow \mathbb{C}$, заданных на хаусдорфовом локально компактном топологическом пространстве X и обращающихся в нуль на бесконечности.

- Подпространство $\mathcal{B}^\infty(\Omega) \subset \mathcal{B}(\Omega)$, состоящее из всех измеримых функций $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, заданных на измеримом пространстве Ω .
- Пространство $L^\infty(\mu)$ классов эквивалентности существенно ограниченных комплекснозначных функций на измеримом пространстве $(\Omega, \mathcal{S}, \mu)$ с мерой μ .
- Пространство $\mathcal{B}(H)$ ограниченных линейных операторов на комплексном гильбертовом пространстве H .

Предложение 3.23. Если $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — произвольное семейство C^* -алгебр, то прямая сумма $A := \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ с покомпонентной инволюцией $(a_\lambda)^* := (a_\lambda^*)$ — тоже C^* -алгебра, а ограниченная сумма $A^{c_0} := \bigoplus_{\lambda \in \Lambda}^{c_0} A_\lambda$ — ее замкнутый самосопряженный идеал.

Доказательство. По предложению 2.11, A является банаховой алгеброй. Равенство $\|a\| = \|a^*\|$ следует из равенств $\|a_\lambda\| = \|a_\lambda^*\|$, выполненных для каждой компоненты, поэтому A — $*$ -алгебра. Проверим, что для любого $a \in A$ выполняется $\|aa^*\| = \|a\|^2$. Действительно, если $a = (a_\lambda)$, то $aa^* = (a_\lambda a_\lambda^*)$ и

$$\|aa^*\| = \sup \|a_\lambda a_\lambda^*\| = \sup \|a_\lambda\|^2 = (\sup \|a_\lambda\|)^2 = \|a\|^2,$$

что и требовалось. В силу задачи 2.13, A^{c_0} является замкнутым идеалом в A . Его самосопряженность вытекает из того, что $\|a_\lambda^*\| = \|a_\lambda\|$ для всех λ . \square

Задача 3.24. Докажите следующие утверждения.

- (1) Пусть S — непустое множество, A — некоторая C^* -алгебра, тогда $\mathcal{B}(S, A)$ — семейство всех ограниченных комплекснозначных отображений из S в A — тоже C^* -алгебра (с поточечной инволюцией).
- (2) Если X — локально компактное хаусдорфово топологическое пространство, то $C_0(X, A)$ является C^* -подалгеброй в $\mathcal{B}(X, A)$.

Напомним, что, в силу следствия 2.49, для банаховой алгебры A и любого ее элемента $a \in A$ выполняется $r(a) \leq \|a\|$.

Теорема 3.25. Если a — эрмитов элемент C^* -алгебры A , то $r(a) = \|a\|$.

Доказательство. Так как $\|a^2\| = \|aa^*\| = \|a\|^2$, то, по индукции, $\|a^{2^n}\| = \|a\|^{2^n}$. В силу теоремы 2.42 Бёрлинга,

$$r(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^{2^n}\|^{1/2^n} = \|a\|,$$

что и требовалось. \square

Следствие 3.26. Если a — эрмитов элемент C^* -алгебры A . Тогда $\sigma(a) = \{0\}$, если и только если $a = 0$.

Доказательство. Если $a = 0$, то $\sigma(a) = \{0\}$. Докажем обратное утверждение. Пусть $\sigma(a) = \{0\}$. По определению $r(a)$ и в силу теоремы 3.25, имеем $0 = r(a) = \|a\|$, откуда $a = 0$. \square

Следствие 3.27. Если a — эрмитов элемент C^* -алгебры A такой, что для некоторого $n \in \mathbb{N}$ выполняется $a^n = 0$, то $a = 0$.

Доказательство. По теореме 2.32, имеем $\sigma(a^n) = \{0\} = (\sigma(a))^n$, откуда $\sigma(a) = \{0\}$. Осталось применить следствие 3.26. \square

Следствие 3.28. На $*$ -алгебре существует не более одной нормы, превращающей ее в C^* -алгебру.

Доказательство. Пусть $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ — нормы на $*$ -алгебре A , превращающие ее в C^* -алгебры. Тогда для произвольного $a \in A$ имеем

$$\|a\|_j^2 = \|a^*a\|_j = r(a^*a) = \sup_{\lambda \in \sigma(a^*a)} |\lambda|, \quad j = 1, 2,$$

поэтому $\|a\|_1 = \|a\|_2$. \square

Напомним, что банахова алгебра A превращается в C^* -алгебру, если

- на A задана инволюция $a \mapsto a^*$, которая не меняет норму, т.е. является изометрией, и

- выполняется $\|a^*a\| = \|a\|^2$ для всех $a \in A$.

Оказывается, вместо этих двух свойств можно рассмотреть некоторое одно, а именно, имеет место следующий результат.

Лемма 3.29. Пусть A — банахова алгебра, снабженная такой инволюцией $a \mapsto a^*$, что $\|a\|^2 \leq \|a^*a\|$ при каждом $a \in A$. Тогда A является C^* -алгеброй.

Доказательство. Воспользуемся субмультипликативностью нормы банаховой алгебры:

$$(3.1) \quad \|a\|^2 \leq \|a^*a\| \leq \|a^*\| \|a\|.$$

Если $a \neq 0$, то получаем $\|a\| \leq \|a^*\|$. Если $a = 0$, то имеет место то же самое неравенство. Меняя местами a и a^* и пользуясь инволютивностью сопряжения, получаем обратное неравенство, что влечет $\|a\| = \|a^*\|$. Подставляя в правую часть (3.1) вместо нормы $\|a^*\|$ равную ей норму $\|a\|$, заключаем, что $\|a\|^2 = \|a^*a\|$. \square

3.3.1 Унитаризация банаховой $*$ -алгебры и C^* -алгебры

В разделе 2.1.6 мы определили унитаризацию \tilde{A} банаховой алгебры A . В качестве нормы элемента унитаризации (a, λ) мы выбрали $\|a\| + |\lambda|$. Чтобы не привести к путанице в дальнейшем, эту норму в данном разделе будем обозначать $\|\cdot\|_1$.

Определим **унитаризацию банаховой $*$ -алгеброй** A . В качестве \tilde{A} выберем то же самое, что и в случае банаховых алгебр, а инволюцию зададим так: $(a, \lambda)^* = (a^*, \bar{\lambda})$. Тогда

$$\|(a, \lambda)^*\|_1 = \|(a^*, \bar{\lambda})\|_1 = \|a^*\| + |\bar{\lambda}| = \|a\| + |\lambda| = \|(a, \lambda)\|_1.$$

Таким образом, \tilde{A} также является банаховой $*$ -алгеброй. Кроме того, $\|(0, 1)\|_1 = |1| = 1$, так что \tilde{A} — унитарная банахова $*$ -алгебра. Отметим, что для каждого $(a, 0) \in A$ (мы отождествляем A с его образом в \tilde{A}) выполняется $(a, 0)^* = (a^*, 0) \in A$. Таким образом, A — самосопряженный идеал в \tilde{A} .

Замечание 3.30. Если A была C^* -алгеброй, то описанная конструкция \tilde{A} , вообще говоря, не приводит к C^* -алгебре. Действительно, пусть $A = \mathbb{C}$, $(a, \lambda) = (-2, 1)$, тогда $\|(a, \lambda)\|_1 = 3$, откуда $\|(a, \lambda)\|_1^2 = 9$. Однако

$$\|(a, \lambda)^*(a, \lambda)\|_1 = \|(-2, 1)(-2, 1)\|_1 = \|(4 - 2 - 2, 1)\|_1 = \|(0, 1)\|_1 = 1 \neq 9.$$

Оказывается, для C^* -алгебры A алгебру \tilde{A} все-таки можно снабдить нормой, превращающей ее в C^* -алгебру, при этом такая норма однозначно определена (см. следствие 3.28). Приведем соответствующую конструкцию.

Конструкция 3.31. Пусть сначала A — нормированная алгебра и \tilde{A} — ее унитаризация, построенная выше. Алгебра \tilde{A} действует умножениями (правыми и левыми) на A , при этом каждое умножение, в силу дистрибутивности, является линейным отображением. Для $(a, \lambda) \in \tilde{A}$ обозначим $L_{(a, \lambda)}$ и $R_{(a, \lambda)}$ соответствующее левое и правое умножения на A , т.е. для каждого $b \in A$ положим

$$\begin{aligned} L_{(a, \lambda)}(b) &= (a, \lambda)b = (a, \lambda)(b, 0) = (ab + \lambda b, 0) = ab + \lambda b, \\ R_{(a, \lambda)}(b) &= b(a, \lambda) = (b, 0)(a, \lambda) = (ba + \lambda b, 0) = ba + \lambda b. \end{aligned}$$

Так как

$$\|L_{(a, \lambda)}\| = \sup_{\|b\| \leq 1} \|ab + \lambda b\| \leq \|a\| + |\lambda| < \infty, \quad \text{и} \quad \|R_{(a, \lambda)}\| = \sup_{\|b\| \leq 1} \|ba + \lambda b\| \leq \|a\| + |\lambda| < \infty,$$

то эти операторы — ограниченные, т.е. $L_{(a, \lambda)}, R_{(a, \lambda)} \in \mathcal{B}(A)$. Тем самым, мы построили отображения

$$L: \tilde{A} \rightarrow \mathcal{B}(A) \quad \text{и} \quad R: \tilde{A} \rightarrow \mathcal{B}(A), \quad L: (a, \lambda) \mapsto L_{(a, \lambda)}, \quad R: (a, \lambda) \mapsto R_{(a, \lambda)}.$$

Лемма 3.32. Отображения L и R — линейные.

Доказательство. Докажем лемму только для L , так как для R рассуждения вполне аналогичны. Имеем

$$\begin{aligned} L_{\mu(a,\lambda)}(c) &= L_{(\mu a, \mu \lambda)}(c) = \mu a c + \mu \lambda c = \mu(ac + \lambda c) = \mu L_{(a,\lambda)}(c), \\ L_{(a,\lambda)+(b,\mu)}(c) &= L_{(a+b, \lambda+\mu)}(c) = (a+b)c + (\lambda+\mu)c = (ac + \lambda c) + (bc + \mu c) = L_{(a,\lambda)}(c) + L_{(b,\mu)}(c), \end{aligned}$$

что и требовалось. \square

В силу задачи 1.10, алгебра $\mathcal{B}(A)$ с операторной нормой является нормированной алгеброй, т.е., напомним, для любых двух $L_1, L_2 \in \mathcal{B}(A)$ выполняется $\|L_1 L_2\| \leq \|L_1\| \|L_2\|$. Отсюда вытекает, что если на алгебре $\mathbb{C} \oplus \mathcal{B}(A) \oplus \mathcal{B}(A)$ с поточечными операциями рассмотреть норму $\|(\lambda, L, R)\| = \max\{|\lambda|, \|L\|, \|R\|\}$, то эта норма также будет субмультипликативна, т.е.

$$\|(\lambda_1, L_1, R_1)(\lambda_2, L_2, R_2)\| \leq \|(\lambda_1, L_1, R_1)\| \|(\lambda_2, L_2, R_2)\|.$$

Пусть теперь A является C^* -алгеброй. Рассмотрим отображение

$$\varphi: \tilde{A} \rightarrow \mathbb{C} \oplus \mathcal{B}(A) \oplus \mathcal{B}(A), \quad \varphi(a, \lambda) = (\lambda, L_{(a,\lambda)}, R_{(a,\lambda)}).$$

Это отображение линейно в силу леммы 3.32.

Лемма 3.33. *Отображение φ инъективно.*

Доказательство. Действительно, если $\varphi(a, \lambda) = (\lambda, L_{(a,\lambda)}, R_{(a,\lambda)}) = 0$, то $\lambda = 0$ и $L_{(a,\lambda)} = L_{(a,0)} = 0$, т.е. для любого $c \in A$ имеем $L_{(a,0)}(c) = ac = 0$. Если $a \neq 0$, то в качестве c возьмем $a^*/\|a\|$, тогда $\|ac\| = \|a^*a\|/\|a\| = \|a\|^2/\|a\| = \|a\| = 0$, откуда $a = 0$, противоречие. Значит $a = 0$, что и доказывает инъективность φ . \square

Таким образом, φ является вложением линейного пространства \tilde{A} в линейное пространство $\mathbb{C} \oplus \mathcal{B}(A) \oplus \mathcal{B}(A)$, и мы тем самым можем индуцировать норму с $\mathbb{C} \oplus \mathcal{B}(A) \oplus \mathcal{B}(A)$ на \tilde{A} . В явном виде,

$$\begin{aligned} (3.2) \quad \|(a, \lambda)\| &= \max\{|\lambda|, \|L_{(a,\lambda)}\|, \|R_{(a,\lambda)}\|\} = \sup_{\|c\| \leq 1} \left\{ |\lambda|, \|L_{(a,\lambda)}(c)\|, \|R_{(a,\lambda)}(c)\| \right\} = \\ &= \sup_{\|c\| \leq 1} \left\{ |\lambda|, \|(a, \lambda)(c, 0)\|, \|(c, 0)(a, \lambda)\| \right\} = \sup_{\|c\| \leq 1} \left\{ |\lambda|, \|ac + \lambda c\|, \|ca + \lambda c\| \right\}. \end{aligned}$$

Отметим, что **во всех формулах из (3.2) можно ограничиться $\|c\| = 1$.**

В силу сказанного выше, \tilde{A} с введенной нормой является нормированной алгеброй.

Лемма 3.34. *Имеем $\|(a, 0)\| = \|a\|$, так что вложение $A \rightarrow \tilde{A}$, $a \mapsto (a, 0)$ изометрично.*

Доказательство. Если $a = 0$, то равенство очевидно. Пусть теперь $a \neq 0$, тогда

$$\|(a, 0)\| = \sup_{\|c\|=1} \{0, \|ac\|\} \leq \|a\|,$$

и если взять в качестве c элемент $a^*/\|a\| = a^*/\|a\|$, то получим $\|(a, 0)\| \geq \|a a^*\|/\|a\| = \|a\|$, откуда и заключаем требуемое. \square

Лемма 3.35. *Имеем $\|(0, 1)\| = 1$.*

Доказательство. Распишем норму элемента $(0, 1)$: $\|(0, 1)\| = \sup_{\|c\| \leq 1} \{1, \|c\|\} = 1$, что и требовалось. \square

Таким образом, \tilde{A} с введенной нормой является унитарной нормированной алгеброй.

Лемма 3.36. *Для каждого $(a, \lambda) \in \tilde{A}$ выполняется $\|(a, \lambda)\| \leq \|(a, \lambda)\|_1$.*

Доказательство. Имеем

$$\|(a, \lambda)\| = \sup_{\|c\|=1} \{|\lambda|, \|ac + \lambda c\|, \|ca + \lambda c\|\} \leq \sup_{\|c\|=1} \{|\lambda|, \|a\| \|c\| + |\lambda| \|c\|\} = \|a\| + |\lambda| = \|(a, \lambda)\|_1,$$

что и требовалось. \square

Лемма 3.37. Для каждого $(a, \lambda) \in \tilde{A}$ выполняется $\|(a, \lambda)\|_1 \leq 3\|(a, \lambda)\|$.

Доказательство. Пусть сначала $a = 0$, тогда $\|(a, \lambda)\|_1 = |\lambda|$, а $\|(a, \lambda)\| = \sup_{\|c\|=1} \{|\lambda|, |\lambda c|\} = |\lambda|$, так что неравенство выполнено.

Пусть теперь $a \neq 0$. Тогда, с одной стороны, $\|(a, \lambda)\| = \sup_{\|c\| \leq 1} \{|\lambda|, \|ac + \lambda c\|, \|ca + \lambda c\|\} \geq |\lambda|$. С другой,

$$\begin{aligned} \|(a, \lambda)\| &= \sup_{\|c\|=1} \{|\lambda|, \|ac + \lambda c\|, \|ca + \lambda c\|\} \geq \sup_{\|c\|=1} \{|\lambda|, \|ac\| - \|\lambda c\|, \|ca\| - \|\lambda c\|\} = \\ &= \sup_{\|c\|=1} \{|\lambda|, \|ac\| - |\lambda|, \|ca\| - |\lambda|\} \geq \max\{|\lambda|, \|a^*a\|/\|a^*\| - |\lambda|\} = \max\{|\lambda|, \|a\| - |\lambda|\} \geq \|a\|/2, \end{aligned}$$

т.е. $2\|(a, \lambda)\| \geq \|a\|$. Таким образом,

$$3\|(a, \lambda)\| = 2\|(a, \lambda)\| + \|(a, \lambda)\| \geq \|a\| + |\lambda| = \|(a, \lambda)\|_1,$$

что и требовалось. \square

Следствие 3.38. Нормы $\|\cdot\|$ и $\|\cdot\|_1$ на \tilde{A} эквивалентны, в частности, \tilde{A} с нормой $\|\cdot\|$ также является банаховой.

Покажем теперь, что \tilde{A} с введенной нормой является также $*$ -банаховой алгеброй.

Лемма 3.39. Для каждого $(a, \lambda) \in \tilde{A}$ выполняется $\|(a, \lambda)^*\| = \|(a, \lambda)\|$.

Доказательство. Имеем

$$\|(a, \lambda)^*\| = \|(a^*, \bar{\lambda})\| = \sup_{\|c\|=1} \{|\bar{\lambda}|, \|a^*c + \bar{\lambda}c\|, \|ca^* + \bar{\lambda}c\|\} = \sup_{\|c^*\|=1} \{|\lambda|, \|c^*a + \lambda c^*\|, \|ac^* + \lambda c^*\|\} = \|(a, \lambda)\|,$$

что и требовалось. \square

Осталось проверить выполнение определяющего свойства C^* -алгебры.

Лемма 3.40. Для любого $(a, \lambda) \in \tilde{A}$ выполняется $\|(a, \lambda)^*(a, \lambda)\| = \|(a, \lambda)\|^2$.

Доказательство. Неравенство

$$\|(a, \lambda)^*(a, \lambda)\| \leq \|(a, \lambda)^*\| \|(a, \lambda)\| = \|(a, \lambda)\|^2$$

вытекает из того, что \tilde{A} одновременно и нормированная, и $*$ -алгебра. Докажем обратное неравенство.

Заметим, что

$$\begin{aligned} \|(a, \lambda)^*(a, \lambda)\| &= \sup_{\|c\|=1} \{|\lambda|^2, \|(a, \lambda)^*(a, \lambda)c\|, \|c(a, \lambda)^*(a, \lambda)\|\}, \\ \|(a, \lambda)\|^2 &= \sup_{\|c\|=1} \{|\lambda|^2, \|(a, \lambda)c\|^2, \|c(a, \lambda)\|^2\}, \end{aligned}$$

поэтому достаточно показать, что $\|(a, \lambda)^*(a, \lambda)c\| \geq \|(a, \lambda)c\|^2$ и $\|c(a, \lambda)^*(a, \lambda)\| \geq \|c(a, \lambda)\|^2$ выполняются для всех $c \in A$, $\|c\| = 1$. Докажем первое неравенство (второе доказывается аналогично). Имеем

$$\begin{aligned} \|(a, \lambda)^*(a, \lambda)c\| &= \|c^*\| \|(a, \lambda)^*(a, \lambda)c\| \geq \|c^*(a, \lambda)^*(a, \lambda)c\| = \|(c^*, 0)(a, \lambda)^*(a, \lambda)(c, 0)\| = \\ &= \left\| ((c^*, 0)(a, \lambda)^*)((a, \lambda)(c, 0)) \right\| = \left\| ((a, \lambda)(c, 0))^*((a, \lambda)(c, 0)) \right\| = \left\| ((a, \lambda)c)^*(a, \lambda)c \right\| = \|(a, \lambda)c\|^2, \end{aligned}$$

где второе неравенство — субмультипликативность в A , а последнее равенство выполнено так как A является C^* -алгеброй. \square

Итак, мы доказали следующую теорему.

Теорема 3.41. Определенная в формуле (3.2) норма $\|\cdot\|$ на унитализации \tilde{A} , построенной для C^* -алгебры A , превращает \tilde{A} в C^* -алгебру.

Теорема 3.42. Для каждой C^* -алгебры A на унитализации \tilde{A} существует и единственна норма, продолжающая норму на A и превращающая \tilde{A} в C^* -алгебру.

Доказательство. В силу следствия 3.28, если на $*$ -алгебре \tilde{A} есть норма, превращающая ее в C^* -алгебру, то такая норма единственна. Существование содержится в теореме 3.41. \square

В дальнейшем, под **нормой на \tilde{A}** будем понимать норму, заданную формулой (3.2). Доказательство следующего важного предложения тривиально.

Предложение 3.43. Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ — это $*$ -гомоморфизм C^* -алгебр, тогда он единственным образом продолжается до унитарного $*$ -гомоморфизма $\tilde{\varphi}: \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$.

3.4 Представление Гельфанда коммутативной C^* -алгебры

Докажем ряд важных вспомогательных утверждений.

Теорема 3.44. Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ — произвольный $*$ -гомоморфизм $*$ -баналовой алгебры A в C^* -алгебру B . Тогда φ не увеличивает норму.

Доказательство. Сразу предположим, что A и B унитарны, а φ — унитарный $*$ -гомоморфизм, так как иначе продолжим φ до единственного унитарного $*$ -гомоморфизма $\tilde{\varphi}: \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$, что можно сделать в силу предложения 3.43, и если для $\tilde{\varphi}$ утверждение верно, то оно также верно и для его ограничения φ . Далее, мы приведем цепочку неравенств, из которой и будет следовать результат.

- Так как B является C^* -алгеброй, то $\|\varphi(a)\|^2 = \|\varphi(a)^* \varphi(a)\|$.
- Так как φ — это $*$ -гомоморфизм, то $\|\varphi(a)^* \varphi(a)\| = \|\varphi(a^*) \varphi(a)\| = \|\varphi(a^* a)\|$.
- В силу предложения 3.3, элемент $a^* a$ эрмитов. Так как φ является $*$ -гомоморфизмом, то, по предложению 3.10, $\varphi(a^* a)$ — также эрмитов.
- Так как элемент $\varphi(a^* a)$ — эрмитов, то, по теореме 3.25, выполняется $\|\varphi(a^* a)\| = r(\varphi(a^* a))$.
- По следствию 2.40, имеем $r(\varphi(a^* a)) \leq r(a^* a)$.
- По следствию 2.49, выполняется $r(a^* a) \leq \|a^* a\|$.
- По предложению 3.18, имеем $\|a^* a\| \leq \|a\|^2$.

Собирая вместе все описанные выше неравенства, заключаем, что $\|\varphi(a)\|^2 \leq \|a\|^2$, откуда $\|\varphi(a)\| \leq \|a\|$, что и требовалось. \square

Теорема 3.45. Для C^* -алгебры A и любого ее эрмитова элемента $a \in A$ имеем $\sigma(a) \subset \mathbb{R}$.

Доказательство. Так как спектр элемента не унитарной алгебры равен спектру ее унитализации, то сразу будем считать алгебру A унитарной. Так как элемент a эрмитов, то, по предложению 3.20, элемент e^{ia} — унитарный. Но тогда, по предложению 3.21, $\sigma(e^{ia}) \subset S^1$.

Выберем произвольное $\lambda \in \sigma(a)$ и положим $b = \sum_{n=1}^{\infty} i^n (a - \lambda)^{n-1} / n!$. Тогда

$$e^{ia} - e^{i\lambda} = e^{i(a-\lambda+\lambda)} - e^{i\lambda} = e^{i(a-\lambda)} e^{i\lambda} - e^{i\lambda} = (e^{i(a-\lambda)} - 1) e^{i\lambda} = (a - \lambda) b e^{i\lambda}.$$

Так как $a - \lambda$ необратим и он, b и $e^{i\lambda}$ попарно коммутируют, то, в силу предложения 2.27, элемент $e^{ia} - e^{i\lambda}$ необратим, поэтому $e^{i\lambda} \in \sigma(e^{ia}) \subset S^1$, т.е. $|e^{i\lambda}| = 1$. Осталось заметить, что последнее равенство имеет место в точности для вещественных λ . \square

Теорема 3.46. Пусть A — коммутативная C^* -алгебра и $\tau \in \Omega(A)$ — ее характер. Тогда для каждого $a \in A$ выполняется $\tau(a^*) = \overline{\tau(a)}$, т.е. τ сохраняет отношение сопряженности.

Доказательство. В соответствии с предложением 3.2, существуют эрмитовы элементы $b, c \in A$, для которых $a = b + ic$. По предложению 2.54, $\tau(b) \in \sigma(b)$ и $\tau(c) \in \sigma(c)$, и так как b и c — эрмитовы, теорема 3.45 влечет, что $\tau(b)$ и $\tau(c)$ — вещественные числа. Поэтому

$$\tau(a^*) = \tau((b + ic)^*) = \tau(b^* - ic^*) = \tau(b - ic) = \tau(b) - i\tau(c) = \overline{\tau(b) + i\tau(c)} = \overline{\tau(a)}.$$

Отметим, что вещественность чисел $\tau(b)$ и $\tau(c)$ была использована в равенстве $\tau(b) - i\tau(c) = \overline{\tau(b) + i\tau(c)}$. Доказательство закончено. \square

В заключение данного раздела мы докажем теорему Гельфанда о представлении коммутативных C^* -алгебр. В соответствующей теореме 2.73, описывающей представление Гельфанда коммутативных банаховых алгебр, мы требовали, чтобы спектр алгебры был непуст. Когда алгебра унитарна, это условие выполняется автоматически в силу теоремы 2.55. Если же алгебра не унитарна, то спектр алгебры может быть пустым, например так у нулевой алгебры.

Предложение 3.47. Пусть A — ненулевая C^* -алгебра. Тогда ее спектр $\Omega(A)$ непуст.

Доказательство. По теореме 2.55, спектр унитарной алгебры непуст. Пусть теперь алгебра A не унитарна. Так как $A \neq \{0\}$, существует ненулевой $a \in A$, в частности, $\|a\| \neq 0$. Так как $\|a\| = \|a^*\|$, то a^* также ненулевой. Так как $\|a\|^2 = \|a a^*\| \neq 0$, то $a a^*$ — ненулевой элемент. По предложению 3.3, элемент $b := a a^*$ эрмитов. По теореме 3.25, имеем $\|b\| = r(b)$, так что $\sigma(b)$ содержит ненулевые числа. По теореме 2.61, $\sigma(b) = \{\tau(b) : \tau \in \Omega(A)\} \cup \{0\}$, и так как $\sigma(b) \neq \{0\}$, должен существовать характер $\tau \in \Omega(A)$, для которого $\tau(b) \neq 0$, так что $\Omega(A) \neq \emptyset$. \square

Сформулируем теперь и докажем теорему Гельфанда о представлении C^* -алгебр. Отметим, что в ее аналоге — теореме 2.73 — строится липшицев гомоморфизм, у которого, вообще говоря, есть ядро. В случае C^* -алгебр все обстоит намного лучше: этот гомоморфизм является изоморфизмом, т.е. не только имеет нулевое ядро, но и сюръективен. Кроме того, этот изоморфизм сохраняет сопряжение и норму. Таким образом, в теореме Гельфанда алгебра A фактически отождествляется с пространством $C_0(\Omega(A))$.

Теорема 3.48 (Гельфанд). Если A — ненулевая коммутативная C^* -алгебра, то представление Гельфанда

$$\Gamma: A \rightarrow C_0(\Omega(A)), \quad \Gamma: a \mapsto \hat{a},$$

является изометричным $*$ -изоморфизмом. Если при этом алгебра A унитарна, то пространство $\Omega(A)$ компактно, $C_0(\Omega(A)) = C(\Omega(A))$, и изоморфизм Γ — унитарный.

Доказательство. Из теоремы 2.73 вытекает, что Γ — гомоморфизм алгебр, не увеличивающий норму, причем $\|\Gamma(a)\| = \|\hat{a}\|_\infty = r(a)$ для каждого $a \in A$. Выберем произвольный характер $\tau \in \Omega(A)$, тогда, по определению отображения Γ , имеем $\Gamma(a^*)(\tau) = \tau(a^*)$. По теореме 3.46, каждый характер сохраняет отношение сопряженности, т.е.

$$\tau(a^*) = \overline{\tau(a)} = \overline{\Gamma(a)(\tau)} = \Gamma(a^*)(\tau),$$

где сопряжение в последнем выражении берется в C^* -алгебре $C_0(\Omega(A))$ (см. примеры 3.22). Итак, мы показали, что $\Gamma(a^*) = \Gamma(a)^*$, т.е. Γ сохраняет сопряжение и, значит, является $*$ -гомоморфизмом.

Далее, так как $C_0(\Omega(A))$ — это C^* -алгебра, имеем

$$\|\Gamma(a)\|^2 = \|\Gamma(a)^* \Gamma(a)\| = \|\Gamma(a^*) \Gamma(a)\| = \|\Gamma(a^* a)\| = r(a^* a).$$

По предложению 3.3, элемент $a^* a$ эрмитов, поэтому, в силу теоремы 3.25, $r(a^* a) = \|a^* a\| = \|a\|^2$, где последнее равенство — определяющее свойство C^* -алгебр. Таким образом, $\|\Gamma(a)\| = \|a\|$ для всех $a \in A$, поэтому Γ сохраняет норму, т.е. отображение Γ изометрично.

Покажем, что к образу $\Gamma(A)$ применима теорема 2.15 Вейерштрасса–Стоуна.

- Как мы уже отмечали, гомоморфный образ алгебры является подалгеброй.
- Покажем, что подалгебра $\Gamma(A)$ замкнута относительно сопряжений. Для этого заметим, что $\Gamma(a)$ переводит каждый характер τ в $\tau(a)$, поэтому надо проверить, что отображение $f: \Omega(A) \rightarrow \mathbb{C}$, $f: \tau \mapsto \tau(a)$ также содержится в $\Gamma(A)$ (оно равно $\Gamma(a^*)$). Но, как было отмечено выше, $\tau(a) = \tau(a^*)$, так что $f = \Gamma(a^*)$.

- Покажем, что $\Gamma(A)$ разделяет точки. Это означает, что для любых $\tau_1, \tau_2 \in \Omega(A)$, $\tau_1 \neq \tau_2$ существует такой $a \in A$, что $\Gamma(a)(\tau_1) \neq \Gamma(a)(\tau_2)$, то есть $\tau_1(a) \neq \tau_2(a)$. Но существование такого $a \in A$ равносильно тому, что $\tau_1 \neq \tau_2$ в A^* .
- Покажем, что $\Gamma(A)$ нигде не зануляется. Это означает, что для любого $\tau \in \Omega(A)$ существует $a \in A$ такой, что $\Gamma(a)(\tau) \neq 0$, то есть $\tau(a) \neq 0$. Последнее верно, так как в $\Omega(A)$ входят только ненулевые гомоморфизмы.

Итак, по теореме 2.15 Вейерштрасса–Стоуна, подалгебра $\Gamma(A)$ всюду плотна в $C_0(\Omega(A))$.

Наконец, покажем, что подалгебра $\Gamma(A)$ замкнута в $C_0(\Omega(A))$. Пусть $f \in C_0(\Omega(A))$ — точка прикосновения множества $\Gamma(A)$, тогда существует последовательность $\Gamma(a_n)$, сходящаяся к f . Но тогда последовательность $\Gamma(a_n)$ фундаментальна, и, так как Γ — изометричное отображение, последовательность a_n также фундаментальна. Так как A — банахово пространство, последовательность a_n сходится к некоторому $a \in A$. Но непрерывное отображение Γ переводит сходящуюся последовательность в сходящуюся. Следовательно, последовательность $\Gamma(a_n)$ сходится к $\Gamma(a)$. Так как пространство $C_0(\Omega(A))$ хаусдорфово, имеем $f = \Gamma(a)$, т.е. $f \in \Gamma(A)$, что и доказывает замкнутость $\Gamma(A)$.

Итак, $\Gamma(A)$ — замкнуто и всюду плотно в $C_0(\Omega(A))$, поэтому $\Gamma(A) = C_0(\Omega(A))$.

Унитарность изоморфизма Γ для унитарной алгебры A вытекает из теоремы 2.73. \square

3.5 Некоторые приложения представления Гельфанда

Пусть A — произвольная C^* -алгебра и $S \subset A$. Тогда, C^* -алгеброй $C^*(S)$, порожденной S , будем называть наименьшую C^* -подалгебру в A , содержащую S . Иными словами, $C^*(S)$ — это пересечение всех C^* -подалгебр в A , содержащих S . Если $a \in A$ и $S = \{a\}$, то $C^*(S)$ будем обозначать $C^*(a)$. Если же A унитарна, $a \in A$ и $S = \{a, 1\}$, то $C^*(S)$ обозначим $C^*(a, 1)$.

В силу предложения 2.7, если все элементы из S коммутируют, то банахова алгебра, порожденная S , коммутативна. Однако, в случае C^* -алгебр в алгебре $C^*(S)$ вместе с каждым элементом содержится и его сопряженный. Поэтому для коммутативности алгебры $C^*(S)$ не достаточно, чтобы элементы из S коммутировали: нужно требовать, чтобы коммутировали элементы из $S \cup S^*$, где $S^* = \{a^* \mid a \in S\}$, в частности, должны коммутировать a и a^* . Напомним, что элемент a , коммутирующий со своим сопряженным a^* , называется **нормальным**. Таким образом, алгебры $C^*(a)$ и $C^*(a, 1)$ коммутативны, если и только если элемент a нормален.

Предложение 3.49. Пусть A — произвольная C^* -алгебра и $a \in A$ — ее нормальный элемент. Тогда $C^*(a)$ — коммутативная C^* -подалгебра в A . Если алгебра A унитарна, то $C^*(a, 1)$ — коммутативная унитарная C^* -подалгебра в A . Более того, все элементы алгебр $C^*(a)$ и $C^*(a, 1)$ — нормальные.

Доказательство. Коммутативность этих алгебр мы уже обсудили. Далее, в силу предложения 3.5, многочлены от нормального элемента $a \in A$ и его сопряженного a^* — нормальные элементы в A . По аналогии с доказательством предложения 2.7 заключаем, что для нормального элемента $a \in A$ все элементы алгебр $C^*(a)$ и $C^*(a, 1)$ также являются нормальными. \square

В дальнейшем мы воспользуемся представлением Гельфанда для коммутативных алгебр $C^*(a)$ и $C^*(a, 1)$, определенных для нормального элемента a . Однако возникает важная проблема: в представлении Гельфанда существенную роль играет спектр элемента a . Однако, если вычислять это спектр в подалгебрах $C^*(a)$ или $C^*(a, 1)$, то спектр, вообще говоря, мог бы оказаться отличным от $\sigma_A(a)$, что привело бы к дополнительным трудностям (см. теорему 2.46). Однако, в унитарных C^* -алгебрах для C^* -подалгебр, содержащих единицу, такое случиться не может.

Теорема 3.50. Пусть B — это C^* -подалгебра унитарной C^* -алгебры A , причем B содержит единицу алгебры A . Тогда для каждого $b \in B$ выполняется $\sigma_B(b) = \sigma_A(b)$.

Доказательство. Заметим сначала, что утверждение теоремы эквивалентно следующему: каждый элемент $b \in B$ обратим в B тогда и только тогда, когда он обратим в A . Действительно, если $\sigma_B(b) = \sigma_A(b)$ для всех $b \in B$, то учитывая, что обратимость элемента равносильна отсутствию 0 в спектре этого элемента, получаем справедливость утверждения про обратимость. Обратно, если верно утверждение про обратимость, то для каждого $b \in B$ и каждого $\lambda \in \mathbb{C}$ элемент $b - \lambda$ обратим в B , если и только если он обратим в A , а это в точности означает, что $\sigma_B(b) = \sigma_A(b)$.

Итак, пусть сначала b — эрмитов элемент, тогда, по теореме 3.45, имеем $\sigma_A(b) \subset \mathbb{R}$, поэтому, рассматривая $\sigma_A(b)$ как подмножество \mathbb{C} , заключаем, что $\sigma_A(b)$ не имеет дыр, откуда, в силу теоремы 2.46, выполняется $\sigma_A(b) = \sigma_B(b)$. Таким образом, для эрмитовых элементов из B показано, что их обратимость в B равносильна их обратимости в A .

Пусть теперь $b \in B$ — произвольный элемент. Если b обратим в B , то он обратим и в A . Поэтому осталось рассмотреть случай, когда b обратим в A и показать, что он также обратим и в B . Так как b обратим в A , существует $a \in A$ такой, что $ab = ba = 1$, но тогда $a^*b^* = b^*a^* = 1$ и, значит, $bb^*a^*a = a^*abb^* = 1$, откуда bb^* обратим в A . Так как bb^* эрмитов, из показанного выше вытекает, что bb^* также обратим и в B . Следовательно, существует $c \in B$ такой, что $bb^*c = cbb^* = 1$, откуда $a = abb^*c = (ab)b^*c = b^*c$ и, значит, $a \in B$. Итак, мы показали, что элемент b обратим в B , что и требовалось. \square

Приведем еще одно утверждение, демонстрирующее отличие C^* -алгебр от банаховых алгебр (см. пример 2.41).

Предложение 3.51. Пусть A — произвольная C^* -алгебра и $a \in A$ — ее нормальный элемент. Тогда $r(a) = \|a\|$.

Доказательство. По определению, спектр элемента a унитарной алгебры равен его в спектре в унитаризации. Отметим, что спектр не зависит от выбора нормы. С другой стороны, в силу теоремы 3.42, на \tilde{A} существует (единственная) норма, которая превращает \tilde{A} в C^* -алгебру. Имея в виду все сказанное, будем сразу предполагать, что алгебра A унитарна.

Так как элемент $a a^*$ — эрмитов, то, в силу теоремы 3.25, имеем $r(a a^*) = \|a a^*\| = \|a\|^2$. С другой стороны, по теореме 2.42, выполняется $r(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}$. Далее,

$$(r(a))^2 = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} \right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{2/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n (a^n)^*\|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|(a a^*)^n\|^{1/n} = r(a a^*) = \|a\|^2,$$

откуда и вытекает требуемое. \square

Пусть A — унитарная алгебра и $a \in A_{sa}$ — эрмитов элемент. Напомним, что элемент $u \in A$ называется **унитарным**, если $u u^* = u^* u = 1$. По предложению 3.20, элемент e^{ia} является унитарным. Однако, не любой унитарный элемент имеет такой вид (приведем пример существенно позже). Следующая теорема дает достаточное условие того, что унитарный элемент имеет “логарифм”, т.е. представим в виде e^{ia} для некоторого эрмитова a . Приводимое ниже доказательство этой теоремы использует представление Гельфанда.

Напомним, что, в силу предложения 3.21, спектр $\sigma(u)$ унитарного элемента u из C^* -алгебры содержится в единичной окружности $S^1 \subset \mathbb{C}$.

Теорема 3.52. Пусть u — унитарный элемент унитарной C^* -алгебры A . Предположим, что $\sigma(u) \neq S^1$, например, это имеет место, если $\|1 - u\| < 2$. Тогда существует $a \in A_{sa}$ такой, что $u = e^{ia}$.

Доказательство. Отметим, что для каждого $\lambda = e^{i\psi} \in S^1$ элемент λu также унитарен. Более того, u обладает логарифмом a , если и только если λu обладает логарифмом $a + \psi 1$, при этом a и $a + \psi 1$ одновременно лежат в A_{sa} . Итак, для доказательства мы можем выбрать любой элемент λu . По предложению 2.29, $\sigma(\lambda u) = \lambda \sigma(u)$. Выберем λ так, чтобы $-1 \notin \sigma(\lambda u)$. Из сказанного вытекает, что без ограничения общности, можно сразу предполагать справедливым $-1 \notin \sigma(u)$, и именно это мы и будем делать.

Далее, так как u — нормальный элемент, то подалгебра $C^*(u, 1)$ коммутативна. Мы докажем, что именно в этой подалгебре можно найти логарифм. Для удобства заменим A на $C^*(u, 1)$, т.е. будем сразу предполагать, что A коммутативна.

Пусть $\Omega = \Omega(A)$ — пространство характеров алгебры A . Так как A унитарна, то, в силу теоремы 2.63, пространство Ω компактно, так что $C_0(\Omega) = C(\Omega)$. Пусть $\Gamma: A \rightarrow C(\Omega)$ — представление Гельфанда. Положим $f = \Gamma(u)$.

Через $\ln: \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{C}$ обозначим главную ветвь многозначной функции комплексного логарифма, т.е. если $z = \rho e^{i\theta}$, где $-\pi < \theta < \pi$, то $\ln z = \ln \rho + i\theta$. По теореме 2.73, $f(\Omega) = \sigma(u) \subset S^1 \setminus \{-1\}$, поэтому корректно определена функция $g := \ln \circ f \in C(\Omega)$, так что $f = e^g$. Так как $|f(\tau)| = 1$ для всех $\tau \in \Omega$, то $g = ih$ для некоторой вещественной функции $h \in C(\Omega)$. Так как, по теореме 3.48, отображение Γ — это изометрический $*$ -изоморфизм, определен элемент $a = \Gamma^{-1}(h)$ и $a^* = \Gamma^{-1}(\bar{h}) = \Gamma^{-1}(h) = a$, так что $a \in A_{sa}$. Из определения экспоненты элемента унитарной банаховой алгебры и свойств отображения Γ вытекает, что каждый начальный отрезок ряда, определяющего e^{ia} , переводится Γ в соответствующий начальный отрезок ряда, определяющего e^g , и так как Γ является изометрией, эти начальные отрезки сходятся к экспонентам,

первая из которых переводится Γ во вторую, т.е. $\Gamma(e^{ia}) = e^g$. Таким образом, $\Gamma(u) = e^g = \Gamma(e^{ia})$, откуда $u = e^{ia}$ в силу биективности Γ .

Покажем теперь, что если $\|1 - u\| < 2$, то $\sigma(u) \neq S^1$. Действительно, по следствию 2.49, имеем $r(1 - u) \leq \|1 - u\| < 2$. В силу предложения 2.29, имеем $\sigma(1 - u) = 1 - \sigma(u)$, поэтому $r(1 - u) = \sup_{\lambda \in \sigma(u)} |1 - \lambda|$, так что если $-1 \in \sigma(u)$, то $r(1 - u) \geq 2$, противоречие. \square

Тема 4

Функциональное исчисление C^* -алгебр. Положительные элементы.

План. Функциональное исчисление в $a \in A$ — канонический изометричный изоморфизм $\varphi: C(\sigma(a)) \rightarrow C^*(1, a) \subset A$. Положительные элементы, квадратные корни, квадраты и модули. Линейная оболочка унитарных элементов. Частичный порядок на эрмитовых элементах. Аппроксимативная единица, ее существование, свойства. Положительные функционалы, их свойства. Состояния алгебры. Разложение Жордана. ГНС-конструкция. Представление Гельфанда–Наймарка. Матричные C^* -алгебры.

Продолжим развивать теорию C^* -алгебр, в частности, докажем многочисленные следствия из теоремы Гельфанда 3.48.

4.1 Функциональные исчисления

Начнем со следующего тривиального замечания. Пусть $\theta: \Omega \rightarrow \Omega'$ — непрерывное отображение компактных хаусдорфовых топологических пространств, тогда оно индуцирует *транспонированное* отображение

$$\theta^t: C(\Omega') \rightarrow C(\Omega), \quad f \mapsto f \circ \theta,$$

которое, очевидно, является унитарным $*$ -гомоморфизмом. Если при этом θ — гомеоморфизм, то θ^t — это унитарный $*$ -изоморфизм.

Приведем еще одно наблюдение, мгновенно вытекающее из теоремы 3.44, примененной к $*$ -изоморфизму C^* -алгебр.

Следствие 4.1. Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ — произвольный $*$ -изоморфизм C^* -алгебр. Тогда φ — изометрия.

С помощью следствия 4.1 мы докажем следующую полезную теорему.

Теорема 4.2. Пусть a — нормальный элемент унитарной C^* -алгебры A и $z: \sigma(a) \rightarrow \mathbb{C}$ — включение. Тогда существует единственный унитарный C^* -гомоморфизм $\varphi: C(\sigma(a)) \rightarrow A$ такой, то $\varphi(z) = a$. Кроме того, $\text{im } \varphi = C^*(a, 1) \subset A$, а ограничение $\varphi: C(\sigma(a)) \rightarrow C^*(a, 1)$ — изометричный унитарный $*$ -изоморфизм.

Доказательство. Положим $B = C^*(a, 1)$, тогда, по предложению 3.49, алгебра B — унитарная коммутативная C^* -подалгебра в A . Пусть $\Gamma: B \rightarrow C(\Omega(B))$ — представление Гельфанда. По теореме 3.48, отображение Γ — унитарный изометричный $*$ -изоморфизм. Как и выше, положим $\hat{a} = \Gamma(a): \Omega(B) \rightarrow \mathbb{C}$. По теореме 2.78, $\text{im } \hat{a} = \sigma(a)$ и отображение $\hat{a}: \Omega(B) \rightarrow \sigma(a)$ — гомеоморфизм, поэтому, как было отмечено выше, транспонированное отображение $\hat{a}^t: C(\sigma(a)) \rightarrow C(\Omega(B))$ — это унитарный $*$ -изоморфизм, причем, в силу следствия 4.1, — изометричный. Положим $\psi = (\hat{a}^t)^{-1} \circ \Gamma: B \rightarrow C(\sigma(a))$, тогда ψ — также изометричный унитарный $*$ -изоморфизм, так что в качестве φ можно взять композицию ψ^{-1} и включения $B \rightarrow A$. Заметим, что $\hat{a}^t(z) = \hat{a}$, так как z — тождественное вложение, поэтому $\varphi(z) = \Gamma^{-1}(\hat{a}^t(z)) = \Gamma^{-1}(\hat{a}) = a$.

По теореме 2.14 Вейерштрасса–Стоуна, унитарная C^* -подалгебра в $C(\sigma(a))$, порожденная 1 и z , совпадает с $C(\sigma(a))$ (так как z разделяет точки в $\sigma(a)$). Отсюда вытекает, что унитарный $*$ -гомоморфизм из $C(\sigma(a))$ в A , переводящий z в a , определен однозначно, что доказывает однозначную определенность построенного φ . Наконец, $\text{im } \varphi = C^*(\varphi(z), 1) = C^*(a, 1)$. \square

Итак, пусть a — нормальный элемент унитарной C^* -алгебры, а $z: \sigma(a) \rightarrow \mathbb{C}$ — включение. По теореме 4.2, существует и единственен унитарный $*$ -гомоморфизм $\varphi: C(\sigma(a)) \rightarrow A$, для которого $\varphi(z) = a$. Этот гомоморфизм называется **функциональным исчислением на a** . Иногда удобно обозначать этот гомоморфизм через φ_a .

Иными словами, для каждой функции $f \in C(\sigma(a))$ определен элемент $\varphi_a(f)$ алгебры A , который мы будем также обозначать $f(a)$. Так как $\text{im } \varphi = C^*(a, 1)$, то применимо предложение 3.49, из которого следует, что каждый элемент $f(a)$ — нормальный.

Если $p \in C(\sigma(a))$ — многочлен вида $\sum \lambda_{k,l} z^k \bar{z}^l$, то $p(a) = \varphi(p) = \sum \lambda_{k,l} a^k (a^*)^l$ (т.е. $p(a)$, как и в общем случае $f(a)$, зависит в действительности не только от a , но и от a^*). Отметим, что семейство всех таких многочленов p удовлетворяет условиям теоремы 2.14 Вейерштрасса–Стоуна, поэтому это семейство всюду плотно в $C(\sigma(a))$, так что для каждой функции $f \in C(\sigma(a))$ существует последовательность многочленов $p_n \in C(\sigma(a))$, сходящаяся к f и, значит, $p_n(a) \rightarrow f(a)$ при $n \rightarrow \infty$.

Продемонстрируем, как работает функциональное исчисление, усилив с помощью него теорему 3.45.

Следствие 4.3. Пусть $a \in A$ — нормальный элемент унитарной C^* -алгебры A . Тогда a эрмитов, если и только если $\sigma(a) \subset \mathbb{R}$.

Доказательство. Пусть $B = C^*(a, 1)$, тогда C^* -алгебра B изометрично унитарно $*$ -изоморфна C^* -алгебре $C(\sigma(a))$ в силу теоремы 4.2 (как и в доказательстве теоремы 4.2 положим $\psi = (\hat{a}^t)^{-1} \circ \Gamma$ — соответствующий изоморфизм). Тогда $\psi: a \mapsto z$, где через z обозначена тождественная функция, принимающая в точке z значение z . Элемент a — эрмитов, если и только если $\psi(a) \in C(\sigma(a))$ эрмитов, т.е. если элемент z равен своему сопряженному, что эквивалентно тому, что z принимает лишь вещественные значения. Последнее равносильно вещественности области определения функции z , то есть вещественности спектра, что и завершает доказательство. \square

Предложение 4.4. Пусть a — нормальный элемент унитарной C^* -алгебры A и $\varphi: C(\sigma(a)) \rightarrow A$ — функциональное исчисление на a . Положим $B = \text{im } \varphi = C^*(1, a) \subset A$ и выберем произвольный $f \in C(\sigma(a))$ и любой характер $\tau \in \Omega(B)$. Тогда $f(\tau(a)) = \tau(f(a))$, где через $f(a)$ в правой части равенства обозначен элемент $\varphi(f) \in A$.

Доказательство. Рассмотрим два отображения: $f \mapsto f(\tau(a))$ и $f \mapsto \tau(\varphi(f)) = \tau(f(a))$, действующие из $C(\sigma(a))$ в \mathbb{C} . Оба этих отображения являются унитарными $*$ -гомоморфизмами, переводящими элементы 1 и z алгебры $C(\sigma(a))$ соответственно в 1 и $\tau(a)$ из \mathbb{C} . Действительно,

$$1 \mapsto 1(\tau(a)) = 1, \quad 1 \mapsto \tau(\varphi(1)) = \tau(1) = 1,$$

и

$$z \mapsto z(\tau(a)) = \tau(a), \quad z \mapsto \tau(\varphi(z)) = \tau(a),$$

где последнее равенство следует из доказанного в теореме 4.2 соотношения $\varphi(z) = a$. Таким образом, наши два отображения совпадают на образующих 1 и z алгебры $C^*(1, z) = C(\sigma(a))$, значит, эти отображения совпадают на всей алгебре $C(\sigma(a))$, что и требовалось. \square

Теорема 4.5 (Об отображении спектров). Пусть a — нормальный элемент унитарной C^* -алгебры A и $f \in C(\sigma(a))$. Тогда $\sigma(\varphi(f)) = \sigma(f(a)) = f(\sigma(a))$. Кроме того, если $g \in C(\sigma(f(a)))$, то $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ в A .

Доказательство. Положим $B = C^*(1, a)$ — коммутативная банахова алгебра, изоморфная $C(\sigma(a))$. В силу теоремы 2.61, справедливо

$$\sigma(f(a)) = \left\{ \tau(f(a)) : \tau \in \Omega(B) \right\}$$

(отметим, что здесь $f(a) = \varphi(f) \in B$). По предложению 4.4, имеем $\tau(f(a)) = f(\tau(a))$, откуда

$$\sigma(f(a)) = \left\{ f(\tau(a)) : \tau \in \Omega(B) \right\} = f\left(\left\{ \tau(a) : \tau \in \Omega(B) \right\}\right) = f(\sigma(a)),$$

где последнее равенство снова вытекает из теоремы 2.61.

Далее, положим $C = C^*(f(a), 1)$. Так как $f(a) \in C^*(a, 1)$, заключаем, что $C \subset B$, и для любого характера $\tau \in \Omega(B)$ его ограничение τ_C на C является характером на C , т.е. $\tau_C \in \Omega(C)$. Заметим, что, в силу первого утверждения, область определения функции g , равная $\sigma(f(a))$, совпадает со множеством значений функции f ,

равным $f(\sigma(a))$. Таким образом, корректно определена композиция $g \circ f: \sigma(a) \rightarrow \mathbb{C}$, здесь $g \circ f \in C(\sigma(a))$. Тогда $\varphi(g \circ f) = (g \circ f)(a) \in B$ и, по предложению 4.4, примененному сначала к $g \circ f$, затем к f и, наконец, к g , для всех $\tau \in \Omega(B)$ имеем:

$$\tau((g \circ f)(a)) = (g \circ f)(\tau(a)) = g(f(\tau(a))) = g(\tau(f(a))) = g(\tau_C(f(a))) = \tau_C(g(f(a))) = \tau(g(f(a))),$$

где в последних двух равенствах $g(f(a)) = \varphi_{f(a)}(g) \in C$ — образ g при функциональном исчислении $\varphi_{f(a)}$ для $f(a)$. Представление Гельфанда для алгебры B является изоморфизмом, что гарантирует представимость элемента $g(f(a)) \in C \subset B$ в виде $h(a)$ для некоторой функции $h \in C(\sigma(a))$, и тогда, по предложению 4.4, примененному к h , для всех $\tau \in \Omega(B)$ выполняется

$$(g \circ f)(\tau(a)) = \tau((g \circ f)(a)) = \tau(g(f(a))) = \tau(h(a)) = h(\tau(a)).$$

По теореме 2.61 множество $\{\tau(a) : \tau \in \Omega(B)\}$ равно $\sigma(a)$, т.е. равно всей области определения функций $(g \circ f)$ и h , поэтому $h = (g \circ f)$ и, значит, $(g \circ f)(a) = h(a) = g(f(a))$, где последнее равенство — это определение функции h , что и требовалось. \square

4.2 Положительные элементы в C^* -алгебрах

В этом разделе на семействе эрмитовых элементов C^* -алгебры мы введем естественный частичный порядок, в частности, в этом семействе мы выделим подсемейство положительных элементов. Будет показано, что из каждого положительного элемента можно извлечь положительный квадратный корень, а также, что все элементы вида a^*a положительны.

Пример 4.6. Пусть X — локально компактное хаусдорфово топологическое пространство, $A = C_0(X)$ и $A_{sa} \subset A$ — множество всех самосопряженных (эрмитовых) элементов. Подпространство A_{sa} состоит из всех вещественнозначных функций $f \in A$. На A_{sa} имеется естественный частичный порядок: $f \geq g$, если и только если $f(x) \geq g(x)$ для всех $x \in X$. В частности, **положительный** $f \in A_{sa}$ — тот, для которого $f \geq 0$. Легко видеть, что f положителен, если и только если существует $g \in A$ такое, что $f = g\bar{g}$ (такой g определен неоднозначно). Но для положительного f однозначно определен неотрицательный квадратный корень $x \mapsto \sqrt{f(x)}$.

Лемма 4.7. Пусть X — локально компактное хаусдорфово топологическое пространство, $A = C_0(X)$, и $f = \bar{f} \in A_{sa}$. Тогда f положителен, если и только если для некоторого $t \in \mathbb{R}$, $t \geq \|f\|$ выполняется $\|f - t\| \leq t$.

Доказательство. Действительно, если нашлось такое t , то оно неотрицательно, поэтому, если $f(x) < 0$ для некоторого $x \in X$, то $|f(x) - t| > t$, так что $\|f - t\| > t$. Обратно, для $f \geq 0$ и $t \geq \|f\|$ имеем $-t \leq f(x) - t \leq 0$ при всех $x \in X$, откуда $\|f - t\| \leq t$. \square

Перенесем конструкцию примера 4.6 на произвольную C^* -алгебру A . Элемент $a \in A$ назовем **положительным**, если он эрмитов и $\sigma(a) \subset \mathbb{R}_+$, где \mathbb{R}_+ обозначает множество всех неотрицательных вещественных чисел. Положительность элемента $a \in A$ будем обозначать $a \geq 0$, а множество всех положительных элементов в A — через A^+ . Отметим, что $A^+ \subset A_{sa}$ по определению.

Проверим, что данное определение согласовано с примером 4.6. Как мы уже отмечали, самосопряженность $f \in C_0(X)$ равносильна вещественности функции f . Кроме того, в разделе 2.2 мы видели, что для $f \in \mathcal{B}(S)$, где S — произвольное множество, выполняется $\sigma(f) = \overline{f(S)}$. Так как $C_0(X) \subset \mathcal{B}(X)$, имеем то же самое утверждение. Поэтому для $f \in C_0(X)$ условие $\sigma(f) \subset \mathbb{R}_+$ равносильно тому, что $f(x) \geq 0$ для всех $x \in X$, так что данное нами определение положительных элементов произвольной C^* -алгебры согласуется с примером 4.6.

Предложение 4.8. Пусть a — положительный обратимый элемент унитарной C^* -алгебры, тогда a^{-1} — также положительный.

Доказательство. В силу следствия 3.8, элемент a^{-1} — эрмитов. Так как $a \geq 0$, то $\sigma(a) \subset \mathbb{R}_+$. По предложению 2.31, обратимость a влечет $0 \notin \sigma(a)$. Наконец, в силу того же следствия, $\sigma(a^{-1}) = 1/\sigma(a)$, поэтому $\sigma(a^{-1}) \subset (0, +\infty)$ и, значит, $a^{-1} \geq 0$. \square

Теорема 4.9. Для произвольной C^* -алгебры и любого $a \in A^+$ существует единственный $b \in A^+$, для которого $b^2 = a$. Более того, a и b коммутируют.

Доказательство. Рассмотрим подалгебру $C^*(a)$ в алгебре A , порожденную элементом a . Так как $a = a^*$, эта подалгебра состоит из всевозможных многочленов от a с нулевым свободным членом, поэтому коммутативна. По теореме 3.48, алгебра $C^*(a)$ отождествляется с C^* -алгеброй $C_0(\Omega)$ с помощью представления Гельфанда Γ , где Ω — пространство характеров алгебры $C^*(a)$. При этом $a \mapsto \hat{a}$ и

$$\sigma(a) = \{\tau(a) : \tau \in \Omega\} = \hat{a}(\Omega) \subset \mathbb{R}_+.$$

Поэтому, в соответствии с примером 4.6, определен $\sqrt{\hat{a}}$. Положим $b = \Gamma^{-1}(\sqrt{\hat{a}})$. То, что a и b коммутируют, вытекает из коммутативности алгебры $C^*(a) \simeq C_0(\Omega)$.

Наконец, пусть существует еще один элемент $c \in A^+$, такой, что $c^2 = a$. Тогда c коммутирует с a так как $ca = c^3 = ac$. Но тогда c коммутирует и с $b \in C^*(a)$, поскольку b — предел последовательности многочленов от a . Рассмотрим коммутативную алгебру $C^*(b, c) \supset C^*(a)$ и рассмотрим представление Гельфанда Γ для нее. Но тогда $\Gamma(b)$ и $\Gamma(c)$ — положительные квадратные корни из $\Gamma(a)$, поэтому они совпадают и, значит, $b = c$. \square

Для положительного $a \in A$ тот единственный элемент b , для которого $a = b^2$, будем обозначать через $a^{1/2}$.

Предложение 4.10. Пусть A — некоторая C^* -алгебра и $c \in A$ — эрмитов элемент. Тогда $c^2 \in A^+$.

Доказательство. По теореме 3.45, имеет $\sigma(c) \subset \mathbb{R}$. С другой стороны, в силу замечания 2.47, множество $\sigma(c)$ непусто. Так как спектр элемента алгебры по определению является спектром унитализации этой алгебры, применима теорема 2.32, в силу которой $\sigma(c^2) = (\sigma(c))^2 \subset \mathbb{R}_+$, так что c^2 — положительный элемент. \square

Конструкция 4.11. Пусть a — эрмитов элемент C^* -алгебры A . В силу предложения 4.10, $a^2 \in A^+$. По теореме 4.9, из a^2 можно извлечь корень. Этот корень мы обозначим $|a|$. Кроме того, положим $a^+ = \frac{1}{2}(|a| + a)$ и $a^- = \frac{1}{2}(|a| - a)$, так что $a = a^+ - a^-$.

Отождествим теперь алгебру $B := C^*(a)$ и $C_0(\Omega(B))$ с помощью представления Гельфанда, $a \mapsto \hat{a}$. Тогда элементу $|a|$ соответствует неотрицательная функция, равная $|\hat{a}|$. Далее, $\hat{a}^\pm = \frac{1}{2}(|\hat{a}| \pm \hat{a})$ — тоже неотрицательные вещественные функции на $\Omega(B)$. Так как, в силу теоремы 2.73, образы этих функций, с точностью до 0, совпадают со спектром соответствующего элемента, заключаем, что элементы $|a|$ и a^\pm — положительные. Кроме того, для каждого характера $\tau \in \Omega(B)$ имеем $|\hat{a}|(\tau) = \pm \hat{a}(\tau)$, откуда $a^+ a^- = 0$. Это разложение оказывается полезным при решении различных задач.

Предложение 4.12. Пусть a — эрмитов элемент C^* -алгебры A , и $a = a^+ - a^-$ — построенное в конструкции 4.11 разложение элемента a на положительные элементы a^\pm . Тогда если $\|a\| \leq 1$, то $\|a^\pm\| \leq 1$.

Доказательство. Напомним, что $a^+ = (|a| + a)/2$ и $a^- = (|a| - a)/2$. Так как $|a|^2 = a^2$ по определению элемента $|a|$, то

$$\| |a|^2 \| = \| |a| |a| \| = \| |a| |a|^* \| = \| |a| \|^2 \quad \text{и} \quad \| |a|^2 \| = \| a^2 \| = \| a a^* \| = \| a \|^2 \leq 1,$$

откуда $\| |a| \| \leq 1$. Следовательно,

$$\| a^\pm \| = \frac{1}{2} \| |a| \pm a \| \leq \frac{1}{2} (\| |a| \| + \| a \|) \leq 1,$$

что и требовалось. \square

Замечание 4.13. Пусть a — эрмитов элемент в унитарной C^* -алгебре A , $\|a\| \leq 1$, тогда $a^2 \in A^+$ по предложению 4.10. По предложению 2.29, $\sigma(1 - a^2) = 1 - \sigma(a^2)$. Далее, так как A — банахова алгебра, из свойства субмультипликативности умножения заключаем, что $\|a^2\| \leq \|a\|^2 \leq 1$. Наконец, по следствию 2.49, $r(a^2) \leq \|a^2\| \leq 1$, откуда, учитывая, что $a^2 \in A^+$, получаем $\sigma(a^2) \subset [0, 1]$. Таким образом, $\sigma(1 - a^2) = 1 - \sigma(a^2) \subset [0, 1]$, откуда $1 - a^2 \in A^+$.

По теореме 4.9, из $1 - a^2$ можно извлечь квадратный корень, т.е. единственным образом определен элемент $\sqrt{1 - a^2}$. Положим

$$u = a + i\sqrt{1 - a^2}, \quad v = a - i\sqrt{1 - a^2}.$$

Заметим, что

$$u u^* = (a + i\sqrt{1 - a^2})(a - i\sqrt{1 - a^2}) = a^2 + (1 - a^2) = 1,$$

и, аналогично, $v v^* = 1$, т.е. u и v — унитарные элементы. Мы воспользовались тем, что a и $\sqrt{1 - a^2}$ эрмитовы. Ясно также, что $a = (u + v)/2$. Таким образом, мы показали, что каждый эрмитов элемент a , $\|a\| \leq 1$, представим в виде линейной комбинации унитарных элементов. С другой стороны, в силу предложения 3.2, каждый элемент $*$ -алгебры представим в виде линейной комбинации эрмитовых. Тем самым, мы доказали следующий результат

Предложение 4.14. *Каждая унитарная C^* -алгебра является линейной оболочкой множества своих унитарных элементов.*

Лемма 4.15. *Пусть A — унитарная C^* -алгебра, $a \in A$ — эрмитов элемент. Тогда если для некоторого $t \in \mathbb{R}$, $t \geq \|a\|$, выполнено неравенство $\|a - t\| \leq t$, то $a \geq 0$. Обратно, если $a \geq 0$ и $\|a\| \leq t$, $t \in \mathbb{R}$, то $\|a - t\| \leq t$. В частности, если $\|a - \|a\|\| \leq \|a\|$, то $a \geq 0$, и, обратно, если $a \geq 0$, то $\|a - \|a\|\| \leq \|a\|$.*

Доказательство. Пусть B — это C^* -подалгебра в A , порожденная 1 и a . Так как элемент a — эрмитов, то подалгебра B коммутативна. По теореме 4.2, существует изометричный $*$ -изоморфизм $\varphi: C(\sigma(a)) \rightarrow B$. Остается воспользоваться леммой 4.7. \square

Следствие 4.16. *Пусть A — унитарная C^* -алгебра, тогда A^+ замкнуто в A .*

Доказательство. В силу предложения 3.17, множество A_{sa} всех эрмитовых элементов замкнуто в A . Покажем, что это же верно и для $A^+ \subset A_{sa}$. Пусть $a_n \in A^+$ — последовательность, сходящаяся к некоторой точке $a \in A$. Мы покажем, что $a \in A^+$, чем и завершим доказательство. Так как A_{sa} замкнуто в A , то $a \in A_{sa}$. Последовательность $\|a_n\|$ ограничена, поэтому существует $t \in \mathbb{R}$ такое, что $\|a_n\| \leq t$ при всех n . Так как $a_n \geq 0$, то, в силу леммы 4.15, имеем $\|a_n - t\| \leq t$ при всех n . Так как $\|a_n - t\| \rightarrow \|a - t\|$ при $n \rightarrow \infty$, то $\|a - t\| \leq t$. Тогда, снова по лемме 4.15, $a \geq 0$, т.е. $a \in A^+$, что и требовалось. \square

Лемма 4.17. *Пусть a и b — положительные элементы C^* -алгебры A , тогда их сумма $a + b$ тоже положительна.*

Доказательство. Так как унитаризация неунитарной C^* -алгебры сохраняет эрмитовость элементов, а спектры элементов неунитарной алгебры определяются именно как спектры в унитаризации, то, без ограничения общности, сразу будем считать, что алгебра A унитарна. Из леммы 4.15 вытекает, что

$$\|a - \|a\|\| \leq \|a\| \quad \text{и} \quad \|b - \|b\|\| \leq \|b\|,$$

откуда

$$\|a + b - (\|a\| + \|b\|)\| = \|a + b - \|a\| - \|b\|\| \leq \|a - \|a\|\| + \|b - \|b\|\| \leq \|a\| + \|b\|.$$

Снова по лемме 4.15 имеем $a + b \geq 0$. \square

Теорема 4.18. *Пусть a — произвольный элемент C^* -алгебры A , тогда a^*a положителен.*

Доказательство. Напомним, что как a^*a , так и aa^* — эрмитовы элементы. Таким образом, наша задача — показать, что $\sigma(a^*a) \subset \mathbb{R}_+$. Начнем со следующей леммы.

Лемма 4.19. *Пусть $-aa^* \in A^+$, тогда $a = 0$.*

Доказательство. По предложению 2.29, выполняется $\sigma(-aa^*) \cup \{0\} = \sigma(-a^*a) \cup \{0\}$, следовательно, $-a^*a \in A^+$. Поэтому $\sigma(-a^*a) \subset \mathbb{R}_+$, а $\sigma(a^*a) = -\sigma(-a^*a) \subset -\mathbb{R}_+$. Воспользовавшись предложением 3.2, представим a в виде $b + ic$, где $b, c \in A_{sa}$. Тогда

$$a^*a + aa^* = (b - ic)(b + ic) + (b + ic)(b - ic) = 2b^2 + 2c^2.$$

По предложению 4.10, элементы $2b^2$ и $2c^2$ положительны, а, по лемме 4.17, элемент $a^*a = 2b^2 + 2c^2 + (-aa^*)$ тоже положительный. Итак, $\sigma(a^*a) \subset \mathbb{R}_+ \cap (-\mathbb{R}_+) = \{0\}$, следовательно, $r(a^*a) = 0$. С другой стороны, по теореме 3.25 и определению C^* -алгебры, $r(a^*a) = \|a^*a\| = \|a\|^2$, поэтому $\|a\| = 0$ и, значит, $a = 0$. \square

Вернемся к доказательству теоремы. Положим $b = a^*a$, тогда, в силу конструкции 4.11, элемент b представим в виде $b^+ - b^-$, где b^\pm — положительные элементы, для которых $b^-b^+ = b^+b^- = 0$. Мы покажем, что $b^- = 0$, откуда и будет следовать положительность a^*a . Для этого положим $c = ab^-$, тогда

$$-c^*c = -b^-a^*ab^- = -b^-(b^+ - b^-)b^- = (b^-)^3.$$

Снова вспоминаем, что спектр элемента C^* -алгебры равен его спектру в унитаризации этой алгебры. Поэтому применима теорема 2.32, в силу которой $\sigma((b^-)^3) = (\sigma(b^-))^3 \subset \mathbb{R}_+$. Но тогда $-c^*c \in A^+$, откуда, в силу леммы 4.19, получаем $c = 0$, так что $(b^-)^3 = -c^*c = 0$. По следствию 3.27, имеем $b^- = 0$, что и требовалось. \square

4.3 Частичный порядок на эрмитовых элементах C^* -алгебры

Для C^* -алгебры A , зададим на A_{sa} бинарное отношение так: положим $a \leq b$, если и только если $b - a \in A^+$.

Предложение 4.20. *Определенное только что отношение на эрмитовых элементах C^* -алгебры A является частичным порядком.*

Доказательство. Так как $a - a = 0$ и, по следствию 3.26, эрмитов элемент равен нулю, если и только если его спектр нулевой, имеет место рефлексивность. Более того, из того же следствия вытекает, что если элемент не равен нулю, то его спектр содержит не нулевые значения, поэтому, если такой элемент a положителен, то элемент $-a$, в силу предложения 2.29, положительным не является. Отсюда вытекает, что введенное отношение антисимметрично. Наконец, если $a, b, c \in A_{sa}$ и $a \leq b$ и $b \leq c$, то $c - a = (c - b) + (b - a) \in A^+$ в силу леммы 4.17, откуда следует транзитивность. Доказательство закончено. \square

Следующее утверждение доказывается тривиально (с использованием предложения 2.29).

Предложение 4.21. *Введенный выше порядок на A_{sa} удовлетворяет следующим свойствам:*

- *он инвариантен относительно сдвигов: для любых $a, b, c \in A_{sa}$ условие $a \leq b$ эквивалентно $a + c \leq b + c$;*
- *он инвариантен относительно умножения на положительные вещественные числа: для любых $a, b \in A_{sa}$ и $t \in \mathbb{R}_+$ условие $a \leq b$ влечет $ta \leq tb$, а если $t > 0$, то оба этих условия эквивалентны;*
- *наконец, умножение на отрицательные вещественные числа обращают порядок: для любых $a, b \in A_{sa}$ и $t \in \mathbb{R}$, $t \leq 0$, условие $a \leq b$ влечет $ta \geq tb$, а если $t < 0$, то оба этих условия эквивалентны.*

Предложение 4.22. *Пусть a — обратимый положительный элемент унитарной C^* -алгебры, тогда все элементы $a, a^{-1}, a^{1/2}$ и $a^{-1/2} := (a^{-1})^{1/2}$ коммутируют друг с другом, и $a^{1/2}a^{-1/2} = a^{-1/2}a^{1/2} = 1$.*

Доказательство. Пусть B — унитарная C^* подалгебра в A , порожденная $1, a$ и a^{-1} . Так как все образующие коммутируют, то алгебра B коммутативна. По теореме 3.48, представление Гельфанда Γ в этом случае представляет собой изометричный унитарный $*$ -изоморфизм алгебра $\Gamma: B \rightarrow C(\Omega)$, где Ω — пространство характеров алгебры B (оно компактно, так как B унитарна). Положительность и обратимость a означает, что функция $\Gamma(a) = \hat{a}$ всюду положительна, так как $\sigma(a) = \text{im } \Gamma(a)$ по теореме 2.73. Кроме того, $\Gamma(a^{-1}) = 1/\Gamma(a)$ так как обратный элемент переходит в обратный при гомоморфизме. Далее, $\Gamma(a^{1/2}) = \sqrt{\Gamma(a)} \in C(\Omega)$ в силу конструкции, описанной в доказательстве теоремы 4.9, где корень элемента алгебры определяется с помощью перехода к алгебре функций. Аналогично $\Gamma(a^{-1/2}) = \sqrt{\Gamma(a^{-1})} = 1/\sqrt{\Gamma(a)} \in C(\Omega)$. Так как $C(\Omega)$ коммутативна, а B изоморфна $C(\Omega)$, то и все элементы $a, a^{-1}, a^{1/2}$ и $a^{-1/2}$ коммутируют друг с другом. Наконец, $\Gamma(a^{1/2})\Gamma(a^{-1/2}) = \sqrt{\Gamma(a)}(1/\sqrt{\Gamma(a)}) = 1$ и, точно так же, $\Gamma(a^{-1/2})\Gamma(a^{1/2}) = (1/\sqrt{\Gamma(a)})\sqrt{\Gamma(a)} = 1$, поэтому, так как изоморфизм Γ унитарный, $a^{1/2}a^{-1/2} = a^{-1/2}a^{1/2} = 1$. \square

Конструкция 4.23. Обобщим конструкцию 4.11, определив для *произвольного* элемента a из C^* -алгебры A элемент $|a|$ так: $|a| = (a^*a)^{1/2}$ (это определение корректно так как элемент a^*a положителен в силу теоремы 4.18). Отметим, что если $a \in A_{sa}$, то $|a| = (a^*a)^{1/2} = (a^2)^{1/2}$, поэтому приведенное определение $|a|$ действительно является обобщением соответствующего определения из конструкции 4.11.

Приведем ряд элементарных фактов о множестве A^+ .

Теорема 4.24. *Для C^* -алгебры A справедливы следующие утверждения:*

- (1) *множество A^+ совпадает с множеством $\{a^*a : a \in A\}$;*
- (2) *если $a, b \in A_{sa}$ и $c \in A$, то неравенство $a \leq b$ влечет $c^*ac \leq c^*bc$;*
- (3) *если для $a, b \in A_{sa}$ выполняется $0 \leq a \leq b$, то $\|a\| \leq \|b\|$;*
- (4) *если A унитарна, $a \in A_{sa}$, и $a \geq 1$, то элемент a обратим и $0 \leq a^{-1} \leq 1$;*
- (5) *если A унитарна и $a, b \in A$, $0 \leq a \leq b$, — ее положительные обратимые элементы, то $0 \leq b^{-1} \leq a^{-1}$.*

Доказательство. (1) По теореме 4.18, для всех $a \in A$ выполняется $a^*a \in A^+$. С другой стороны, по теореме 4.9, для каждого $a \in A^+$ существует $b \in A^+$ такой, что $a = b^2 = b^*b$, где последнее равенство следует из $b \in A^+ \subset A_{sa}$.

(2) Пусть $a \leq b$, то есть $b - a \in A^+$, тогда, в силу пункта (1), выполняется $b - a = d^*d$. С другой стороны, c^*ac и c^*bc — эрмитовы, и

$$c^*bc - c^*ac = c^*(b - a)c = c^*d^*dc = (dc)^*(dc) \geq 0,$$

где последнее неравенство снова вытекает из пункта (1).

(3) В силу следствия 2.49 и того, что $b \in A^+$, имеем $0 \leq \sigma(b) \leq r(b) \leq \|b\|$, поэтому, в силу предложения 2.29, имеем $\sigma(\|b\|1 - b) \geq 0$, поэтому $\|b\|1 - b \in A^+$ и, значит, $b \leq \|b\|1$. Из транзитивности частичного порядка вытекает, что $a \leq b \leq \|b\|1$. Последнее означает, что $\sigma(\|b\|1 - a) \geq 0$, так что $r(a) \leq \|b\|$. Так как a — эрмитов, то по теореме 3.25, $\|a\| = r(a) \leq \|b\|$, что и требовалось.

(4) Для произвольного $a \in A_{sa}$ такого, что $a \geq 1$, в силу предложения 2.29 имеем $\sigma(a - 1) = \sigma(a) - 1 \geq 0$, поэтому $\sigma(a) \geq 1$. По предложению 2.31, элемент a обратим (так как $0 \notin \sigma(a)$). По тому же предложению, $\sigma(a^{-1}) = 1/\sigma(a)$, откуда $0 < \sigma(a^{-1}) \leq 1$. Снова по предложению 2.29, $\sigma(1 - a^{-1}) = 1 - \sigma(a^{-1}) \geq 0$, откуда $a^{-1} \leq 1$.

(5) В силу следствия 3.8, элементы a^{-1} и b^{-1} также являются эрмитовыми, поэтому для них определен введенный порядок. По предложению 4.8, оба a^{-1} и b^{-1} — положительные. По теореме 4.9, существуют и единственны положительные $a^{-1/2}$ и $a^{1/2}$ такие, что $(a^{-1/2})^2 = a^{-1}$ и $(a^{1/2})^2 = a$ соответственно. По предложению 4.22, элементы a , a^{-1} , $a^{1/2}$ и $a^{-1/2} := (a^{-1})^{1/2}$ коммутируют друг с другом, и $a^{1/2}a^{-1/2} = a^{-1/2}a^{1/2} = 1$, поэтому, в частности, $1 = a^{-1/2}a a^{-1/2}$. Так как $a \leq b$, то, в силу пункта (2), $a^{-1/2}a a^{-1/2} \leq a^{-1/2}b a^{-1/2}$, поэтому $1 \leq a^{-1/2}b a^{-1/2}$, откуда, в силу пункта (4), имеем

$$(a^{-1/2}b a^{-1/2})^{-1} = a^{1/2}b^{-1}a^{1/2} \leq 1.$$

Следовательно, сопрягая полученное неравенство с $a^{-1/2}$ и снова используя пункт (2) и предложение 4.22, получаем

$$b^{-1} = a^{-1/2}(a^{1/2}b^{-1}a^{1/2})a^{-1/2} \leq a^{-1/2}1 a^{-1/2} = a^{-1},$$

что и требовалось. \square

Задача 4.25. Покажите, что если $a \in A^+$, то $\|a^2\| = \|a\|^2$ и $\|a^{1/2}\| = \|a\|^{1/2}$.

Теорема 4.26. Пусть a и b — положительные элементы C^* -алгебры A , причем $a \leq b$. Тогда $a^{1/2} \leq b^{1/2}$.

Доказательство. Без ограничения общности, будем считать, что алгебра A унитарна.

Выберем произвольное вещественное $t > 0$ и положим $a_t = a + t1$ и $b_t = b + t1$, тогда $a_t \leq b_t$ и, по лемме 4.17, $a_t, b_t \in A^+$. Так как $\sigma(a) \subset \mathbb{R}_+$ и $\sigma(b) \subset \mathbb{R}_+$, то, по предложению 2.29, $\sigma(a_t) = t + \sigma(a) > 0$ и $\sigma(b_t) = t + \sigma(b) > 0$, поэтому a_t и b_t — обратимы в силу предложения 2.29.

Лемма 4.27. Имеем $\|a_t^{1/2}b_t^{-1/2}\| \leq 1$.

Доказательство. Так как A — это C^* -алгебра, имеем

$$\|a_t^{1/2}b_t^{-1/2}\|^2 = \|a_t^{1/2}b_t^{-1/2}(a_t^{1/2}b_t^{-1/2})^*\| = \|a_t^{1/2}b_t^{-1/2}b_t^{-1/2}a_t^{1/2}\| = \|a_t^{1/2}b_t^{-1}a_t^{1/2}\|.$$

С другой стороны, по теореме 4.24, имеем $b_t^{-1} \leq a_t^{-1}$. Но тогда, по той же самой теореме,

$$a_t^{1/2}b_t^{-1}a_t^{1/2} \leq a_t^{1/2}a_t^{-1}a_t^{1/2} = 1,$$

где последнее равенство вытекает из предложения 4.22. Так как $b_t^{-1} \geq 0$, то, по теореме 4.24, $a_t^{1/2}b_t^{-1}a_t^{1/2} \geq 0$, и снова по этой теореме, $\|a_t^{1/2}b_t^{-1}a_t^{1/2}\| \leq \|1\| = 1$. Итак, собирая доказанные неравенства, заключаем, что $\|a_t^{1/2}b_t^{-1/2}\|^2 \leq 1$, откуда и вытекает требуемое. \square

В силу лемм 4.27 и 2.36, $\sigma(a_t^{1/2}b_t^{-1/2})$ лежит в отрезке $[-1, 1]$. Далее,

$$\sigma(a_t^{1/2}b_t^{-1/2}) \setminus \{0\} = \sigma(a_t^{1/2}b_t^{-1/4}b_t^{-1/4}) \setminus \{0\} = \sigma(b_t^{-1/4}a_t^{1/2}b_t^{-1/4}) \setminus \{0\},$$

где последнее равенство имеет место по предложению 2.29, поэтому $r(b_t^{-1/4}a_t^{1/2}b_t^{-1/4}) \leq 1$. Элемент $b_t^{-1/4}a_t^{1/2}b_t^{-1/4}$ — эрмитов, поэтому, в силу теоремы 3.25, имеем

$$\|b_t^{-1/4}a_t^{1/2}b_t^{-1/4}\| = r(b_t^{-1/4}a_t^{1/2}b_t^{-1/4}) \leq 1.$$

Но тогда, так как $\sigma(b_t^{-1/4} a_t^{1/2} b_t^{-1/4}) \subset \mathbb{R}$, по предложению 2.29,

$$\sigma(1 - b_t^{-1/4} a_t^{1/2} b_t^{-1/4}) = 1 - \sigma(b_t^{-1/4} a_t^{1/2} b_t^{-1/4}) \geq 0,$$

поэтому $1 - b_t^{-1/4} a_t^{1/2} b_t^{-1/4} \geq 0$, то есть $b_t^{-1/4} a_t^{1/2} b_t^{-1/4} \leq 1$. Используя теорему 4.24, сопрягаем последнее неравенство с $b^{1/4}$. Имеем:

$$b_t^{1/4} 1 b_t^{1/4} \geq b_t^{1/4} (b_t^{-1/4} a_t^{1/2} b_t^{-1/4}) b_t^{1/4} = (b_t^{1/4} b_t^{-1/4}) a_t^{1/2} (b_t^{-1/4} b_t^{1/4}) = a_t^{1/2},$$

откуда $b_t^{1/2} \geq a_t^{1/2}$. Теорема 3.48, примененная к $C^*(a, 1)$ и $C^*(b, 1)$, показывает, что $(a + t1)^{1/2} \rightarrow a^{1/2}$ и $(b + t1)^{1/2} \rightarrow b^{1/2}$ при $t \rightarrow 0+$ (так как представление Гельфанда Γ является изометрией). Итак,

$$b^{1/2} - a^{1/2} = \lim_{t \rightarrow 0+} (b + t1)^{1/2} - \lim_{t \rightarrow 0+} (a + t1)^{1/2} = \lim_{t \rightarrow 0+} ((b + t1)^{1/2} - (a + t1)^{1/2}) \geq 0,$$

где последнее неравенство вытекает из того, что при всех $t > 0$ имеем $(b + t1)^{1/2} - (a + t1)^{1/2} \geq 0$, а множество A^+ замкнуто в силу следствия 4.16. Доказательство закончено. \square

Следствие 4.28. Если $a \in A^+$, $a \leq 1$, то $a^{1/2} \leq 1$.

Замечание 4.29. Если в теореме заменить неравенство $a^{1/2} \leq b^{1/2}$ на $a^2 \leq b^2$, то теорема перестанет быть верной. В качестве примера рассмотрим C^* -алгебру $M_2(\mathbb{C})$, состоящую из всех комплексных матриц размера 2×2 со стандартной инволюцией $A^* = \bar{A}^T$. Положим

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad q = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Так как p и q — вещественные матрицы, то они эрмитовы. Далее, спектр $a \in M_2(\mathbb{C})$ — это множество собственных значений матрицы a , поэтому $\sigma(q) = \{0, 1\} \subset \mathbb{R}_+$ и, значит, q положителен. Аналогично, $\sigma(p) = \{0, 1\}$, и p тоже положителен. Кроме того, из положительности q следует, что $p \leq p + q$. Посмотрим теперь на квадраты p и $p + q$. Имеем $p^2 = p$, $q^2 = q$, и $(p + q)^2 = p + q + pq + qp$, поэтому

$$(p + q)^2 - p^2 = q + pq + qp = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Определитель полученной матрицы отрицательный, поэтому спектр не может быть неотрицательным. Таким образом, элемент $(p + q)^2 - p^2$ не является положительным.

В [17] показано, что справедливость импликации $0 \leq a \leq b \Rightarrow a^2 \leq b^2$ имеет место только в коммутативных C^* -алгебрах.

4.4 Аппроксимативная единица

Если C^* -алгебра A не унитарна, то ее можно вложить в ее унитаризацию. Однако такой прием не всегда позволяет решать возникающие задачи. Например, так не удастся показать, что замкнутые идеалы сопряжены. Тем не менее, имеется другой прием “моделирования единицы”, который и называется аппроксимативной единицей.

Направленность $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, состоящая из положительных элементов замкнутого единичного шара C^* -алгебры A , такая, что для каждого $a \in A$ выполняется $a = \lim_\lambda u_\lambda a$, называется **аппроксимативной единицей** алгебры A .

Замечание 4.30. Если $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — аппроксимативная единица. По определению, для любого $a \in A$ выполнено $a^* = \lim_\lambda u_\lambda a^*$, поэтому

$$a = (a^*)^* = \left(\lim_\lambda u_\lambda a^* \right)^* = \lim_\lambda (u_\lambda a^*)^* = \lim_\lambda a u_\lambda^* = \lim_\lambda a u_\lambda,$$

где третье равенство вытекает из изометричности, а, значит, и непрерывности, сопряжения, а последняя из того, все элементы u_λ — эрмитовы. Отсюда вытекает, что условие $a = \lim_\lambda u_\lambda a$ в определении аппроксимативной единицы можно заменить на условие $a = \lim_\lambda a u_\lambda$.

Покажем теперь, что в качестве направленного множества Λ можно выбрать семейство всех положительных $a \in A$, для которых $\|a\| < 1$. Частичный порядок на этом множестве мы уже определили.

Предложение 4.31. Семейство Λ всех положительных элементов $a \in A$ из C^* -алгебры, для которых $\|a\| < 1$, с порядком, индуцированным из A_{sa} , является направленным.

Доказательство. Выберем произвольные $a, b \in \Lambda$ и покажем, что существует общая мажоранта, то есть такое $c \in \Lambda$, для которого $a \leq c$ и $b \leq c$. Вложим A в унитализацию \tilde{A} и будем проводить доказательство в \tilde{A} .

Заметим, что если $a \in A^+$, то элемент $a + 1$ обратим в \tilde{A} , так как $\sigma(a) \geq 0$, и верно равенство $a(1+a)^{-1} = 1 - (1+a)^{-1}$ (для его проверки достаточно записать левую часть в виде $(1+a-1)(1+a)^{-1}$ и раскрыть скобки).

Лемма 4.32. Если $a, b \in A^+$ и $a \leq b$, то $a(1+a)^{-1} \leq b(1+b)^{-1}$.

Доказательство. Действительно, из $0 \leq a \leq b$ следует, что $1+a \leq 1+b$ (предложение 4.21), откуда $(1+b)^{-1} \leq (1+a)^{-1}$ (теорема 4.24). Поэтому $1-(1+a)^{-1} \leq 1-(1+b)^{-1}$, то есть $a(1+a)^{-1} \leq b(1+b)^{-1}$, что и требовалось. \square

Лемма 4.33. Если $a \in A^+$, то $a(1+a)^{-1} \in \Lambda$ и $a(1-a)^{-1} \in A^+$.

Доказательство. Действительно, рассмотрим представление Гельфанда Γ алгебры $B = C^*(1, a)$. Так как функция $\Gamma(a) \in C(\Omega(B))$ принимает только неотрицательные значения, множество значений функции $f \in C(\Omega(B))$, $f = \Gamma(a(1+a)^{-1}) = \Gamma(a)/(1+\Gamma(a))$, лежит в отрезке $[0, 1]$, поэтому $\|f\| \leq 1$, и, значит, $a(1+a)^{-1} \in \Lambda$. Аналогично, $g = \Gamma(a(1-a)^{-1})$ принимает положительные значения, так как $\text{im } \Gamma(a) \subset [0, 1]$. \square

Итак, пусть $a, b \in \Lambda$. Положим $a' = a(1-a)^{-1}$, $b' = b(1-b)^{-1}$ и $c = (a' + b')(1 + a' + b')^{-1}$. По лемме 4.33 элементы a' и b' положительны, поэтому $a' + b' \in A^+$ и, снова по лемме 4.33, получаем, что $c \in \Lambda$. Наконец, так как $a' \leq a' + b'$, то из леммы 4.32 вытекает, что $a'(1+a')^{-1} \leq c$, но, снова используя представление Гельфанда легко проверить, что $a'(1+a')^{-1} = a$, поэтому, окончательно, $a \leq c$. Точно так же проверяется, что $b \leq c$. Таким образом, c — искомая общая мажоранта. \square

Теорема 4.34. Каждая C^* -алгебра содержит аппроксимативную единицу. А именно, в качестве такой единицы можно взять направленность $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, где $u_\lambda = \lambda$ и $\Lambda = \{\lambda \in A^+ : \|\lambda\| < 1\}$.

Доказательство. В силу предложения 4.31 семейство $\Lambda = \{\lambda \in A^+ : \|\lambda\| < 1\}$, снабженное отношением порядка, индуцированным из A_{sa} , является направленностью. Поэтому остается проверить, что $a = \lim_{\Lambda} \lambda a$ для любого $a \in A$. Так как линейная оболочка множества Λ совпадает со всей алгеброй A , достаточно проверить это равенство для случая $a \in \Lambda$.

Фиксируем произвольные $a \in \Lambda$ и $\varepsilon > 0$. Рассмотрим представление Гельфанда $\Gamma: C^*(a) \rightarrow C_0(\Omega)$, где, как обычно, Ω — пространство характеров алгебры $C^*(a)$. Пусть $f = \Gamma(a)$. Заметим, что так как $a \in \Lambda$, то $\text{im } f \subset [0, 1]$. Напомним, см. теорему 2.63, что $\Omega \cup \{0\}$ — компактное хаусдорфово топологическое пространство в $*$ -слабой топологии. Поэтому подмножество $K = f^{-1}([\varepsilon, +\infty)) = \{\tau \in \Omega : f(\tau) \geq \varepsilon\}$ замкнуто и компактно в Ω . По лемме Урысона существует непрерывная функция $g: \Omega \rightarrow [0, 1]$ с компактным носителем, равная 1 на K . Выберем число δ так, чтобы $0 < \delta < 1$ и $1 - \delta < \varepsilon$. Тогда $\|f - \delta g f\| = \|(1 - \delta g)f\| \leq \varepsilon$. Действительно, если $\tau \in K$, то $|f(\tau) - \delta g(\tau)f(\tau)| = |(1 - \delta g(\tau))f(\tau)| \leq 1 - \delta < \varepsilon$ так как $\|f\| \leq 1$, а если $\tau \notin K$, то $|f(\tau) - \delta g(\tau)f(\tau)| \leq |1 - \delta g(\tau)|\varepsilon \leq \varepsilon$ так как $\|g\| \leq 1$.

Положим $\lambda_0 = \Gamma^{-1}(\delta g)$. Отметим, что $\lambda_0 \in C^*(a)$, поэтому коммутирует с a . Кроме того, $\lambda_0 \in \Lambda$, и $\|a - \lambda_0 a\| \leq \varepsilon$ так как Γ сохраняет норму. Возьмем произвольное $\lambda \geq \lambda_0$, $\lambda \in \Lambda$. Тогда $1 - \lambda \leq 1 - \lambda_0$ и $a(1 - \lambda)a \leq a(1 - \lambda_0)a$.

Далее,

$$\|a - \lambda a\|^2 = \|(1 - \lambda)^{1/2}(1 - \lambda)^{1/2}a\|^2 \leq \|(1 - \lambda)^{1/2}a\|^2,$$

так как $\|1 - \lambda\| \leq 1$. Напомним определяющее тождество C^* -алгебры: $\|x\|^2 = \|x^*x\|$, и возьмем $x = (1 - \lambda)^{1/2}a$. Так как элементы a и $1 - \lambda$ — эрмитовы, имеем:

$$\|(1 - \lambda)^{1/2}a\|^2 = \|((1 - \lambda)^{1/2}a)^*(1 - \lambda)^{1/2}a\| = \|a(1 - \lambda)a\| \leq \|a(1 - \lambda_0)a\| \leq \|(1 - \lambda_0)a\| \leq \varepsilon.$$

Таким образом, $\|a - \lambda a\|^2 \leq \varepsilon$, откуда следует, что $\lim_{\Lambda} \lambda a = a$, что и требовалось. \square

Аппроксимативная единица $\Lambda = \{\lambda \in A^+ : \|\lambda\| < 1\}$ называется **канонической аппроксимативной единицей** алгебры A .

Приведем несколько примеров использования аппроксимативной единицы.

Утверждение 4.35. Если L — замкнутый левый идеал в C^* -алгебре A , то существует направленность $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, состоящая из положительных элементов и лежащая в замкнутом единичном шаре в L , такая, что $a = \lim_\lambda a u_\lambda$ для всех $a \in L$.

Доказательство. Положим $B = L \cap L^*$. Заметим, что B является C^* -алгеброй. Действительно, $AL \subset L$ так как L — левый идеал, откуда $L^*A^* = L^*A \subset L^*$, поэтому $L \cap L^*$ — подалгебра, замкнутая относительно сопряжения. Далее, по теореме 4.34, алгебра B имеет каноническую аппроксимативную единицу $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, где Λ — единичный шар в B^+ . Далее, пусть $a \in L$. Тогда $a^*a \in B$, поэтому $\lim_\lambda (a^*a(1 - u_\lambda)) = 0$ по определению аппроксимативной единицы. Тогда

$$\lim_\lambda \|a(1 - u_\lambda)\|^2 = \lim_\lambda \|(1 - u_\lambda)^* a^* a (1 - u_\lambda)\| = \lim_\lambda \|(1 - u_\lambda) a^* a (1 - u_\lambda)\| \leq \lim_\lambda \|a^* a (1 - u_\lambda)\| = 0,$$

где неравенство выполнено, так как $\|u_\lambda\| \leq 1$, откуда $\lim_\lambda a(1 - u_\lambda) = 0$, что и требовалось. \square

Утверждение 4.36. Пусть I — замкнутый идеал в C^* -алгебре A . Тогда I самосопряжен и, значит, является C^* -подалгеброй. Если $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — аппроксимативная единица в I , то для каждого $a \in A$ имеет место соотношение

$$\|a + I\| = \lim_\lambda \|a - u_\lambda a\| = \lim_\lambda \|a - a u_\lambda\|$$

Доказательство. По утверждению 4.35 существует направленность $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, состоящая из положительных элементов и лежащая в единичном шаре в I , такая, что $b = \lim_\lambda b u_\lambda$ для всех $b \in I$. Поэтому $b^* = \lim_\lambda u_\lambda^* b^* = \lim_\lambda u_\lambda b^*$, и, так как все u_λ принадлежат I , а значит и $u_\lambda b^* \in I$ так как I — идеал, заключаем, используя замкнутость I , что $b^* \in I$, то есть I самосопряжен.

Пусть $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — произвольная аппроксимативная единица в I , и $a \in A$ — произвольный элемент. Напомним, что $\|a + I\| = \inf \{\|a + a'\| : a' \in I\}$, поэтому для любого $\varepsilon > 0$ существует такой $b \in I$, что $\|a + b\| < \|a + I\| + \varepsilon/2$. Так как $b = \lim_\lambda u_\lambda b$ по определению аппроксимативной единицы, то существует такое $\lambda_0 \in \Lambda$, что $\|b - u_\lambda b\| \leq \varepsilon/2$ для всех $\lambda \geq \lambda_0$. Тогда

$$\begin{aligned} \|a - u_\lambda a\| &= \|(1 - u_\lambda)a + (1 - u_\lambda)b - (1 - u_\lambda)b\| \leq \|(1 - u_\lambda)(a + b)\| + \|b - u_\lambda b\| \leq \\ &\leq \|a + b\| + \|b - u_\lambda b\| \leq \|a + I\| + \varepsilon/2 + \varepsilon/2, \end{aligned}$$

где первое неравенство выполнено, так как $\|u_\lambda\| \leq 1$ по определению аппроксимативной единицы. С другой стороны, $\|a + I\| \leq \|a - u_\lambda a\|$, так как $u_\lambda a \in I$, поэтому $\lim_\lambda \|a - u_\lambda a\| = \|a + I\|$. Наконец, $\|a^* + I\| = \lim_\lambda \|a^* - u_\lambda a^*\| = \lim_\lambda \|(a^* - u_\lambda a^*)^*\| = \lim_\lambda \|a - a u_\lambda\|$, откуда, так как $\|a + I\| = \|a^* + I\|$, заключаем, что

$$\|a + I\| = \lim_\lambda \|a - u_\lambda a\| = \lim_\lambda \|a - a u_\lambda\|.$$

Утверждение доказано. \square

Лемма 4.37. Пусть I — замкнутый идеал в C^* -алгебре A , и J — замкнутый идеал в I . Тогда J также идеал в A .

Доказательство. Так как I , а вслед за ним и J являются C^* -алгебрами, то достаточно проверить, что ab и ba принадлежат J для всех $a \in A$ и всех $b \in J^+$ (напомним, что C^* -алгебра является линейной оболочкой своих положительных элементов). Проверим это.

Так как $b \in J^+$, определен элемент $b^{1/2} \in J^+ \subset I$. Тогда $ab = (ab^{1/2})b^{1/2}$, и $ab^{1/2} \in I$ так как I — идеал в A , а тогда $ab = (ab^{1/2})b^{1/2} \in J$, так как J — идеал в I . Так как a — произвольный, то $a^*b \in J$, но тогда $(a^*b)^* = ba \in J$, так как J самосопряжен. Лемма доказана. \square

Теорема 4.38. Пусть I — замкнутый идеал в C^* -алгебре A . Тогда фактор алгебра A/I является C^* -алгеброй.

Доказательство. Нужно проверить определяющее равенство C^* -алгебры, причем, по лемме 3.29, достаточно проверить неравенство $\|x\|^2 \leq \|x^*x\|$. Пусть $\{u_\lambda\}$ — аппроксимативная единица в I . Рассмотрим произвольные $a \in A$ и $b \in I$. Тогда, применяя утверждение 4.36, имеем:

$$\begin{aligned} \|a + I\|^2 &= \lim_\lambda \|a - u_\lambda a\|^2 = \lim_\lambda \|(1 - u_\lambda)a^*a(1 - u_\lambda)\| = \lim_\lambda \|(1 - u_\lambda)(a^*a + b - b)(1 - u_\lambda)\| \leq \\ &\leq \lim_\lambda \|(1 - u_\lambda)(a^*a + b)(1 - u_\lambda)\| + \lim_\lambda \|(1 - u_\lambda)b(1 - u_\lambda)\| \leq \|a^*a + b\| + \lim_\lambda \|(1 - u_\lambda)b\| = \|a^*a + b\|, \end{aligned}$$

где последнее неравенство выполнено, так как $\|1 - u_\lambda\| \leq 1$, а последнее равенство — так как $\lim_\lambda (b - u_\lambda b) = 0$. Но тогда, так как b — произвольный элемент из I , заключаем, что $\|a + I\|^2 \leq \|a^*a + I\| = \|(a^* + I)(a + I)\|$, что и требовалось. \square

4.5 Положительные линейные функционалы на C^* -алгебрах

Теорема Гельфанда описывает коммутативные C^* -алгебры в терминах характеров, которые фактически являются *одномерными представлениями*. В некоммутативном случае таких представлений не достаточно и приходится рассматривать представления произвольных размерностей. Для описания таких представлений удобно пользоваться положительными линейными функционалами, так что мы начнем с элементов теории таких функционалов.

Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ линейное отображение C^* -алгебр. Отображение φ называется *положительным*, если $\varphi(A^+) \subset B^+$.

Предложение 4.39. Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ — положительное линейное отображение C^* -алгебр. Тогда

- (1) $\varphi(A_{sa}) \subset B_{sa}$, и
- (2) $\varphi: A_{sa} \rightarrow B_{sa}$ — неубывающее отображение.

Доказательство. (1) Пусть $a \in A_{sa}$. Воспользуемся конструкцией 4.11 и представим эрмитов элемент a в виде $a = a^+ - a^-$, где a^\pm — положительные элементы. Так как φ — линейное отображение, то $\varphi(a) = \varphi(a^+) - \varphi(a^-)$. Так как отображение φ положительно, то $\varphi(a^\pm) \in B^+ \subset B_{sa}$. Так как, в силу предложения 3.1, B_{sa} — вещественное векторное подпространство в B , заключаем, что $\varphi(a) \in B_{sa}$, что и требовалось.

(2) Пусть $a, b \in A_{sa}$ такие, что $a \leq b$, тогда $b - a \in A^+$. Как мы только что показали, $\varphi(a), \varphi(b) \in B_{sa}$. Далее, так как φ — положительное линейное отображение, то $\varphi(b - a) = \varphi(b) - \varphi(a) \in B^+$, поэтому $\varphi(a) \leq \varphi(b)$ и, значит, отображение φ неубывающее. \square

Предложение 4.40. Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ — произвольный $*$ -гомоморфизм C^* -алгебр, тогда φ — положительное линейное отображение.

Доказательство. Так как, в силу предложения 3.43, каждый такой φ однозначно продолжается до унитарного $*$ -гомоморфизма унитаризаций \tilde{A} в \tilde{B} , будем сразу считать, что алгебры A, B и гомоморфизм φ — унитарны.

Пусть $a \in A_{sa}$, тогда $a = a^*$, и, так как φ является $*$ -гомоморфизмом, то $\varphi(a^*) = (\varphi(a))^* = \varphi(a)$, откуда $\varphi(a) \in B_{sa}$.

Далее, по предложению 2.29, для каждого $a \in A$ выполнено включение $\sigma(\varphi(a)) \subset \sigma(a)$, поэтому, если $a \in A^+$, т.е. a — эрмитов и $\sigma(a) \subset \mathbb{R}_+$, то, как мы показали выше, $\varphi(a)$ — тоже эрмитов и $\sigma(\varphi(a)) \subset \mathbb{R}_+$, т.е. $\varphi(a) \in B^+$. Последнее и означает положительность φ . \square

Пример 4.41. Для $A = M_n(\mathbb{C})$ рассмотрим линейный функционал — *след* матрицы $a = (a_{pq}) \in A$: $\text{tr}(a) = \sum_{p=1}^n a_{pp}$. Тогда tr — положительный функционал. Действительно, A^+ состоит из эрмитовых матриц с положительным спектром, т.е. $\sigma(a) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \subset \mathbb{R}_+$. Так как $\text{tr}(a) = \sum_{p=1}^n \lambda_p$, то $\text{tr}(a) \geq 0$. Осталось заметить, что $\mathbb{C}^+ = \mathbb{R}^+$, поэтому $\text{tr}(A^+) \subset \mathbb{C}^+$.

Замечание 4.42. Как мы показали в примере 4.41, след комплексной матрицы является положительным линейным функционалом. Ясно, что функционал tr — ненулевой. Оказывается, если от линейного (не обязательно положительного) функционала потребовать еще и сохранения произведения, а также сопряжения, т.е. чтобы функционал был $*$ -гомоморфизмом из $M_n(\mathbb{C})$ в \mathbb{C} , то для $n > 1$ никаких $*$ -гомоморфизмов, кроме нулевого, найти не удастся. Действительно, пусть $\varphi: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ — произвольный $*$ -гомоморфизм. Обозначим $e_{pq} \in M_n(\mathbb{C})$ матрицу, в которой единственный ненулевой элемент расположен в позиции (p, q) и равен 1. Отметим, что $e_{pq}^2 = 0$ при $p \neq q$, и $e_{pp} = e_{pq}e_{qp}$ при всех q . Тогда при $p \neq q$ имеем $\varphi(e_{pq}e_{pq}) = \varphi(e_{pq})^2 = \varphi(0) = 0$, откуда $\varphi(e_{pq}) = 0$. Далее, так как $n > 1$, то для каждого p существует $q \neq p$. Выберем такое q , тогда $\varphi(e_{pp}) = \varphi(e_{pq}e_{qp}) = \varphi(e_{pq})\varphi(e_{qp}) = 0$. Осталось заметить, что для любой матрицы $a = (a_{pq})$ имеем $a = \sum_{p,q} a_{pq}e_{pq}$, откуда $\varphi(a) = \sum_{p,q} a_{pq}\varphi(e_{pq}) = 0$.

Пусть A — некоторая C^* -алгебра, и τ — положительный функционал на ней. Определим функцию $f_\tau: A \times A \rightarrow \mathbb{C}$ так: $f_\tau(a, b) = \tau(b^*a)$.

Лемма 4.43. В сделанных обозначениях, функция f_τ является положительной полуторалинейной формой на A .

Доказательство. Действительно, для $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ и $a_1, a_2, b_1, b_2 \in A$ имеем:

$$f_\tau(z_1a_1 + z_2a_2, b) = \tau(b^*(z_1a_1 + z_2a_2)) = z_1\tau(b^*a_1) + z_2\tau(b^*a_2) = z_1f_\tau(a_1, b) + z_2f_\tau(a_2, b),$$

и

$$f_\tau(a, z_1b_1 + z_2b_2) = \tau((z_1b_1 + z_2b_2)^*a) = \bar{z}_1\tau(b_1^*a) + \bar{z}_2\tau(b_2^*a) = \bar{z}_1f_\tau(a, b_1) + \bar{z}_2f_\tau(a, b_2).$$

Кроме того, $f_\tau(a, a) = \tau(a^*a) \in \mathbb{R}_+$, так как $a^*a \in A^+$ по теореме 4.18. Таким образом, f_τ — положительная полуторалинейная форма, что и требовалось. \square

Напомним необходимые факты про полуторалинейные формы.

Утверждение 4.44. Пусть $\beta: A \times A \rightarrow \mathbb{C}$ — полуторалинейная форма на $*$ -алгебре A . Тогда

(1) Имеет место так называемое **полярное разложение**:

$$4\beta(a, b) = \beta(a + b, a + b) - \beta(a - b, a - b) + i\beta(a + ib, a + ib) - i\beta(a - ib, a - ib).$$

(2) Если $\beta(a, a) \in \mathbb{R}$ для любого a , то

$$4\operatorname{Re} \beta(a, b) = \beta(a + b, a + b) - \beta(a - b, a - b), \quad 4\operatorname{Im} \beta(a, b) = \beta(a + ib, a + ib) - \beta(a - ib, a - ib),$$

и $\overline{\beta(a, b)} = \beta(b, a)$ для любых $a, b \in A$.

(3) Имеет место неравенство Шварца: $|\beta(x, y)|^2 \leq \beta(x, x)\beta(y, y)$.

(4) Если $\beta(a, a) \in \mathbb{R}_+$ для любого a , то функция $h(a) = \sqrt{\beta(a, a)}$ задает полунорму на A .

Доказательство. Действительно,

$$\begin{aligned} & \beta(a + b, a + b) - \beta(a - b, a - b) + i\beta(a + ib, a + ib) - i\beta(a - ib, a - ib) = \\ & = (\beta(a, a) + \beta(a, b) + \beta(b, a) + \beta(b, b)) - (\beta(a, a) - \beta(a, b) - \beta(b, a) + \beta(b, b)) + \\ & + i(\beta(a, a) - i\beta(a, b) + i\beta(b, a) + \beta(b, b)) - i(\beta(a, a) + i\beta(a, b) - i\beta(b, a) + \beta(b, b)) = 4\beta(a, b). \end{aligned}$$

Поэтому, если $\beta(a, a) \in \mathbb{R}$ для любого a , то значения формы β , стоящие в правой части формулы полярного разложения, вещественны, поэтому

$$4\operatorname{Re} \beta(a, b) = \beta(a + b, a + b) - \beta(a - b, a - b), \quad 4\operatorname{Im} \beta(a, b) = \beta(a + ib, a + ib) - \beta(a - ib, a - ib).$$

Далее,

$$\begin{aligned} 4\beta(b, a) & = \beta(b + a, b + a) - \beta(b - a, b - a) + i\beta(b + ia, b + ia) - i\beta(b - ia, b - ia) = \\ & = \beta(a + b, a + b) - \beta(a - b, a - b) + ii\bar{i}\beta(b/i + a, b/i + a) - ii\bar{i}\beta(b/i - a, b/i - a) = \\ & = \beta(a + b, a + b) - \beta(a - b, a - b) + i\beta(-ib + a, -ib + a) - i\beta(-ib - a, -ib - a) = \\ & = \beta(a + b, a + b) - \beta(a - b, a - b) + i\beta(a - ib, a - ib) - i\beta(a + ib, a + ib) = \\ & = (\beta(a + b, a + b) - \beta(a - b, a - b)) - i(\beta(a + ib, a + ib) - \beta(a - ib, a - ib)) = 4\overline{\beta(a, b)}, \end{aligned}$$

что и требовалось.

Далее,

$$0 \leq \beta(x - \lambda y, x - \lambda y) = \beta(x, x) - \lambda\beta(y, x) - \bar{\lambda}\beta(x, y) + |\lambda|^2\beta(y, y).$$

Подставим $\lambda = \beta(x, y)/\beta(y, y)$. Получим:

$$\begin{aligned} 0 \leq \beta(x, x) - \beta(x, y)\beta(y, x)/\beta(y, y) - \overline{\beta(x, y)}\beta(x, y)/\beta(y, y) + |\beta(x, y)|^2\beta(y, y)/\beta(y, y) = \\ = \beta(x, x) - |\beta(x, y)|^2\beta(y, y)/\beta(y, y), \end{aligned}$$

откуда $|\beta(x, y)|^2 \leq \beta(x, x)\beta(y, y)$.

Наконец, $h(\lambda a) = \sqrt{\beta(\lambda a, \lambda a)} = \sqrt{|\lambda|^2\beta(a, a)} = |\lambda|\sqrt{\beta(a, a)} = |\lambda|h(a)$. Неравенство Шварца в этих обозначениях имеет вид $|\beta(x, y)| \leq h(x)h(y)$. Имеем:

$$\begin{aligned} h(x + y)^2 & = \beta(x + y, x + y) = \beta(x, x) + \beta(y, x) + \beta(x, y) + \beta(y, y) = \beta(x, x) + \beta(y, y) + 2\operatorname{Re} \beta(x, y) \leq \\ & \leq h(x)^2 + h(y)^2 + 2|\beta(x, y)| \leq h(x)^2 + h(y)^2 + 2h(x)h(y) = (h(x) + h(y))^2. \end{aligned}$$

Таким образом, функция h положительно однородна и удовлетворяет неравенству треугольника. \square

Свойства полуторалинейной формы можно переформулировать так.

Следствие 4.45. В сделанных обозначениях,

$$\overline{\tau(a^*b)} = \tau(b^*a), \quad \text{и} \quad |\tau(b^*a)| \leq \tau(a^*a)^{1/2}\tau(b^*b)^{1/2},$$

а функция $a \mapsto \tau(a^*a)^{1/2}$ является полунормой на A .

Предложение 4.46. Пусть A — произвольная C^* -алгебра, $\tau: A \rightarrow \mathbb{C}$ — линейный функционал (не обязательно непрерывный), $B_1(0) \subset A$ — замкнутый единичный шар с центром в нуле, M — неотрицательное вещественное число. Предположим, что для любого $a \in B_1(0) \cap A^+$ выполняется $|\tau(a)| \leq M$, тогда $\|\tau\| \leq 4M$, так что τ ограничен и, значит, непрерывен.

Доказательство. Пусть сначала $a \in A_{sa} \cap B_1(0)$. Тогда существуют $a^+, a^- \in A^+$ такие, что $a = a^+ - a^-$ (см. конструкцию 4.11). По предложению 4.12, $\|a^\pm\| \leq 1$, так что $a^\pm \in B_1(0) \cap A^+$, поэтому

$$|\tau(a)| = |\tau(a^+ - a^-)| = |\tau(a^+) - \tau(a^-)| \leq |\tau(a^+)| + |\tau(a^-)| \leq 2M.$$

Пусть теперь a — произвольный элемент из $B_1(0)$. По предложению 3.2, $a = b + ic$ для некоторых $b, c \in A_{sa}$. По предложению 3.16, имеем $\|b\| \leq \|a\| \leq 1$ и $\|c\| \leq \|a\| \leq 1$. Но тогда

$$|\tau(a)| = |\tau(b) + i\tau(c)| \leq |\tau(b)| + |\tau(c)| \leq 4M.$$

Осталось воспользоваться тем, что доказанное неравенство имеет место для любого $a \in B_1(0)$. \square

Теорема 4.47. Пусть $\tau: A \rightarrow \mathbb{C}$ — положительный линейный функционал на C^* -алгебре A , тогда τ ограничен и, значит, непрерывен.

Доказательство. Предположим, что τ неограничен. В силу предложения 4.46, функционал τ неограничен также на множестве S всех положительных элементов единичной нормы (иначе он ограничен в шаре). Это означает, что в S существует последовательность a_n , для которой $\tau(a_n) \geq 2^n$, $n \in \mathbb{N}$. Рассмотрим ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n/2^n$, и пусть $s_k = \sum_{n=1}^k a_n/2^n$ — его частичная сумма. Тогда для $p < q$

$$\|s_p - s_q\| \leq \sum_{n=p}^q \|a_n\|/2^n = \sum_{n=p}^q 1/2^n = 1/2^{p-1} - 1/2^q,$$

поэтому последовательность s_k фундаментальна и, значит, она сходится к $a := \sum_{n=1}^{\infty} a_n/2^n$. По лемме 4.17, каждый элемент s_k положительный. По следствию 4.16, элемент a также положительный. Так как $\tau(a_n/2^n) \geq 1$, то $\tau(s_k) = \sum_{n=1}^k \tau(a_n/2^n) \geq k$. Однако, аналогично показанному выше, $a - s_k = \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n/2^n$ — положительный элемент, поэтому $s_k \leq a$. Так как функционал τ положительный, то $\tau(a - s_k) = \tau(a) - \tau(s_k)$ положительно, поэтому $\tau(a) \geq \tau(s_k) \geq k$. Так как k можно выбрать сколь угодно большим, приходим к противоречию, т.е. τ должен быть ограниченным. \square

Лемма 4.48. Пусть $u \in A^+$, $\|u\| \leq 1$. Тогда $u \leq 1$, $u^2 \leq u$, и $\|u^2\| \leq 1$.

Доказательство. Действительно, u — эрмитов, $r(u) = \|u\| \leq 1$, и u — положителен, поэтому $\sigma(u) \in [0, 1]$. Поэтому $\sigma(1 - u) \subset \mathbb{R}_+$, откуда $u \leq 1$. Далее, неравенство $u^2 \leq u$ получается из предыдущего сопряжением с $u^{1/2}$. Наконец, $u^2 \leq u \leq 1$, поэтому $\|u^2\| \leq 1$, что и требовалось. \square

Утверждение 4.49. Пусть $\tau: A \rightarrow \mathbb{C}$ — положительный линейный функционал на C^* -алгебре A , тогда для всех $a \in A$ выполняется

$$(1) \quad \tau(a^*) = \overline{\tau(a)} \quad \text{и}$$

$$(2) \quad |\tau(a)|^2 \leq \|\tau\| \tau(a^*a).$$

Доказательство. Пусть $\{u_\lambda\}$ — аппроксимативная единица в A . Тогда, используя следствие 4.45, имеем:

$$\tau(a^*) = \lim_{\lambda} \tau(a^*u_\lambda) = \lim_{\lambda} \overline{\tau((a^*u_\lambda)^*)} = \lim_{\lambda} \overline{\tau(u_\lambda a)} = \overline{\tau(a)}.$$

Аналогично,

$$|\tau(a)|^2 = \lim_{\lambda} |\tau(u_\lambda a)|^2 \leq \sup_{\lambda} \tau(u_\lambda^* u_\lambda) \tau(a^* a) \leq \|\tau\| \tau(a^* a),$$

где в последнем неравенстве использована лемма 4.48. \square

Теорема 4.50. Пусть τ — ограниченный линейный функционал на C^* -алгебре A . Тогда следующие условия эквивалентны:

- (1) функционал τ — положителен;
- (2) для любой аппроксимативной единицы $\{u_\lambda\}$ в алгебре A выполняется равенство $\|\tau\| = \lim_\lambda \tau(u_\lambda)$;
- (3) для некоторой аппроксимативной единицы $\{u_\lambda\}$ в алгебре A выполняется равенство $\|\tau\| = \lim_\lambda \tau(u_\lambda)$.

Доказательство. Докажем сначала, что из (1) следует (2). Предположим для простоты, что $\|\tau\| = 1$. Так как τ — положительный, монотонный и ограниченный, направленность $\{\tau(u_\lambda)\}$ — возрастающая, содержится в отрезке $[0, 1]$, поэтому $0 \leq \lim_\lambda \tau(u_\lambda) = \sup_\lambda \{\tau(u_\lambda)\} \leq 1$.

Мы воспользовались следующей леммой (докажите).

Лемма 4.51. Пусть $\{x_\lambda\}_\lambda \subset \mathbb{R}$ — направленность относительно стандартного отношения порядка, и предположим, что $\{x_\lambda\}_\lambda$ ограничена сверху. Тогда направленность $\{x_\lambda\}_\lambda$ сходится и $\lim_\lambda x_\lambda = \sup_\lambda x_\lambda$.

Пусть теперь $a \in A$, $\|a\| \leq 1$. Тогда $\tau(a) \leq 1$ и, так как $\|a^*a\| = \|a\|^2 \leq 1$, то $\tau(a^*a) \leq 1$. Далее,

$$|\tau(u_\lambda a)|^2 = |\tau(u_\lambda^* a)|^2 \leq \tau(u_\lambda^* u_\lambda) \tau(a^* a) \leq \tau(u_\lambda^* u_\lambda) = \tau(u_\lambda^2).$$

Далее, так как отображение τ — неубывающее (предложение 4.39), то

$$|\tau(u_\lambda a)|^2 \leq \tau(u_\lambda^2) \leq \tau(u_\lambda) \leq \sup_\lambda \tau(u_\lambda) = \lim_\lambda \tau(u_\lambda).$$

Переходя к пределу, заключаем, что $|\tau(a)| = \lim_\lambda |\tau(u_\lambda a)|$, поэтому $|\tau(a)| \leq \lim_\lambda \tau(u_\lambda)$. Так как a — произвольный элемент с нормой не больше 1 и $\|\tau\| = 1$, получаем, что $1 \leq \lim_\lambda \tau(u_\lambda)$, откуда и вытекает требуемое.

Импликация (2) \Rightarrow (3) очевидна.

Докажем теперь импликацию (3) \Rightarrow (1). Пусть $\{u_\lambda\}$ — некоторая аппроксимативная единица, для которой выполняется равенство $1 = \|\tau\| = \lim_\lambda \tau(u_\lambda)$. Пусть a — некоторый эрмитов элемент, $\|a\| \leq 1$. Положим $\tau(a) = \alpha + i\beta$, где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Покажем, что $\tau(a) \in \mathbb{R}$, то есть $\beta = 0$. Рассмотрим случай $\beta \leq 0$, случай неотрицательного β рассматривается аналогично. Для любого натурального n имеем:

$$\begin{aligned} \|a - inu_\lambda\|^2 &= \|(a + inu_\lambda)(a - inu_\lambda)\| = \|a^2 + n^2 u_\lambda^2 - in(au_\lambda - u_\lambda a)\| \leq \\ &\leq \|a^2\| + \|n^2 u_\lambda^2\| + \|in(au_\lambda - u_\lambda a)\| \leq 1 + n^2 + n\|au_\lambda - u_\lambda a\|. \end{aligned}$$

Поэтому, применяя утверждение 4.49, получаем

$$|\tau(a - inu_\lambda)|^2 \leq \|t\|^2 \|a - inu_\lambda\|^2 \leq 1 + n^2 + n\|au_\lambda - u_\lambda a\|.$$

Переходя к пределу и учитывая, что $\lim_\lambda \tau(a - inu_\lambda) = \tau(a) - in \lim_\lambda \tau(u_\lambda) = \tau(a) - in = \alpha + i\beta - in$, а также $\lim_\lambda (au_\lambda - u_\lambda a) = 0$, имеем $|\alpha + i\beta - in|^2 = \alpha^2 + \beta^2 + n^2 - 2n\beta \leq 1 + n^2$, откуда заключаем, что неравенство $-2n\beta \leq 1 - \alpha^2 - \beta^2$ выполнено при всех натуральных n . Учитывая, что $\beta \leq 0$, последнее возможно только при $\beta = 0$. Таким образом, если a эрмитов, то $\tau(a) \in \mathbb{R}$.

Пусть теперь $a \in A^+$, $\|a\| \leq 1$. Тогда элемент $u_\lambda - a$ эрмитов, $\|u_\lambda - a\| \leq 1$, поэтому $\tau(u_\lambda - a) \leq 1$. Но тогда $1 \geq \lim_\lambda \tau(u_\lambda - a) = 1 - \tau(a)$, поэтому $\tau(a) \geq 0$, то есть τ — положительный. Теорема доказана. \square

Следствие 4.52. Ограниченный линейный функционал τ на унитарной C^* -алгебре A положителен тогда и только тогда, когда $\tau(1) = \|\tau\|$.

Доказательство. Рассмотрим последовательность $\{u_i = 1\}$. Это — аппроксимативная единица в алгебре A . Теперь утверждение следствия следует из теоремы 4.50 (равносильность пунктов (1) и (3)). \square

Следствие 4.53. Пусть τ и τ' — положительные линейные функционалы на C^* -алгебре A . Тогда $\|\tau + \tau'\| = \|\tau\| + \|\tau'\|$.

Доказательство. Действительно, если $\{u_\lambda\}$ — аппроксимативная единица, то по теореме 4.50 имеем:

$$\|\tau + \tau'\| = \lim_\lambda (\tau + \tau')(u_\lambda) = \lim_\lambda (\tau(u_\lambda) + \tau'(u_\lambda)) = \lim_\lambda \tau(u_\lambda) + \lim_\lambda \tau'(u_\lambda) = \|\tau\| + \|\tau'\|.$$

Следствие доказано. \square

Состоянием C^* -алгебры A называется всякий положительный линейный функционал на A нормы 1. Множество всех состояний алгебры A обозначим через $\mathcal{S}(A)$.

В силу следствия 4.52, имеет место следующий результат, который можно принять за эквивалентное определение состояния.

Следствие 4.54. Для унитарной C^* -алгебры A , положительный функционал τ является состоянием, если и только если $\tau(1) = 1$.

Напомним, что элемент $a \in A$ называется нормальным, если $a^*a = aa^*$.

Теорема 4.55. Пусть a — нормальный элемент ненулевой C^* -алгебры A . Тогда существует такое состояние $\tau \in \mathcal{S}(A)$, что $|\tau(a)| = \|a\|$.

Доказательство. Без ограничения общности $a \neq 0$. Рассмотрим коммутативную алгебру $B = C^*(a, 1)$, порожденную элементами 1 и a в унитаризации \hat{A} алгебры A . Так как B коммутативна, по теореме Гельфанда (теорема 3.48) пространство характеров $\Omega(B)$ компактно, и, так как функция \hat{a} непрерывна, существует характер $\tau_2 \in \Omega(B)$ такой, что $|\tau_2(a)| = \|\hat{a}\|_\infty = \|a\|$. Кроме того, $\tau_2(1) = 1$, поэтому $\|\tau_2\| = 1$.

Далее, по теореме Хана–Банаха, τ_2 можно продолжить на алгебру \hat{A} с сохранением нормы. Обозначим продолжение через τ_1 . Так как $\tau_1(1) = \tau_2(1) = 1 = \|\tau_1\|$, то функционал τ_1 положителен по следствию 4.52. Положим $\tau = \tau_1|_A$. Тогда τ — положительный линейный функционал на A , $|\tau(a)| = \|a\|$, и $\|\tau\| \leq \|\tau_1\| = 1$. С другой стороны, $\|a\| = |\tau(a)| \leq \|\tau\|\|a\|$, откуда $\|\tau\| \geq 1$, то есть $\|\tau\| = 1$. Таким образом, τ — положительный функционал единичной нормы, что и требовалось. \square

Утверждение 4.56. Пусть τ — положительный линейный функционал на C^* -алгебре A . Тогда

- (1) для данного $a \in A$ равенство $\tau(a^*a) = 0$ выполняется, если и только если $\tau(ba) = 0$ при всех $b \in A$;
- (2) при всех $a, b \in A$ выполняется неравенство $\tau(b^*a^*ab) \leq \|a^*a\|\tau(b^*b)$.

Доказательство. Напомним неравенство Шварца (следствие 4.45): $|\tau(b^*a)| \leq \tau(a^*a)^{1/2}\tau(b^*b)^{1/2}$. Поэтому, если $\tau(a^*a) = 0$, то $\tau(b^*a) = 0$ для всех b . Обратное утверждение очевидно, достаточно взять $b = a^*$.

При доказательстве второго утверждения можно предполагать, что $\tau(b^*b) > 0$ (иначе, в силу первого утверждения, в левой и правой части — нули). Рассмотрим функцию

$$f: A \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(c) = \frac{\tau(b^*cb)}{\tau(b^*b)}.$$

Функция f линейна, так как τ — линейный функционал. Более того, если c положителен, то элемент b^*cb тоже положителен по теореме 4.24, поэтому $f(c) \geq 0$, то есть f — линейный положительный функционал. Применим теорему 4.50. Пусть $\{u_\lambda\}$ — аппроксимативная единица. Получаем:

$$\|f\| = \lim_{\lambda} f(u_\lambda) = \lim_{\lambda} \frac{\tau(b^*u_\lambda b)}{\tau(b^*b)} = \frac{\tau(b^*b)}{\tau(b^*b)} = 1.$$

Значит $f(a^*a) \leq \|a^*a\|$, откуда $f(a^*a) = \tau(b^*a^*ab)/\tau(b^*b) \leq \|a^*a\|$, то есть $\tau(b^*a^*ab) \leq \tau(b^*b)\|a^*a\|$, что и требовалось. \square

Следующий результат касается продолжения положительных функционалов.

Теорема 4.57. Пусть B — некоторая C^* -подалгебра в C^* -алгебре A и τ — положительный линейный функционал на B . Тогда на A существует положительный линейный функционал τ' , продолжающий τ , так что $\|\tau\| = \|\tau'\|$.

Доказательство. Рассмотрим сначала случай $A = \tilde{B}$. Определим линейный функционал так: $\tau'(b + \lambda 1) = \tau(b) + \lambda\|\tau\|$, $b \in B$, $\lambda \in \mathbb{C}$. Пусть $\{u_\lambda\}$ — аппроксимативная единица в B , тогда $\|\tau\| = \lim_{\lambda} \tau(u_\lambda)$ согласно теореме 4.50. Пусть теперь $b \in B$ и $\mu \in \mathbb{C}$. Тогда

$$|\tau'(b + \mu)| = |\tau(b) + \mu\|\tau\|| = \left| \lim_{\lambda} \tau(bu_\lambda) + \mu \lim_{\lambda} \tau(u_\lambda) \right| = \left| \lim_{\lambda} \tau((b + \mu)u_\lambda) \right|,$$

где последнее равенство справедливо, поскольку B — идеал в \tilde{B} . Продолжим оценку:

$$|\tau'(b + \mu)| = \left| \lim_{\lambda} \tau((b + \mu)u_\lambda) \right| \leq \sup_{\lambda} \|\tau\| \|(b + \mu)u_\lambda\| = \|\tau\| \sup_{\lambda} \|(b + \mu)u_\lambda\| \leq \|\tau\| \|b + \mu\|,$$

так как $\|u_\lambda\| \leq 1$. Поэтому $\|\tau'\| \leq \|\tau\|$. Обратное неравенство очевидно, поскольку τ' — продолжение τ . Таким образом, $\|\tau'\| = \|\tau\| = \tau'(1)$, где последнее равенство очевидно из определения τ' . Поэтому τ' положителен в силу следствия 4.52. Утверждение теоремы доказано для случая $A = \tilde{B}$.

Перейдем к общему случаю. При необходимости, заменим B и A на их унитализации \tilde{B} и \tilde{A} и продолжим τ с подалгебры B на \tilde{B} как описано выше. Поэтому можно предполагать, что A содержит 1, которая лежит в B . Тогда $\tau(1) = \|\tau\|$. Воспользуемся теоремой Хана–Банаха и продолжим линейный ограниченный функционал τ до линейного функционала τ' на A с сохранением нормы. Но тогда $\tau'(1) = \tau(1) = \|\tau\| = \|\tau'\|$, и функционал τ' положителен в силу следствия 4.52. \square

Нам понадобится следующая лемма.

Лемма 4.58. Пусть A — некоторая C^* -алгебра и τ — ограниченный линейный функционал на ней. Тогда

$$\|\tau\| = \sup_{\|a\| \leq 1} |\operatorname{Re} \tau(a)|.$$

Доказательство. Действительно, $|\operatorname{Re} \tau(a)| \leq |\tau(a)|$, поэтому $\sup_{\|a\| \leq 1} |\operatorname{Re} \tau(a)| \leq \|\tau\|$. С другой стороны, если $a \in A$, $\|a\| \leq 1$, то существует такое $\lambda \in \mathbb{C}$, $|\lambda| = 1$, что $\lambda\tau(a) \in \mathbb{R}$. Тогда

$$|\tau(a)| = |\lambda\tau(a)| = |\tau(\lambda a)| = |\operatorname{Re}(\lambda\tau(a))| = |\operatorname{Re}(\tau(\lambda a))|,$$

причем $\|\lambda a\| \leq 1$, поэтому искомое равенство достигается. \square

Пусть τ — ограниченный линейный функционал на A . Определим отображение τ^* так: $\tau^*(a) = \overline{\tau(a^*)}$. Заметим, что τ^* — комплексно-линейный функционал на A , тем самым, мы определили отображение $A^* \rightarrow A^*$. Ясно, что это отображение сопряженно линейно, $(\tau^*)^* = \tau$ и $\|\tau^*\| = \|\tau\|$.

Далее, назовем функционал τ **самосопряженным**, если $\tau^* = \tau$. Каждый ограниченный линейный функционал представим в виде $\tau = \tau_1 + i\tau_2$, где τ_1 и τ_2 — однозначно определенные самосопряженные функционалы, $\tau_1 = (\tau + \tau^*)/2$, $\tau_2 = (\tau - \tau^*)/2i$.

Лемма 4.59. Функционал τ самосопряжен тогда и только тогда, когда $\tau(A_{sa}) \subset \mathbb{R}$.

Доказательство. Если $a \in A_{sa}$, $\tau(a) = \tau^*(a) = \overline{\tau(a^*)} = \overline{\tau(a)}$, поэтому $\tau(a) \in \mathbb{R}$. Обратно, представим произвольный элемент $a \in A$ в виде $a = b + ic$, где $b = (a + a^*)/2$ и $c = (a - a^*)/2i$ — эрмитовы элементы алгебры. Тогда $\tau(b), \tau(c) \in \mathbb{R}$, поэтому

$$\tau(a^*) = \tau(b - ic) = \tau(b) - i\tau(c) = \overline{\tau(b) + i\tau(c)} = \overline{\tau(b + ic)} = \overline{\tau(a)},$$

откуда $\tau^*(a) = \overline{\tau(a^*)} = \tau(a)$, что и требовалось. \square

Обозначим через τ' ограничение функционала τ на A_{sa} . Напомним, что A_{sa} — вещественное линейное подпространство. Если τ — самосопряжен, то $\tau': A_{sa} \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченный вещественный линейный функционал.

Лемма 4.60. В сделанных обозначениях, если τ самосопряжен, то $\|\tau'\| = \|\tau\|$.

Доказательство. Нужно проверить, что

$$\|\tau\| = \|\tau'\| = \sup_{\substack{a \in A_{sa} \\ \|a\| \leq 1}} |\tau(a)|.$$

Действительно, так как τ самосопряжен, то $\operatorname{Re} \tau(a) = \tau(\operatorname{Re}(a))$ (проверьте). Поэтому, по лемме 4.58,

$$\|\tau\| = \sup_{\|a\| \leq 1} |\operatorname{Re} \tau(a)| = \sup_{\|a\| \leq 1} |\tau(\operatorname{Re} a)| \leq \sup_{\substack{b \in A_{sa} \\ \|b\| \leq 1}} \tau(b) \leq \|\tau\|,$$

откуда и вытекает требуемое. \square

Напоминание 4.61. Пусть Ω — компактное хаусдорфово пространство, и $C(\Omega, \mathbb{R})$ — банахово пространство непрерывных вещественнозначных функций на Ω (операции — поточечные, норма — суп-норма). Тогда теорема Рисса–Маркова–Какутани утверждает, что для каждого вещественного непрерывного линейного функционала $\tau: C(\Omega, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ существует единственная знакопеременная мера μ , такая, что $\tau(f) = \int f d\mu$ для всех $f \in C(\Omega, \mathbb{R})$. Более того, $\|\mu\| = \|\tau\|$, и μ — мера, если и только если функционал τ — положителен, то есть $\tau(f) \geq 0$ для любой неотрицательной функции f .

Для знакопеременных мер известно разложение Жордана, а именно, для каждой знакопеременной меры μ существуют меры μ^\pm , такие, что $\mu = \mu^+ - \mu^-$ и $\|\mu\| = \|\mu^+\| + \|\mu^-\|$. Теорема Рисса превращает это утверждение в следующее.

Утверждение 4.62. Для каждого ограниченного вещественного линейного функционала $\tau: C(\Omega, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ существуют положительные ограниченные линейные функционалы $\tau_\pm: C(\Omega, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, такие, что $\tau = \tau_+ - \tau_-$ и $\|\tau\| = \|\tau_+\| + \|\tau_-\|$.

Наша ближайшая цель — обобщить это утверждение на случай C^* -алгебр.

Обозначим через A_{sa}^* множество всех самосопряженных функционалов. Ясно, что A_{sa}^* — вещественное линейное банахово пространство, а также вещественное линейное подпространство в A^* . Для вещественного линейного пространства X обозначим через $X^\#$ вещественное двойственное пространство, то есть пространство всех ограниченных вещественных линейных функционалов на X .

Лемма 4.63. Определенное выше отображение $\tau \mapsto \tau'$ является изометричным вещественно-линейным изоморфизмом $A_{sa}^* \rightarrow A_{sa}^\#$.

Доказательство. Действительно, линейность очевидна из определения, норма сохраняется по лемме 4.63. Инъективность отображения очевидна. Наконец, если $\tau' \in A_{sa}^\#$, то определим $\tau \in A_{sa}^*$ так. Представим произвольный элемент $a \in A$ в виде $a = b + ic$, где $b = (a + a^*)/2$ и $c = (a - a^*)/2i$ — эрмитовы элементы, и положим $\tau(a) = \tau'(b) + i\tau'(c)$. Тогда

$$\tau^*(a) = \overline{\tau(a^*)} = \overline{\tau(b - ic)} = \overline{\tau'(b) - i\tau'(c)} = \tau'(b) + i\tau'(c) = \tau(a),$$

то есть $\tau \in A_{sa}^*$ и, очевидно, ограничение τ на A_{sa} совпадает с τ' . Поэтому отображение $\tau \mapsto \tau'$ сюръективно. Лемма доказана. \square

Теорема 4.64 (разложение Жордана). Для каждого самосопряженного ограниченного линейного функционала τ на C^* -алгебре A существуют положительные ограниченные функционалы τ_\pm на A , такие, что $\tau = \tau_+ - \tau_-$ и $\|\tau\| = \|\tau_+\| + \|\tau_-\|$.

Доказательство. Обозначим через Ω множество всех положительных функционалов τ , таких, что $\|\tau\| \leq 1$. Тогда множество Ω замкнуто в $*$ -слабой топологии, содержится в единичном шаре в пространстве A^* , который компактен в $*$ -слабой топологии (теорема Банаха–Алаоглу), поэтому Ω — хаусдорфов компакт (в $*$ -слабой топологии).

Определим отображение $\theta: A_{sa} \rightarrow C(\Omega, \mathbb{R})$, задав функцию $\theta(a) \in C(\Omega, \mathbb{R})$ так: $\theta(a)(\tau) = \tau(a)$, $\tau \in \Omega$. Ясно, что отображение θ вещественно-линейное, кроме того, если $a \in A^+$ — положительный элемент, то $\tau(a) \in \mathbb{R}_+$, то есть функция $\theta(a)$ принимает неотрицательные значения. Далее, $\|\theta(a)\| = \sup_{\tau \in \Omega} |\tau(a)| \leq \|a\|$, так как $\|\tau\| \leq 1$. С другой стороны, по теореме 4.55 существует такой положительный функционал τ единичной нормы, то есть $\tau \in \Omega$, что $|\tau(a)| = \|a\|$, поэтому $\|\theta(a)\| = \|a\|$, то есть отображение θ сохраняет норму. Положим $L = \theta(A_{sa}) \subset C(\Omega, \mathbb{R})$ — (вещественное) линейное подпространство. Тогда $\theta: A_{sa} \rightarrow L$ — линейный изоморфизм, сохраняющий норму.

Пусть $\tau \in A_{sa}^*$, тогда $\tau' = \tau|_{A_{sa}} \in A_{sa}^\#$ можно рассматривать как функционал на L той же нормы. Тогда, по теореме Хана–Банаха, существует продолжение $\rho \in C(\Omega, \mathbb{R})^\#$ с L на $C(\Omega, \mathbb{R})$, то есть $\rho \circ \theta = \tau'$, причем $\|\rho\| = \|\tau'\|$. Теперь применим к ρ утверждение 4.62, согласно которому существуют положительные функционалы $\rho_\pm \in C(\Omega, \mathbb{R})^\#$, такие, что $\rho = \rho_+ - \rho_-$ и $\|\rho\| = \|\rho_+\| + \|\rho_-\|$. Положим $\tau'_\pm = \rho_\pm \circ \theta$. Ясно, что $\tau'_\pm \in A_{sa}^\#$. Как в доказательстве леммы 4.63, построим соответствующие $\tau_\pm \in A_{sa}^*$. Тогда $\tau = \tau_+ - \tau_-$. Легко проверить, что функционалы τ_\pm — положительны. Наконец, используя лемму 4.58, получаем

$$\|\tau\| = \|\tau'\| = \|\rho\| = \|\rho_+\| + \|\rho_-\| \geq \|\tau'_+\| + \|\tau'_-\| = \|\tau_+\| + \|\tau_-\| \geq \|\tau\|,$$

где первое неравенство имеет место, поскольку ρ_\pm является продолжением τ'_\pm , последнее неравенство — это неравенство треугольника. Поэтому $\|\tau_+\| + \|\tau_-\| = \|\tau\|$. Теорема доказана. \square

Замечание 4.65. Можно показать, что функционалы τ_\pm из теоремы 4.64 определены однозначно.

4.6 Конструкция Гельфанда–Наймарка–Сигала

Представлением C^* -алгебры A называется пара (H, φ) , где H — некоторое гильбертово пространство, а $\varphi: A \rightarrow \mathcal{B}(H)$ — $*$ -гомоморфизм в алгебру ограниченных линейных операторов на H . Представление называется **точным**, если φ инъективен.

Пусть $(H_\lambda)_\lambda$ — семейство гильбертовых пространств. Тогда определена их прямая сумма $\bigoplus_\lambda H_\lambda = \{(h_\lambda) \in \prod_\lambda H_\lambda : \sum_\lambda \|h_\lambda\|^2 < \infty\}$, которая является гильбертовым пространством относительно скалярного произведения $\langle (u_\lambda), (v_\lambda) \rangle = \sum_\lambda \langle u_\lambda, v_\lambda \rangle$.

Задача 4.66. Проверьте, что $\bigoplus_\lambda H_\lambda$ с очевидными покомпонентными операциями и определенным выше скалярным произведением действительно является линейным пространством с корректно определенным скалярным произведением, полным относительно соответствующей нормы, то есть является гильбертовым пространством.

Далее, пусть $((H_\lambda, \varphi_\lambda))_{\lambda \in \Lambda}$ — некоторое семейство представлений алгебры A . Тогда определена их **прямая сумма** (H, φ) , где $H = \bigoplus_\lambda H_\lambda$, а $\varphi(a)((h_\lambda)) = (\varphi_\lambda(a)(h_\lambda))$. Если для любого $a \in A$ найдется индекс λ , такой, что $\varphi_\lambda(a) \neq 0$, то представление (H, φ) — точное.

Задача 4.67. Проверьте, что (H, φ) действительно является представлением алгебры A , то есть что $\varphi: A \rightarrow \mathcal{B}(H)$ — некоторый $*$ -гомоморфизм.

Напомним, что для каждого линейного пространства L со скалярным произведением можно определить пополнение \hat{L} соответствующего нормированного пространства, на котором, в свою очередь, определено скалярное произведение, являющееся продолжением исходного. В результате получается гильбертово пространство, которое называется **гильбертовым пополнением L** .

Пусть τ — положительный линейный функционал на C^* -алгебре A .

$$N_\tau = \{a \in A : \tau(a^*a) = 0\}.$$

Лемма 4.68. В сделанных обозначениях, N_τ — замкнутый левый идеал в A .

Доказательство. Действительно, для любого $x \in A$ и $a \in N_\tau$ имеем: $\tau((xa)^*(xa)) = \tau((a^*x^*x)a) = 0$ по утверждению 4.56, поэтому $xa \in N_\tau$, то есть N_τ — левый идеал. Замкнутость его следует из непрерывности τ . \square

Рассмотрим фактор-пространство A/N_τ и определим отображение

$$F_\tau: (A/N_\tau)^2 \rightarrow \mathbb{C}, \quad F_\tau: (a + N_\tau, b + N_\tau) \mapsto \tau(b^*a).$$

Лемма 4.69. Определенное только что отображение задает на A/N_τ полуторалинейное скалярное произведение.

Доказательство. Согласно лемме 4.43, отображение $f_\tau: (a, b) \mapsto \tau(b^*a)$ задает на A положительную полуторалинейную форму. Нужно показать, что F_τ невырождена на A/N_τ . Действительно, $F_\tau(a + N_\tau, a + N_\tau) = \tau(a^*a) = 0$, если и только если $a \in N_\tau$, то есть, $a + N_\tau = 0$ в A/N_τ , что и требовалось. \square

Обозначим через H_τ гильбертово пополнение пространства A/N_τ . Для каждого $a \in A$ определим отображение $\varphi(a): A/N_\tau \rightarrow A/N_\tau$ так: $\varphi(a)(b + N_\tau) = ab + N_\tau$.

Лемма 4.70. Отображение $\varphi(a)$ — линейно, более того $\|\varphi(a)\| \leq \|a\|$, в частности, $\varphi(a) \in \mathcal{B}(A/N_\tau)$.

Доказательство. Линейность очевидна:

$$\begin{aligned} \varphi(a)((b_1 + N_\tau) + (b_2 + N_\tau)) &= \varphi(a)(b_1 + b_2 + N_\tau) = a(b_1 + b_2) + N_\tau = (ab_1 + N_\tau) + (ab_2 + N_\tau) = \\ &= \varphi(a)(b_1 + N_\tau) + \varphi(a)(b_2 + N_\tau), \end{aligned}$$

и

$$\varphi(a)(\lambda(b + N_\tau)) = \varphi(a)(\lambda b + N_\tau) = a(\lambda b) + N_\tau = \lambda ab + N_\tau = \lambda \varphi(a)(b + N_\tau).$$

Далее, по определению скалярного произведения на A/N_τ имеем:

$$\|\varphi(a)(b + N_\tau)\|^2 = \|ab + N_\tau\|^2 = \tau((ab)^*(ab)) = \tau(b^*a^*ab) \leq \|a^*a\|\tau(b^*b) = \|a\|^2\|b + N_\tau\|^2$$

где неравенство следует из утверждения 4.56, откуда $\|\varphi(a)\| \leq \|a\|$, что и требовалось. \square

Оператор $\varphi(a)$ единственным образом продолжается до непрерывного оператора $\varphi_\tau(a)$ на пополнении H_τ , в результате получаем отображение $\varphi_\tau: A \rightarrow \mathcal{B}(H_\tau)$, $\varphi_\tau: a \mapsto \varphi_\tau(a)$.

Лемма 4.71. *Отображение $\varphi_\tau: A \rightarrow \mathcal{B}(H_\tau)$, $\varphi_\tau: a \mapsto \varphi_\tau(a)$, является $*$ -гомоморфизмом алгебр, то есть пара (H_τ, φ_τ) — это некоторое представление алгебры A .*

Доказательство. Действительно,

$$\begin{aligned} \varphi_\tau(\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2)(b + N_\tau) &= (\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2)b + N_\tau = \lambda_1(a_1 b + N_\tau) + \lambda_2(a_2 b + N_\tau) = \\ &= \lambda_1 \varphi_\tau(a_1)(b + N_\tau) + \lambda_2 \varphi_\tau(a_2)(b + N_\tau), \end{aligned}$$

и

$$\varphi_\tau(a_1) \circ \varphi_\tau(a_2)(b + N_\tau) = \varphi_\tau(a_1)(a_2 b + N_\tau) = a_1 a_2 b + N_\tau = \varphi_\tau(a_1 a_2)(b + N_\tau),$$

поэтому φ_τ — гомоморфизм алгебр. Остается проверить, что $\varphi_\tau(a^*) = (\varphi_\tau(a))^*$. Для любых $b_1, b_2 \in A$ имеем:

$$\begin{aligned} \langle \varphi_\tau(a^*)(b_1 + N_\tau), b_2 + N_\tau \rangle &= \langle a^* b_1 + N_\tau, b_2 + N_\tau \rangle = \tau(b_2^*(a^* b_1)) = \tau((a b_2)^* b_1) = \\ &= \langle b_1 + N_\tau, a b_2 + N_\tau \rangle = \langle b_1 + N_\tau, \varphi_\tau(a)(b_2 + N_\tau) \rangle = \langle (\varphi_\tau(a))^*(b_1 + N_\tau), b_2 + N_\tau \rangle, \end{aligned}$$

поэтому $\varphi_\tau(a^*) = (\varphi_\tau(a))^*$, что и требовалось. \square

Представление (H_τ, φ_τ) называется *представлением Гельфанда–Наймарка–Сигала* или *ГНС-представлением*, ассоциированным с τ . Прямая сумма представлений (H_τ, φ_τ) по всем состояниям $\tau \in \mathcal{S}(A)$ алгебры A называется *универсальным представлением алгебры A* .

Теорема 4.72 (Гельфанд–Наймарк). *Всякая C^* -алгебра A допускает точное представление. В частности, ее универсальное представление является точным.*

Доказательство. Обозначим универсальное представление алгебры A через (H, φ) , и пусть $\varphi(a) = 0$ для некоторого элемента $a \in A$. По теореме 4.55 для нормального элемента $a^* a$ существует состояние $\tau \in \mathcal{S}(A)$, такое, что $\tau(a^* a) = \|a^* a\|$. По теореме 4.18 элемент $a^* a$ положителен, поэтому определен положительный элемент $b = (a^* a)^{1/4}$. Тогда $\|a\|^2 = \|a^* a\| = \tau(a^* a) = \tau(b^4)$, а с другой стороны,

$$\|\varphi_\tau(b)(b + N_\tau)\|^2 = \langle \varphi_\tau(b)(b + N_\tau), \varphi_\tau(b)(b + N_\tau) \rangle = \langle b^2 + N_\tau, b^2 + N_\tau \rangle = \tau((b^2)^* b^2) = \tau(b^4),$$

поэтому $\|a\|^2 = \|\varphi_\tau(b)(b + N_\tau)\|^2$. Наконец, $\varphi_\tau(b^4) = \varphi_\tau(a^* a) = \varphi_\tau(a^*) \varphi_\tau(a) = 0$ для любого $\tau \in \mathcal{S}(A)$, поэтому $\varphi_\tau(b^4) = (\varphi_\tau(b))^4 = 0$. Но элемент b — эрмитов, поэтому $\varphi_\tau(b)$ — тоже эрмитов, и, значит, $\varphi_\tau(b) = 0$ по следствию 3.27. Итак, $\|a\| = 0$, поэтому $a = 0$, откуда φ — инъективно, что и требовалось. \square

В качестве примера использования ГНС-конструкции опишем конструкцию, превращающую матричную алгебру над C^* -алгеброй в C^* -алгебру. Пусть A — некоторая алгебра, и $M_n(A)$ — алгебра всех $(n \times n)$ -матриц с элементами из A . Стандартным образом определенные операции над матрицами превращают $M_n(A)$ в алгебру, а если исходная алгебра A является $*$ -алгеброй, то операция $*$: $(a_{ij}) \mapsto (a_{ji}^*)$ является, очевидно, инволюцией и превращает алгебру $M_n(A)$ в $*$ -алгебру.

Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ — некоторый $*$ -гомоморфизм между $*$ -алгебрами A и B . Несложно проверить, что отображение $M_n(A) \rightarrow M_n(B)$, заданное так: $(a_{ij}) \mapsto (\varphi(a_{ij}))$ также является $*$ -гомоморфизмом матричных алгебр. Будем обозначать это отображение той же буквой φ и называть *раздутием* исходного гомоморфизма.

Задача 4.73. Проверьте, что раздутие $*$ -гомоморфизма является $*$ -гомоморфизмом матричных алгебр. Докажите, что если исходный гомоморфизм инъективен, то его раздутие — тоже.

Пусть H — гильбертово пространство. Через $H^{(n)}$ обозначим прямую ортогональную сумму n экземпляров H . Определим отображение $\varphi: M_n(\mathcal{B}(H)) \rightarrow \mathcal{B}(H^{(n)})$ так: для каждого $u = (u_{ij}) \in M_n(\mathcal{B}(H))$ и $x = (x^1, \dots, x^n) \in H^{(n)}$ положим

$$\varphi(u)(x) = u \cdot x = \left(\sum_{j=1}^n u_{1j} x^j, \dots, \sum_{j=1}^n u_{nj} x^j \right),$$

где точка обозначает матричное умножение.

Лемма 4.74. В сделанных обозначениях, отображение $\varphi: M_n(\mathcal{B}(H)) \rightarrow \mathcal{B}(H^{(n)})$ задает $*$ -изоморфизм.

Доказательство. Линейность отображения φ очевидна из формулы $\varphi(u) = u \cdot x$ и правила умножения матриц. Далее, $\varphi(u_1 \cdot u_2)(x) = (u_1 \cdot u_2) \cdot x = u_1 \cdot (u_2 \cdot x) = \varphi(u_1)(\varphi(u_2)(x))$, поэтому $\varphi(u_1 \cdot u_2) = \varphi(u_1) \circ \varphi(u_2)$. Наконец, для любых $x, y \in H^{(n)}$ имеем:

$$\begin{aligned} \langle \varphi(u^*)(x), y \rangle &= \langle u^* \cdot x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \left\langle \sum_{j=1}^n u_{ji}^* x^j, y^i \right\rangle = \sum_{i,j=1}^n \langle u_{ji}^* x^j, y^i \rangle = \sum_{i,j=1}^n \langle x^j, u_{ji} y^i \rangle = \\ &= \sum_{i=1}^n \left\langle x^j, \sum_{j=1}^n u_{ji} y^i \right\rangle = \langle x, \varphi(u)(y) \rangle = \langle \varphi(u)^*(x), y \rangle, \end{aligned}$$

откуда $\varphi(u^*) = (\varphi(u))^*$, что и требовалось. \square

Будем называть **матрицей оператора** $v \in \mathcal{B}(H^{(n)})$ такую матрицу $u \in M_n(\mathcal{B}(H))$, что $\varphi(u) = v$. По лемме 4.74 эта матрица однозначно определена.

Определим норму на алгебре $M_n(\mathcal{B}(H))$, положив $\|u\| = \|\varphi(u)\| = \sup_x \|\varphi(u)(x)\|$, где супремум берется по всем $x \in H^{(n)}$, $\|x\| \leq 1$.

Нам будут полезны следующие оценки.

Задача 4.75. Докажите, что для нормы $\|u\| = \|\varphi(u)\|$ на алгебре $M_n(\mathcal{B}(H))$ имеют место следующие неравенства:

$$\|u_{ij}\| \leq \|u\| \leq \sum_{p,q=1}^n \|u_{pq}\|.$$

Лемма 4.76. Норма $\|u\| = \|\varphi(u)\|$ превращает алгебру $M_n(\mathcal{B}(H))$ в C^* -алгебру.

Доказательство. Действительно,

$$\|u^* \cdot u\| = \|\varphi(u^* \cdot u)\| = \|\varphi(u^*) \circ \varphi(u)\| = \|\varphi(u)^* \circ \varphi(u)\| = \|\varphi(u)\|^2 = \|u\|^2,$$

где первое и последнее равенства — определение нормы на $M_n(\mathcal{B}(H))$, второе и третье выполнены, так как φ — $*$ -гомоморфизм, а четвертое — так как $\mathcal{B}(H^{(n)})$ является C^* -алгеброй. Полноту можно проверить с помощью оценок из задачи 4.75. Лемма доказана. \square

Теорема 4.77. Для всякой C^* -алгебры A на соответствующей матричной алгебре $M_n(A)$ существует единственная норма, превращающая ее в C^* -алгебру.

Доказательство. Рассмотрим универсальное представление (H, φ) алгебры A , которое существует по теореме Гельфанда–Наймарка. Напомним, что это инъективный $*$ -гомоморфизм $\varphi: A \rightarrow \mathcal{B}(H)$, тогда его раздутье $\varphi: M_n(A) \rightarrow M_n(\mathcal{B}(H))$ — также инъективный $*$ -гомоморфизм (см. задачу 4.73). Для произвольного $a \in A$ положим $\|a\| = \|\varphi(a)\|$, где слева стоит определенная выше норма, превращающая $M_n(\mathcal{B}(H))$ в C^* -алгебру в соответствии с леммой 4.76. Единственность следует из следствия 3.28. \square

Замечание 4.78. Согласно G.J. Murphy, использование ГНС-конструкции — единственный способ доказать теорему 4.77

Другое приложение — «естественное» доказательство следующей важной теоремы.

Теорема 4.79. Пусть $a \in A_{sa}$ — некоторый самосопряженный элемент C^* -алгебры A . Тогда a положителен в том и только том случае, когда $\tau(a) \geq 0$ для всех положительных линейных функционалов τ на A .

Доказательство. Если a — положителен, то $\tau(a) \in \mathbb{R}^+$ по определению положительного функционала. Обратно, пусть $\tau(a) \geq 0$ для всех положительных τ . Рассмотрим универсальное представление (H, φ) алгебры A . Фиксируем произвольный $x \in H$. Определим на A следующий линейный функционал: $\psi_x: b \mapsto \langle \varphi(b)(x), x \rangle$.

Лемма 4.80. Функционал $\psi_x: A \rightarrow \mathbb{C}$, $\psi_x: b \mapsto \langle \varphi(b)(x), x \rangle$ положителен для каждого $x \in H$.

Доказательство. Действительно, если $b \in A^+$, то оператор $\varphi(b) \in \mathcal{B}(H)^+$, поскольку φ — это *-изоморфизм. Тогда определен самосопряженный положительный оператор $\beta = (\varphi(b))^{1/2} \in \mathcal{B}(H)^+$, причем $\beta \circ \beta = \varphi(b)$ и

$$\langle \varphi(b)(x), x \rangle = \langle \beta(\beta(x)), x \rangle = \langle \beta(x), \beta(x) \rangle \geq 0,$$

что и требовалось. □

Итак, каждый функционал ψ_x положителен, поэтому, по предположению, $\psi_x(a) = \langle \varphi(a)(x), x \rangle \geq 0$, причем последнее неравенство выполнено для любого x . Кроме того, так как a самосопряжен по условию, а φ — это *-изоморфизм, то $\varphi(a)$ тоже самосопряжен, поэтому $\varphi(a)$ — положительный оператор, то есть, $\varphi(a) \in \varphi(A)^+$, откуда $a \in A^+$, так как φ является *-изоморфизмом. □

Тема 5

Частичный порядок с единицей на векторных пространствах

План. Упорядоченные вещественные векторные пространства. Конус положительных элементов. Порядковая единица и архимедова порядковая единица. Положительные вещественные функционалы. Состояния. Порядковая полунорма. Упорядоченные *-пространства, положительные функционалы, состояния и порядковые полунормы на них. Минимальная и максимальная порядковые полунормы.

Этот раздел лекций основан на [13].

5.1 Вещественные векторные пространства с порядком

В этом разделе *все рассматриваемые векторные пространства будут вещественными*.

Пусть V — (вещественное) векторное пространство. Тогда **конусом** в V назовем каждое непустое $C \subset V$, удовлетворяющее следующим свойствам:

- (1) для каждого $a \in [0, \infty)$ и $v \in C$ выполняется $av \in C$;
- (2) для любых $v, w \in C$ имеем $v + w \in C$.

Заметим, что каждый конус содержит нулевой вектор 0 , так как $0 = 0v$ для любого $v \in C$.

Пример 5.1. Тривиальным примером конуса может служить подпространство $C = \{0\}$.

Пусть в векторном пространстве V фиксирован некоторый конус $V^+ \subset V$, такой, что $V^+ \cap (-V^+) = \{0\}$. Тогда конус V^+ порождает на V естественный частичный порядок: $v \leq w$, если и только если $w - v \in V^+$. Векторное пространство V вместе с таким фиксированным конусом называется **упорядоченным векторным пространством**.

Пример 5.2. В качестве V^+ можно взять тривиальный конус $\{0\}$. Тогда соответствующий частичный порядок также будет тривиальным: в нем никакие два различных элемента несравнимы.

Предложение 5.3. *Определенный выше частичный порядок инвариантен относительно сдвигов и умножения на неотрицательные числа. Кроме того, $0 \in V^+$, поэтому $v \in V^+$ тогда и только тогда, когда $v \geq 0$.*

Доказательство. Если $v \leq w$, то для каждого $x \in V$ и $a \in [0, \infty)$ имеем $(w+x) - (v+x) = w - v \in V^+$, так что $v+x \leq w+x$, и $aw - av = a(w - v) \in V^+$ откуда $av \leq aw$. Далее, 0 принадлежит любому конусу, в частности, конусу V^+ . Наконец, если $v = v - 0 \in V^+$, то $v \geq 0$. Обратно, если $v \geq 0$, то $v = v - 0 \in V^+$. \square

Предложение 5.3 дает мотивацию называть V^+ **конусом положительных элементов** или, короче, **положительным конусом**, что мы и будем делать.

Предложение 5.4. *Пусть на векторном пространстве V задан частичный порядок, инвариантный относительно сдвигов и умножения на неотрицательные числа. Тогда множество $V^+ = \{v \in V : v \geq 0\}$ является конусом в V , для которого $V^+ \cap (-V^+) = \{0\}$, так что V с таким V^+ — упорядоченное векторное пространство, причем отношение порядка, порожденное на нем конусом V^+ , совпадает с исходным.*

Доказательство. Пусть $a \in [0, \infty)$ и $v \in V^+$, тогда $av \in V^+$ по условию, так что первое свойство из определения конусов выполнено. Далее, пусть $v, w \in V^+$. Тогда из $v \geq 0$ и инвариантности относительно сдвигов следует, что $v + w \geq w \geq 0$, откуда $v + w \in V^+$, что доказывает и второе свойство. Итак, V^+ — конус. Покажем теперь, что $V^+ \cap (-V^+) = \{0\}$. Пусть это не так, т.е. существует ненулевой $v \in V^+ \cap (-V^+)$. Последнее означает, что $v \geq 0$ и $-v \geq 0$. Так как порядок инвариантен относительно сдвигов, из второго неравенства заключаем, что $0 \geq v$. В силу антисимметричности частичного порядка, заключаем, что $v = 0$. Наконец, $v \leq w$ в исходном порядке тогда и только тогда, когда $0 = v - v \leq w - v$, то есть $w - v \in V^+$, то есть $v \leq w$ в упорядоченном векторном пространстве V с конусом V^+ . \square

Итак, мы показали эквивалентность определения упорядоченного метрического пространства с помощью конуса положительных элементов и в терминах свойств инвариантности частичного порядка относительно сдвигов и растяжений.

Следствие 5.5. Пусть V — упорядоченное векторное пространство. Тогда для любых $v, v', w, w' \in V$ и $a \leq 0$ таких, что $v \leq w$ и $v' \leq w'$, имеем $v + v' \leq w + w'$ и $aw \leq av$, в частности, $-w \leq -v$.

Доказательство. Так как $w - v \geq 0$ и $w' - v' \geq 0$, то $(w + w') - (v + v') = (w - v) + (w' - v') \geq 0$, что доказывает первое неравенство. Для доказательства второго достаточно заметить, что $(-v) - (-w) = w - v \geq 0$ и воспользоваться инвариантностью порядка относительно умножения на неотрицательные числа. \square

Элемент $e \in V$ упорядоченного векторного пространства называется **порядковой единицей**, если для каждого $v \in V$ существует число $r > 0$, для которого $v \leq re$.

Пусть (V, V^+) — упорядоченное векторное пространство. Конус V^+ называется **полным**, если $V = V^+ - V^+$ (здесь имеется ввиду прямая сумма).

Лемма 5.6. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей $e \in V$. Тогда

- (1) $e \in V^+$;
- (2) если $v \in V$, $a \in \mathbb{R}$ и $r > 0$ таковы, что $v \leq re$, то для всех $s \geq r$ выполняется $v \leq se$;
- (3) для любых $v_1, \dots, v_n \in V$ существует $r > 0$, для которого $v_i \leq re$ при всех i ;
- (4) конус V^+ — полный;
- (5) если $v_1, \dots, v_n \in V^+$ таковы, что $v_1 + \dots + v_n = 0$, то $v_1 = \dots = v_n = 0$;
- (6) если $v_1, \dots, v_n \in V^+$ и $a_1, \dots, a_n \in [0, \infty)$ таковы, что $a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = 0$, то для каждого i или $a_i = 0$, или $v_i = 0$.

Доказательство. (1) Существует $r > 0$, для которого $re \geq -e$. Инвариантность относительно сдвигов дает $(r + 1)e = re + e \geq 0$, и так как $r + 1 > 0$, то $e = (r + 1)^{-1}(r + 1)e \geq 0$, что и требовалось.

(2) Так как $e \geq 0$ по пункту (1) и $s - r \geq 0$, то $(s - r)e \geq 0$, поэтому, в силу следствия 5.5, имеем $se = (s - r)e + re \geq 0 + v = v$, что и требовалось.

(3) Для каждого i найдем $r_i > 0$ такое, что $v_i \leq r_i e$, и положим $r = \max\{r_1, \dots, r_n\}$. Остается применить пункт (2).

(4) Выберем произвольное $v \in V$. Мы должны показать, что $v = u - w$ для некоторых $u, w \in V^+$. По пункту (3), существует $r > 0$, для которого $v \leq re$ и $-v \leq re$, откуда $re - v \geq 0$ и $re + v \geq 0$. Положим $u = (re + v)/2$ и $w = (re - v)/2$, получаем требуемое представление для v .

(5) Докажем индукцией по n . Для $n = 1$ утверждение тривиально. Пусть для $n - 1$ утверждение доказано. Так как $v_n = -v_1 - \dots - v_{n-1} \in V^+ \cap (-V^+) = \{0\}$, откуда $v_n = 0$. Но тогда, по индукции, $v_1 = \dots = v_{n-1} = 0$.

(6) Мгновенно следует из пункта (5). \square

Замечание 5.7. Отметим, что для пространства $V = \{0\}$ элемент 0 является порядковой единицей. Если же $V \neq \{0\}$, но $V^+ = \{0\}$, то порядковая единица e , если есть, должна, в силу леммы 5.6, равняться 0, но тогда вектор $re = 0$ при всех $r \in \mathbb{R}$, поэтому $v \leq re$ не может быть выполнено ни для ненулевого $v \in V$ ни при каком $r \in \mathbb{R}$, что противоречит определению порядковой единицы. Так что такое пространство порядковой единицы не содержит. Итак, если упорядоченное линейное пространство V отлично от нуля и обладает порядковой единицей e , то $V^+ \neq \{0\}$ и $e \neq 0$.

Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e . Тогда e называется **архимедовой порядковой единицей**, если для каждого $v \in V$ такого, что $re + v \geq 0$ для всех $r > 0$, выполняется $v \in V^+$ (пространство V не содержит «неположительных инфинитезимальных элементов»).

Лемма 5.8. Пусть V — упорядоченное пространство с архимедовой порядковой единицей e . Предположим, что для некоторых $v \in V$, $r_0 \geq 0$ и всех $r > r_0$ выполняется $re + v \geq 0$. Тогда $r_0e + v \geq 0$.

Доказательство. Так как $re + v \geq 0$ для всех $r > r_0$, то $(s+r_0)e + v \geq 0$ при всех $s > 0$, откуда $se + (r_0e + v) \geq 0$ при всех $s > 0$. Так как порядковая единица — архимедова, то $r_0e + v \geq 0$, что и требовалось. \square

5.1.1 Положительные \mathbb{R} -линейные функционалы и состояния

Пусть V — упорядоченное векторное пространство и $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный функционал. Тогда f называется **положительным функционалом**, если $f(V^+) \subset [0, \infty)$.

Предложение 5.9. Пусть (V, V^+) — упорядоченное векторное пространство. Линейный функционал f на V положителен, если и только если он сохраняет порядок.

Доказательство. Действительно, пусть f положителен, и $v, w \in V$ таковы, что $v \leq w$, т.е. $w - v \in V^+$. Тогда $f(w - v) \geq 0$ по условию, откуда $f(w) \geq f(v)$, то есть f сохраняет порядок. Обратно, пусть f сохраняет порядок. Заметим, что для каждого элемента $u \in V^+$ выполнено $u \geq 0$, где 0 — нулевой вектор. Поэтому, так как f сохраняет порядок, то $f(u) \geq f(0) = 0$, то есть f — положителен. \square

Говорят, что $S \subset V$ **мажорирует** V^+ , если для каждого $v \in V^+$ существует $w \in S$ такой, что $v \leq w$.

Предложение 5.10. Пусть (V, V^+) — упорядоченное векторное пространство.

- (1) Если $S \subset V$ мажорирует V^+ , и $T \supset S$, то T также мажорирует V^+ .
- (2) Если $e \in V$ — порядковая единица, а E — подпространство в V , содержащее e , то E мажорирует V^+ .

Доказательство. Первое утверждение очевидно. Докажем второе. Действительно, так как e — порядковая единица, то для любого $v \in V$ найдется $r > 0$, для которого $re \geq v$. Но $re \in E$, поэтому E , что и требовалось. \square

Пусть (V, V^+) — упорядоченное векторное пространство с полным положительным конусом, $E \subset V^+$ мажорирует V^+ . Для каждого $h \in V$ положим

$$L_h = \{z \in E : z \leq h\}, \quad \text{и} \quad U_h = \{z \in E : h \leq z\}.$$

Лемма 5.11. В сделанных обозначениях, множества L_h и U_h непусты для любого $h \in V$.

Доказательство. Так как V^+ — полный конус, то каждое $h \in V$ представимо в виде $w - v$, где $v, w \in V^+$. Но тогда $-v \leq w - v \leq w$, так как $0 \leq w \leq w + v$, а порядок инвариантен относительно сдвигов. Так как E мажорирует V^+ , то существуют $\alpha, \beta \in E$ такие, что $\alpha \geq v$ и $\beta \geq w$. Но тогда, в силу леммы 5.5, $-\alpha \leq -v \leq w - v = h$, так что $-\alpha \in L_h$, и $\beta \geq w \geq w - v = h$, то есть $\beta \in U_h$, что и требовалось. \square

Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ — положительный линейный функционал. Положим

$$\ell_f(h) = \sup\{f(z) : z \in L_h\}, \quad \text{и} \quad u_f(h) = \inf\{f(z) : z \in U_h\}.$$

Так как для каждых $z \in L_h$ и $w \in U_h$ выполняется $z \leq w$, а f сохраняет порядок, то $\ell_f(h) \leq u_f(h)$. Ясно также, что если $h \in E$, то $h \in L_h \cap U_h$ и, так как f сохраняет порядок, $\ell_f(h) = f(h) = u_f(h)$.

Лемма 5.12. Пусть (V, V^+) — упорядоченное векторное пространство с полным положительным конусом, линейное подпространство $E \subset V^+$ мажорирует V^+ , вектор $h \in V$ не содержится в E , и $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ — положительный линейный функционал. Рассмотрим линейное подпространство $W = \{ah + v : a \in \mathbb{R}, v \in E\}$, натянутое на E и h , и пусть $\gamma \in \mathbb{R}$ таково, что $\ell_f(h) \leq \gamma \leq u_f(h)$, а $f_\gamma: W \rightarrow \mathbb{R}$ определяется так: $f_\gamma(ah + v) = a\gamma + f(v)$. Тогда f_γ — положительный линейный функционал такой, что $f_\gamma|_E = f$. Более того, если $g: W \rightarrow \mathbb{R}$ — положительный линейный функционал, для которого $g|_E = f$, то $\ell_f(h) \leq g(h) \leq u_f(h)$ и $g = f_\gamma$ для $\gamma = g(h)$.

Доказательство. Линейность $f_\gamma(ah + v) = af(h) + f(v) = a\gamma + f(v)$ и то, что f_γ продолжает f , очевидны. Покажем, что f_γ положительный. Для этого выберем произвольный положительный $ah + v \in W$ и покажем, что $f(ah + v) \geq 0$. Рассмотрим три случая.

(1) Пусть $a = 0$, тогда $ah + v = v \geq 0$ и $f(ah + v) = f(v) \geq 0$, так как $v \in E$ и f — положительный линейный функционал на E .

(2) Пусть $a > 0$. Так как $ah + v \geq 0$, то $h \geq (-1/a)v$, откуда $(-1/a)v \in L_h$. Но тогда $(-1/a)f(v) = f((-1/a)v) \leq \ell_f(h) \leq \gamma$, откуда $0 \leq f(v) + a\gamma = f_\gamma(ah + v)$.

(3) Пусть $a < 0$, тогда $-a > 0$ и условие $ah + v \geq 0$ влечет $(-1/a)v \geq h$, откуда $(-1/a)v \in U_h$. Но тогда $\gamma \leq u_f(h) \leq f((-1/a)v) = (-1/a)f(v)$, так что $0 \leq f(v) + a\gamma = f_\gamma(ah + v)$.

Итак, мы доказали, что f_γ положителен.

Пусть теперь $g: W \rightarrow \mathbb{R}$ — положительный линейный функционал, $g|_E = f$. Выберем произвольные $z \in L_h$ и $w \in U_h$, тогда $z \leq h \leq w$. В силу предложения 5.9 и условия $g|_E = f$, имеем $f(z) = g(z) \leq g(h) \leq g(w) = f(w)$. Применяя к полученным неравенствам супремум по $z \in L_h$ и инфимум по $w \in U_h$, получаем $\ell_f(h) \leq g(h) \leq u_f(h)$.

Положим теперь $\gamma = g(h)$, тогда

$$g(ah + v) = ag(h) + g(v) = a\gamma + f(v) = f_\gamma(ah + v),$$

откуда $g = f_\gamma$. Лемма доказана. \square

Из леммы 5.6 и предложения 5.10 вытекает следующий важный частный случай леммы 5.12. Пусть (V, V^+) — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e , $E = \{re : r \in \mathbb{R}\}$, $v \in V \setminus E$. Тогда, в обозначениях леммы 5.12, $L_v = \{re : re \leq v\}$, и $U_v = \{re : re \geq v\}$. Рассмотрим положительный линейный функционал $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, определенный так: $f(re) = r$. Положим

$$\alpha = \sup\{r \in \mathbb{R} : re \leq v\}, \quad \text{и} \quad \beta = \inf\{r \in \mathbb{R} : v \leq re\},$$

тогда $\alpha = \ell_f(v)$, $\beta = u_f(v)$, и $\alpha \leq \beta$, в частности, α и β конечны. Рассмотрим линейное подпространство $W = \{av + re : a, r \in \mathbb{R}\}$, натянутое на v и e , выберем произвольное $\gamma \in [\alpha, \beta]$, и определим $f_\gamma: W \rightarrow \mathbb{R}$, положив $f_\gamma(av + re) = a\gamma + rf(e)$.

Следствие 5.13. В сделанных обозначениях, f_γ — положительный линейный функционал, такой, что $f_\gamma|_E = f$. Более того, если $g: W \rightarrow \mathbb{R}$ — положительный линейный функционал, для которого $g|_E = f$, то $g(v) \in [\alpha, \beta]$ и $g = f_\gamma$ для $\gamma = g(v)$.

Имеет место следующий аналог теоремы Хана–Банаха.

Теорема 5.14. Пусть (V, V^+) — упорядоченное векторное пространство с полным положительным конусом, линейное подпространство $E \subset V^+$ мажорирует V^+ , и $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ — положительный линейный функционал. Тогда существует положительный линейный функционал $\tilde{f}: V \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что $\tilde{f}|_E = f$.

Доказательство. Рассмотрим семейство \mathcal{C} всех пар (E', f') , где $E' \subset V$ — линейное подпространство, мажорирующее V^+ , а $f': E' \rightarrow \mathbb{R}$ — положительный линейный функционал, продолжающий f , и введем на нем частичный порядок: $(E_1, f_1) \leq (E_2, f_2)$, если и только если $E_1 \subset E_2$ и $f_2|_{E_1} = f_1$. Нетрудно проверить, что к этому семейству применима лемма Цорна¹ поэтому в нем существует максимальный элемент (\tilde{E}, \tilde{f}) . Остается показать, что $\tilde{E} = V$.

Пусть $\tilde{E} \neq V$. Тогда, так как конус V^+ полон, найдется $p \in V^+ \setminus \tilde{E}$. Обозначим через W линейную оболочку $\{p\} \cup \tilde{E}$. Тогда $\tilde{E} \subset W$ — собственное подпространство. Далее, $E \subset \tilde{E}$, поэтому \tilde{E} мажорирует V^+ . Применим лемму 5.12 и продолжим \tilde{f} до положительного функционала f_W на W . Но тогда $(W, f_W) \in \mathcal{C}$ причем (W, f_W) строго больше максимального элемента (\tilde{E}, \tilde{f}) . Из полученного противоречия следует, что $\tilde{E} = V$. Теорема доказана. \square

Следствие 5.15. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e , линейное подпространство $E \subset V^+$ содержит e , и $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ — положительный линейный функционал. Тогда существует положительный линейный функционал $\tilde{f}: V \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что $\tilde{f}|_E = f$.

Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e . Положительный линейный функционал $f: V \rightarrow \mathbb{R}$, для которого $f(e) = 1$, называется **состоянием**, а множество всех состояний — **пространством состояний**.

¹В качестве верхней грани цепи $\{(E_\lambda, g_\lambda)\}$ можно взять $(\cup_\lambda E_\lambda, g)$, где $g(x) = f_\lambda(x)$ для $x \in E_\lambda$.

Замечание 5.16. Напомним, что для C^* -алгебры под состоянием мы понимали положительный линейный функционал единичной нормы. Далее мы показали, что для унитарной C^* -алгебры это определение равносильно следующему: состоянием называется положительный линейный функционал τ , для которого $\tau(1) = 1$, где 1 в левой части равенства — это единица унитарной алгебры. Отметим, что такое определение стало возможным в связи с леммой 4.52. Упорядоченные векторные пространства с порядковой единицей являются обобщением унитарных алгебр, поэтому для них данное нами определение естественно. С другой стороны, мы еще не определили норму на таких пространствах, так что это — еще одна мотивация эквивалентной переформулировки определения состояния.

Предложение 5.17. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e . Тогда пространство состояний непусто.

Доказательство. Действительно, пусть $E = \{re : r \in \mathbb{R}\}$ — одномерное пространство, натянутое на e . Тогда $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $f(re) = r$, — положительный линейный функционал, для которого $f(e) = 1$. По теореме 5.14, этот функционал продолжается до положительного функционала $\tilde{f}: V \rightarrow \mathbb{R}$, для которого $\tilde{f}(e) = f(e) = 1$, т.е. \tilde{f} — состояние. \square

Теорема 5.18. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e . Выберем произвольный $v \in V$ и положим

$$\alpha = \sup\{r \in \mathbb{R} : re \leq v\}, \quad \beta = \inf\{r \in \mathbb{R} : v \leq re\}.$$

Тогда $\alpha \leq \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, и для каждого $\gamma \in [\alpha, \beta]$ существует состояние $f_\gamma: V \rightarrow \mathbb{R}$, для которого $f_\gamma(v) = \gamma$.

Доказательство. Пусть $E = \{re : r \in \mathbb{R}\}$. Определим $g: E \rightarrow \mathbb{R}$, положив $g(re) = r$, тогда g — положительный линейный функционал и $g(e) = 1$.

Пусть сначала $v \in E$, т.е. $v = re$, тогда $\alpha = \beta = r = \gamma$. В силу следствия 5.15, функционал g продолжается до положительного линейного функционала $\tilde{g}: V \rightarrow \mathbb{R}$, откуда $\tilde{g}(e) = 1$, так что \tilde{g} — состояние, и $\tilde{g}(v) = \tilde{g}(re) = r = \gamma$, поэтому \tilde{g} можно взять в качестве f_γ .

Пусть теперь $v \notin E$. Рассмотрим $W = \{av + re : a, r \in \mathbb{R}\}$, тогда, по следствию 5.13, определен положительный линейный функционал $g_\gamma: W \rightarrow \mathbb{R}$, $g_\gamma(av + re) = a\gamma + r$, продолжающий g . По определению, $g(e) = a\gamma + r$. Снова воспользуемся следствием 5.15 и продолжим g_γ до положительного линейного функционала $\tilde{g}: V \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $\tilde{g}(1) = g_\gamma(e) = g(e) = 1$, так что \tilde{g} — состояние, и $\tilde{g}(v) = g_\gamma(v) = \gamma$, поэтому \tilde{g} может быть взято в качестве искомого f_γ . \square

Из теоремы 5.18 легко получается следующий результат.

Следствие 5.19. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e . Выберем произвольный $v \in V$ и положим

$$\alpha = \sup\{r \in \mathbb{R} : re \leq v\}, \quad \beta = \inf\{r \in \mathbb{R} : v \leq re\}.$$

Тогда $[\alpha, \beta] = \{f(v) : f \text{ — состояние на } V\}$.

Доказательство. По теореме 5.18, $[\alpha, \beta] \subset \{f(v) : f \text{ — состояние на } V\}$. Докажем обратное включение.

Пусть $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ — произвольное состояние. Если $v = re$, то $\alpha = \beta = r = \gamma$ и $f(v) = f(re) = r = \gamma$.

Пусть теперь $v \neq re$ ни для какого $r \in \mathbb{R}$. Тогда ограничение f на $E = \{re : r \in \mathbb{R}\}$ и на $W := \{av + re : a, r \in \mathbb{R}\}$ — положительные линейные функционалы такие, что ограничение $f|_W$ на E совпадает с $f|_E$. Эта ситуация описывается в следствии 5.13, в силу которого $f(v) \in [a, b]$, откуда и вытекает обратное включение. \square

Предложение 5.20. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с архимедовой порядковой единицей e . Тогда если для $v \in V$ и всех состояний $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ выполняется $f(v) = 0$, то $v = 0$.

Доказательство. Так как $\{f(v) : f \text{ — состояние на } V\} = \{0\}$, то, в обозначениях следствия 5.19, имеем $\alpha = \beta = 0$. Так как $\alpha = 0$, то $re \leq v$ имеет место для всех $r < 0$. Положив $s = -r$ заключаем, что $v + se \geq 0$ при всех $s > 0$. Так как e — архимедова единица, заключаем, что последнее неравенство верно и при $s = 0$, то есть $v \in V^+$. С другой стороны, $\beta = 0$ влечет, что $v \leq re$ при всех $r > 0$, так что $-v + re \geq 0$ при всех $r > 0$, и архимедовость e дает $-v \in V^+$. Так как $V^+ \cap (-V^+) = \{0\}$, заключаем, что $v = 0$. \square

Предложение 5.21. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с архимедовой порядковой единицей e . Тогда если для $v \in V$ выполняется $f(v) \geq 0$ для всех состояний $f: V \rightarrow \mathbb{R}$, то $v \in V^+$.

Доказательство. В обозначениях следствия 5.19, имеем $\alpha \geq 0$, так что $v \geq re$ для всех $r \leq \alpha$, в частности, для всех $r < 0$. Полагая $s = -r$, заключаем, что $v + se \geq 0$ для всех $s > 0$, откуда, в силу архимедовости порядковой единицы, получаем $v \in V^+$. \square

5.1.2 Порядковая полунорма

Зададим естественную полунорму на упорядоченном векторном пространстве с единицей и покажем, что если единица архимедова, то эта полунорма является нормой.

Предложение 5.22. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e . Тогда для каждого $v \in V$ множество $\{r \in \mathbb{R} : -re \leq v \leq re\}$ непусто. Если $V \neq \{0\}$, то множество $\{r \in \mathbb{R} : -re \leq v \leq re\}$ содержится в $\mathbb{R}_+ = \{r \in \mathbb{R} : r \geq 0\}$.

Доказательство. По определению порядковой единицы, существует $r > 0$, для которого $v \leq re$ и существует $s > 0$, для которого $-v \leq se$, т.е. $v \geq -se$. Пусть $t = \max\{r, s\}$, тогда $re \leq te$ и $-te \leq -se$, поэтому $t \in \{r \in \mathbb{R} : -re \leq v \leq re\}$.

Из неравенства $-re \leq v$ вытекает, что $2re \geq 0$. Если $V \neq \{0\}$, то, по замечанию 5.7, $e \neq 0$, откуда, в силу леммы 5.6, $e > 0$ и, значит, $r \geq 0$. \square

Итак, пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e . Для каждого $v \in V$ положим

$$\|v\| = \inf\{r \in \mathbb{R} : -re \leq v \leq re\}.$$

Из предложения 5.22 вытекает, что $\|v\|$ — неотрицательное вещественное число.

Замечание 5.23. В сделанных обозначениях, $\|e\| = 1$.

Предложение 5.24. В терминах следствия 5.19, имеем $\|v\| = \max\{|\alpha|, |\beta|\}$.

Доказательство. Пусть $r \in \mathbb{R}$ такое, что $-re \leq v \leq re$, тогда $-r \leq \alpha \leq \beta \leq r$, следовательно, $\max\{|\alpha|, |\beta|\} \leq |r| = r$, где последнее равенство имеет место в силу предложения 5.22. Так как r произвольно, имеем $\max\{|\alpha|, |\beta|\} \leq \|v\|$. Обратно, если $t > \max\{|\alpha|, |\beta|\}$, то $-t < \alpha \leq \beta < t$, так что $-te \leq v \leq te$ и, значит, $\|v\| \leq t$, поэтому, в силу произвольности t , заключаем, что $\|v\| \leq \max\{|\alpha|, |\beta|\}$, что и завершает доказательство. \square

Предложение 5.25 (Кэдисон [18]). Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e . Тогда определенная выше функция $\|\cdot\|$ является полунормой на V , причем

$$\|v\| = \sup\{|f(v)| : f : V \rightarrow \mathbb{R} \text{ — состояние на } V\}.$$

Если при этом e — архимедова порядковая единица, то $\|\cdot\|$ — норма.

Доказательство. В силу следствия 5.19, имеем

$$\{f(v) : f : V \rightarrow \mathbb{R} \text{ — состояние на } V\} = [\alpha, \beta],$$

поэтому, применяя предложение 5.24, получаем, что

$$\sup\{|f(v)| : f : V \rightarrow \mathbb{R} \text{ — состояние на } V\} = \max\{|\alpha|, |\beta|\} = \|v\|.$$

Следовательно, для любого $t \in \mathbb{R}$ имеем

$$\|tv\| = \sup\{|f(tv)| : f : V \rightarrow \mathbb{R} \text{ — состояние на } V\} = |t| \sup\{|f(v)| : f : V \rightarrow \mathbb{R} \text{ — состояние на } V\} = |t| \|v\|,$$

что доказывает положительную однородность функции $\|\cdot\|$. Далее,

$$\|v + w\| = \sup |f(v + w)| \leq \sup (|f(v)| + |f(w)|) \leq \sup |f(v)| + \sup |f(w)| = \|v\| + \|w\|,$$

где все супремумы берутся по множеству всех состояний $f : V \rightarrow \mathbb{R}$, что доказывает полуаддитивность $\|\cdot\|$. Таким образом, мы показали, что $\|\cdot\|$ — полунорма.

Пусть теперь порядковая единица e — архимедова. Заметим, что $\|v\| = 0$, если и только если для всех состояний f выполняется $f(v) = 0$. Но тогда, в силу предложения 5.20, имеем $v = 0$, что доказывает положительную определенность $\|\cdot\|$. \square

Определенная выше функция $\|\cdot\|$ на упорядоченном векторном пространстве с порядковой единицей e называется **порядковой полунормой** или, в случае, когда $\|\cdot\|$ — норма, например для архимедовых единиц, — **порядковой нормой**. Также говорят, что эта полунорма (или норма) *задана e* .

Замечание 5.26. Если $\|\cdot\|$ является нормой, то не обязательно порядковая единица — архимедова. Действительно, пусть $V = \mathbb{R}^2$ и $V^+ = \{(x, y) : x > 0, y > 0\} \cup \{0\}$, и $e = (1, 1)$. Тогда e — порядковая единица, так как для каждого $v = (x, y) \in V$ и $r > \max\{|x|, |y|\}$ имеем $v \leq re$. Единица e не является архимедовой, так как $(1, 0) + re \in V^+$ при всех $r > 0$, но $(1, 0) \notin V^+$. Тем не менее, $\|\cdot\|$ — норма. Действительно, для $v = (x, y)$ имеем $\|v\| = \inf\{r : (-r, -r) \leq (x, y) \leq (r, r)\}$. Если x или y отличны от нуля, то $\|v\| \neq 0$, что доказывает положительную определенность $\|\cdot\|$.

Определение 5.27. *Топологией* упорядоченного векторного пространства с порядковой единицей называется метрическая топология, заданная введенной выше полунормой. Отметим, что эта топология не всегда хаусдорфова.

Замечание 5.28. Линейное отображение между пространствами с полунормами непрерывно, если и только если оно ограничено, т.е. переводит ограниченные подмножества в ограниченные.

Предложение 5.29. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e и $\|\cdot\|$ — порядковая полунорма, заданная e . Если $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ — положительный линейный функционал, то f непрерывен и $\|f\| = f(e)$. В частности, $|f(v)| \leq f(e)\|v\|$.

Доказательство. Выберем произвольные $v \in V$ и $r \in \mathbb{R}$, для которых $\|v\| < r$, тогда $-re \leq v \leq re$. По предложению 5.9, функционал f сохраняет порядок, поэтому $-rf(e) \leq f(v) \leq rf(e)$, так что $|f(v)| \leq rf(e)$. Так как $\|v\|$ — точная нижняя грань таких r , то $|f(v)| \leq f(e)\|v\|$, поэтому функционал f ограничен и, значит, непрерывен, а его норма не превосходит $f(e)$. Так как $\|e\| = 1$, то $\|f\| = \sup_{\|v\| \leq 1} |f(v)| \geq |f(e)|$, откуда $\|f\| \geq f(e)$ и, значит, $\|f\| = f(e)$. \square

Предложение 5.30. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e и $\|\cdot\|$ — порядковая полунорма, заданная e . Если $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный функционал с $\|f\| = f(e)$ (в частности, f — непрерывный), то f — положительный.

Доказательство. Выберем произвольный $v \in V^+$ и любой $r \in \mathbb{R}$ такой, что $r > \|v\|$, тогда, по определению порядковой полунормы, $0 \leq v \leq re$, откуда $0 \leq re - v \leq re$. Снова в силу определения порядковой полунормы, имеем $\|re - v\| \leq r$. Так как f непрерывен и $\|f\| = f(e)$, то

$$|f(re - v)| \leq \|f\| \|re - v\| \leq f(e)r,$$

поэтому $f(re - v) \leq rf(e)$, откуда $rf(e) - f(v) \leq rf(e)$, следовательно, $f(v) \geq 0$, так что f — положительный. \square

Собирая вместе результаты из предложений 5.29 и 5.30, получаем

Следствие 5.31. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e и $\|\cdot\|$ — порядковая полунорма, заданная e . Тогда линейный функционал $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ — положительный, если и только если $\|f\| = f(e)$.

Следствие 5.32. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e и $\|\cdot\|$ — порядковая полунорма, заданная e . Тогда линейный функционал $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ является состоянием, если и только если $\|f\| = f(e) = 1$.

Теорема 5.33. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e . Тогда порядковая полунорма, заданная e , — это единственная полунорма на V , удовлетворяющая следующим условиям:

- (1) $\|e\| = 1$;
- (2) если $-w \leq v \leq w$, то $\|v\| \leq \|w\|$;
- (3) если $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ — состояние, то $|f(v)| \leq \|v\|$.

Доказательство. Покажем, что порядковая полунорма, заданная e , удовлетворяет всем трем свойствам. Первое свойство очевидно и уже отмечалось выше. Чтобы доказать свойство (2), выберем произвольное $r > \|w\| = \|-w\|$, тогда $-re \leq w \leq re$, откуда $-re \leq -w \leq v \leq w \leq re$, откуда, по определению порядковой полунормы, $\|v\| \leq r$. В силу произвольности r имеем $\|v\| \leq \|w\|$. Свойство (3) мгновенно вытекает из предложения 5.25.

Докажем обратное утверждение. Пусть $\|\cdot\|'$ — полунорма на V , удовлетворяющая трем условиям теоремы. Пусть $v \in V$ и $r > \|v\|$, тогда $-re \leq v \leq re$ по определению $\|v\|$. Условия (1) и (2) дают

$$\|v\|' \leq \|re\|' = r\|e\|' = r,$$

откуда $\|v\|' \leq \|v\|$ в силу произвольности r . Обратно, из условия (3) вытекает

$$\sup\{|f(v)| : f \text{ — состояние на } V\} \leq \|v\|'$$

откуда, снова по предложению 5.25, имеем $\|v\| \leq \|v\|'$ и, тем самым $\|v\| = \|v\|'$. \square

Теорема 5.34. Пусть V — упорядоченное векторное пространство с порядковой единицей e и $\|\cdot\|$ — порядковая полунорма, заданная e . Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- (1) порядковая единица e — архимедова;
- (2) V^+ — замкнутое подмножество в V в топологии, индуцированной $\|\cdot\|$;
- (3) $-\|v\|e \leq v \leq \|v\|e$ для всех $v \in V$.

Доказательство. (1) \Rightarrow (2) Пусть $v \in V$ — предел некоторой последовательности элементов из V^+ . Мы должны показать, что $v \in V^+$. Из определения предела вытекает, что для каждого $r > 0$ существует $v_r \in U_r(v) \cap V^+$ такой, что $\|v - v_r\| < r$, откуда $re + v - v_r \geq 0$. Так как $v_r \geq 0$, то $re + v \geq v_r \geq 0$, и так как e — архимедова единица, а $r > 0$ — произвольно, то $v \in V^+$, что и требовалось.

(2) \Rightarrow (1) Пусть V^+ замкнуто в топологии, индуцированной $\|\cdot\|$. Рассмотрим произвольное $v \in V$, для которого $re + v \geq 0$ при всех $r > 0$. Мы должны показать, что $v \geq 0$. Так как $\|re\| = r\|e\| = r$, то для каждого $r > 0$ имеем $re + v \in U_{2r}(v) \cap V^+$ (вместо $2r$ можно написать $r + \varepsilon$ для произвольного $\varepsilon > 0$). Последнее означает, что v является пределом последовательности, лежащей в V^+ , и, в силу замкнутости V^+ , заключаем $v \in V^+$, что и требовалось.

(1) \Rightarrow (3) Выберем произвольное $v \in V$. Так как

$$\|v\| = \inf\{r : re + v \geq 0 \text{ и } re - v \geq 0\}$$

по определению нормы, то $re + v \geq 0$ и $re - v \geq 0$ для всех $r > \|v\|$. По лемме 5.8, имеем $\|v\|e + v \geq 0$ и $\|v\|e - v \geq 0$, так что $-\|v\|e \leq v \leq \|v\|e$, что и требовалось.

(3) \Rightarrow (1) Рассмотрим произвольный $v \in V$, для которого $re + v \in V^+$ при всех $r > 0$. Мы должны показать, что $v \geq 0$. Так как $\|v\|e - v \geq 0$, то $re + (\|v\|e - v) \geq 0$ при всех $r > 0$. Кроме того, так как $re + v \geq 0$ для всех $r > 0$, то $(r - \|v\|)e + v$ при всех $r - \|v\| > 0$, т.е. $re - (\|v\|e - v) \geq 0$ при всех $r > \|v\|$. Итак,

$$-re \leq (\|v\|e - v) \leq re$$

при всех $r > \|v\|$, поэтому, вспоминая определение порядковой нормы, заключаем, что $\| \|v\|e - v \| \leq \|v\|$. С другой стороны, применяя предположение настоящего пункта к вектору $\|v\|e - v$, получаем, что $\|v\|e - v \leq \| \|v\|e - v \|e$, откуда $\|v\|e - v \leq \|v\|e$ и, значит, $v \geq 0$, что и требовалось. \square

Пусть V и W — упорядоченные векторные пространства. Линейное отображение $f: V \rightarrow W$ называется **положительным**, если $f(V^+) \subset W^+$. Если V и W содержат порядковые единицы e и e' соответственно, то положительное отображение f называется **унитальным**, если $f(e) = e'$. Биективное линейное отображение $f: V \rightarrow W$ называется **изоморфизмом упорядоченных пространств**, если $v \in V^+$ равносильно $f(v) \in W^+$. Иными словами, линейный изоморфизм f является изоморфизмом упорядоченных пространств, если и только если f и f^{-1} — положительные.

5.2 Упорядоченные *-пространства

Напомним, что комплексное векторное пространство V называется ***-пространством**, если на нем задана сопряженно линейная инволюция $*$, т.е. отображение $*$: $V \rightarrow V$, для которого $v^{**} := (v^*)^* = v$ и $(\lambda v + \mu w)^* = \bar{\lambda}v^* + \bar{\mu}w^*$ для всех $v, w \in V$ и $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Напомним также, что элемент $v \in V$, для которого $v = v^*$, называется **самосопряженным** или **эрмитовым**. Множество эрмитовых элементов мы обозначали через V_{sa} .

По предложению 3.1, множество V_{sa} является вещественным линейным подпространством в V , а, по предложению 3.2, каждый $v \in V$ однозначно представим в виде $x + iy$, где $x, y \in V_{sa}$ и имеют вид $x = (v + v^*)/2$ и $y = (v - v^*)/(2i)$. Будем называть x и y **вещественной** и **мнимой** частью v и обозначать $\operatorname{Re}(v)$ и $\operatorname{Im}(v)$ соответственно. Ясно также, что $V = V_{sa} \oplus iV_{sa}$.

Пусть V — (комплексное) *-пространство, тогда V называется **упорядоченным векторным *-пространством**, если в нем фиксирован конус $V^+ \subset V_{sa}$, для которого $V^+ \cap (-V^*) = \{0\}$. Таким образом, V называется упорядоченным *-пространством тогда и только тогда, когда V_{sa} является упорядоченным вещественным линейным пространством. **Порядковая единица** и ее **архимедовость** для V — определяются как порядковая единица (архимедова порядковая единица) для V_{sa} . Далее, \mathbb{C} -линейный функционал $f: V \rightarrow \mathbb{C}$ на упорядоченном *-пространстве V называется **положительным**, если $f(V^+) \subset [0, \infty)$. Если V содержит порядковую единицу e , то \mathbb{C} -линейный функционал $f: V \rightarrow \mathbb{C}$ называется **состоянием**, если он — положительный, и $f(e) = 1$. Линейный изоморфизм $f: V \rightarrow W$ упорядоченных *-пространств называется **изоморфизмом**, если f и f^{-1} — положительны.

Предложение 5.35. Пусть V и W — упорядоченные *-пространства, V содержит порядковую единицу, а $f: V \rightarrow W$ — положительное линейное отображение. Тогда для каждого $v \in V$ имеем $f(v^*) = \overline{f(v)}$.

Доказательство. Так как V содержит порядковую единицу, то, в силу леммы 5.6, конус V^+ — полный, т.е. $V_{sa} = V^+ - V^+$. Далее, так как f — положительный функционал, то $f(V^+) \subset W^+$ и, значит, $f(V_{sa}) = f(V^+) - f(V^+) \subset W^+ - W^+ \subset W_{sa}$. Иными словами, эрмитовы элементы переходят в эрмитовы при отображении f . Так как для каждого $v \in V$ существуют $x, y \in V_{sa}$ такие, что $v = x + iy$, имеем:

$$f(v^*) = f(x^* - iy^*) = f(x - iy) = f(x) - if(y) = f(x)^* - if(y)^* = (f(x) + if(y))^* = f(x + iy)^* = f(v)^*,$$

что и требовалось. \square

Следствие 5.36. Пусть V — упорядоченное *-пространство, а $f: V \rightarrow \mathbb{C}$ — положительный линейный функционал. Тогда для каждого $v \in V$ имеем $f(v^*) = \overline{f(v)}$.

Пусть V — упорядоченное *-пространство и $f: V_{sa} \rightarrow \mathbb{R}$ — это \mathbb{R} -линейный функционал. Определим отображение $\tilde{f}: V \rightarrow \mathbb{C}$, положив $\tilde{f}(v) = f(\operatorname{Re}(v)) + if(\operatorname{Im}(v))$.

Предложение 5.37. Пусть V — упорядоченное *-пространство, и $f: V_{sa} \rightarrow \mathbb{R}$ — некоторый \mathbb{R} -линейный функционал. Тогда $\tilde{f}: V \rightarrow \mathbb{C}$ — это \mathbb{C} -линейный функционал, причем $\tilde{f}|_{V_{sa}} = f$. Более того, если f — положительный, то и \tilde{f} — положительный. Если же V содержит порядковую единицу, и f — состояние, то и \tilde{f} — также состояние.

Доказательство. Проверим сначала \mathbb{C} -линейность функционала \tilde{f} , т.е. что для любых $\lambda = a + ib \in \mathbb{C}$, $a, b \in \mathbb{R}$, а также $v = x + iy$, $w = x' + iy' \in V$, $x, y, x', y' \in V_{sa}$, выполняется $\tilde{f}(v + w) = \tilde{f}(v) + \tilde{f}(w)$ и $\tilde{f}(\lambda v) = \lambda \tilde{f}(v)$. Имеем:

$$\begin{aligned} \tilde{f}(v + w) &= \tilde{f}((x + iy) + (x' + iy')) = \tilde{f}((x + x') + i(y + y')) = f(x + x') + if(y + y') = \\ &= f(x) + f(x') + if(y) + if(y') = (f(x) + if(y)) + (f(x') + if(y')) = \tilde{f}(v) + \tilde{f}(w), \end{aligned}$$

где третье и последнее равенства выполнены по определению отображения \tilde{f} , а остальные — в силу линейности f . Аналогично,

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\lambda v) &= \tilde{f}((a + ib)(x + iy)) = \tilde{f}((ax - by) + i(bx + ay)) = f(ax - by) + if(bx + ay) = \\ &= af(x) - bf(y) + if(bx + ay) = (a + ib)(f(x) + if(y)) = \lambda \tilde{f}(v). \end{aligned}$$

Далее, для $v \in V_{sa}$ имеем $\operatorname{Im}(v) = (v - v^*)/(2i) = 0$ и $\operatorname{Re}(v) = (v + v^*)/2 = v$, откуда $\tilde{f}(v) = f(v)$ и $\tilde{f}(V_{sa}) = f(V_{sa})$. В частности, если $v \in V^+$, то f и \tilde{f} одновременно положительные или нет, так как $\tilde{f}(v) = f(v)$. Наконец, если V содержит порядковую единицу e , то, по лемме 5.6, $e \in V^+$, поэтому, в силу сказанного выше, $\tilde{f}(e) = f(e)$, так что оба этих функционала являются состояниями или нет одновременно. \square

Предложение 5.38. Пусть V — упорядоченное *-пространство с порядковой единицей e . Тогда \mathbb{C} -линейный функционал $f: V \rightarrow \mathbb{C}$ положительный, если и только если существует положительный \mathbb{R} -линейный функционал $g: V_{sa} \rightarrow \mathbb{R}$, для которого $f = \tilde{g}$.

Доказательство. Пусть сначала $f = \tilde{g}$, тогда $f(V^+) = g(V^+) \subset [0, \infty)$ по предложению 5.37, поэтому функционал f — положительный.

Обратно, пусть f — положительный функционал, т.е. $f(V^+) \subset [0, \infty)$. Так как V содержит порядковую единицу, то, в силу леммы 5.6, конус V^+ — полный, поэтому для каждого $x \in V_{sa}$ существуют $x^+, x^- \in V^+$, такие, что $x = x^+ - x^-$, откуда $f(x) = f(x^+) - f(x^-) \in \mathbb{R}$, так что $f(V_{sa}) \subset \mathbb{R}$. Положим $g = f|_{V_{sa}}$. Тогда g — положительный \mathbb{R} -линейный функционал. Более того, пусть $v \in V$ и $v = x + iy$, где $x, y \in V_{sa}$, тогда

$$\tilde{g}(v) = g(x) + ig(y) = f(x) + if(y) = f(x + iy) = f(v),$$

так что $\tilde{g} = f$, что и требовалось. \square

Предложение 5.39. Пусть V — упорядоченное *-пространство с архимедовой порядковой единицей e . Если для некоторого $v \in V$ равенство $f(v) = 0$ выполняется для каждого состояния $f: V \rightarrow \mathbb{C}$, то $v = 0$.

Доказательство. Положим $v = x + iy$, где $x, y \in V_{sa}$. В силу предложения 5.37, для каждого состояния $g: V_{sa} \rightarrow \mathbb{R}$ соответствующее отображение $\tilde{g}: V \rightarrow \mathbb{C}$ также является состоянием. По предположению, $\tilde{g}(v) = 0$ для всех состояний g . Следовательно, $g(x) + ig(y) = 0$, откуда, в силу единственности разложения на вещественную и мнимую части, имеем $g(x) = g(y) = 0$. Так как порядковая единица — архимедова, применимо предложение 5.20, в силу которого $x = y = 0$, откуда $v = 0$, что и требовалось. \square

Предложение 5.40. Пусть V — упорядоченное *-пространство с архимедовой порядковой единицей e . Если для некоторого $v \in V$ неравенство $f(v) \geq 0$ выполняется для каждого состояния $f: V \rightarrow \mathbb{C}$, то $v \in V^+$.

Доказательство. Положим $v = x + iy$, где $x, y \in V_{sa}$. В силу предложения 5.37, для каждого состояния $g: V_{sa} \rightarrow \mathbb{R}$ соответствующее отображение $\tilde{g}: V \rightarrow \mathbb{C}$ также является состоянием. По предположению, $\tilde{g}(v) \geq 0$ для всех состояний g . Следовательно, $g(x) + ig(y) \geq 0$, откуда, в силу единственности разложения на вещественную и мнимую части, имеем $g(x) \geq 0$ и $g(y) = 0$. Так как порядковая единица — архимедова, применимы предложения 5.20 и 5.21, в силу которых $x \geq 0$ и $y = 0$, откуда $v \in V^+$, что и требовалось. \square

5.2.1 Полуноормы на упорядоченных *-пространствах

В теореме 5.33 мы показали, что порядковая полуноорма на вещественном упорядоченном пространстве с порядковой единицей определена однозначно тремя естественными свойствами. В настоящем разделе мы будем продолжать такую полуноорму s (вещественного) подпространства V_{sa} на все комплексное V , следя за тем, чтобы полученная полуноорма уважала инволюцию $*$. Оказывается, имеется много таких продолжений, и среди них можно выделить минимальные и максимальные полуноормы.

Итак, пусть V — произвольное *-пространство, тогда полуноорма (норма) на V называется **-полуноормой* (соответственно, **-нормой*), если $\|v^*\| = \|v\|$ для всех $v \in V$.

Лемма 5.41. Пусть V — произвольное *-пространство и $\|\cdot\|$ — некоторая *-полуноорма на V . Тогда для каждого $v \in V$ выполняется $\|\operatorname{Re}(v)\| \leq \|v\|$ и $\|\operatorname{Im}(v)\| \leq \|v\|$

Доказательство. Имеем

$$\|\operatorname{Re}(v)\| = \frac{1}{2} \|\operatorname{Re}(v) + i\operatorname{Im}(v) + \operatorname{Re}(v) - i\operatorname{Im}(v)\| \leq \frac{1}{2} \|\operatorname{Re}(v) + i\operatorname{Im}(v)\| + \frac{1}{2} \|\operatorname{Re}(v) - i\operatorname{Im}(v)\| = \frac{1}{2} \|v\| + \frac{1}{2} \|v^*\| = \|v\|.$$

Аналогично оценивается и $\operatorname{Im}(v)$. \square

Пусть V — упорядоченное *-пространство с порядковой единицей e и порядковой полуноормой $\|\cdot\|$ на V_{sa} . Тогда *порядковой полуноормой на V* называется *-полуноорма $\|\cdot\|'$ такая, что $\|v\|' = \|v\|$ для всех $v \in V_{sa}$.

5.2.1.1 Минимальная порядковая полуорма $\|\cdot\|_m$

Пусть V — упорядоченное *-пространство с порядковой единицей e . Определим *минимальную порядковую полуорму* $\|\cdot\|_m: V \rightarrow [0, \infty)$ так:

$$\|v\|_m = \sup \left\{ |f(v)| : f: V \rightarrow \mathbb{C} \text{ — состояние} \right\}.$$

Теорема 5.42. Пусть V — упорядоченное *-пространство с порядковой единицей e , и пусть $\|\cdot\|$ — порядковая полуорма на V_{sa} . Тогда

- (1) $\|\cdot\|_m$ является *-полуормой на V ;
- (2) $\|v\|_m = \|v\|$ для всех $v \in V_{sa}$, т.е. $\|\cdot\|_m$ — порядковая полуорма на V ;
- (3) если $\|\cdot\|'$ — любая порядковая *-полуорма на V , то $\|w\|_m \leq \|w\|'$ для всех $w \in V$.

Доказательство. (1) Покажем сначала, что $\|\cdot\|_m$ является полуормой. Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$ и $v, w \in V$, тогда

$$\begin{aligned} \|\lambda v\|_m &= \sup \left\{ |f(\lambda v)| : f: V \rightarrow \mathbb{C} \text{ — состояние} \right\} = \sup \left\{ |\lambda| |f(v)| : f: V \rightarrow \mathbb{C} \text{ — состояние} \right\} = |\lambda| \|v\|_m; \\ \|v + w\|_m &= \sup \left\{ |f(v + w)| : f: V \rightarrow \mathbb{C} \text{ — состояние} \right\} \leq \\ &\leq \sup \left\{ |f(v)| + |f(w)| : f: V \rightarrow \mathbb{C} \text{ — состояние} \right\} \leq \|v\|_m + \|w\|_m. \end{aligned}$$

Покажем теперь, что $\|\cdot\|_m$ — это *-полуорма. Для этого воспользуемся следствием 5.36:

$$\begin{aligned} \|v^*\|_m &= \sup \left\{ |f(v^*)| : f: V \rightarrow \mathbb{C} \text{ — состояние} \right\} = \sup \left\{ |\overline{f(v)}| : f: V \rightarrow \mathbb{C} \text{ — состояние} \right\} = \\ &= \sup \left\{ |f(v)| : f: V \rightarrow \mathbb{C} \text{ — состояние} \right\} = \|v\|_m. \end{aligned}$$

- (2) Докажем, что $\|\cdot\|_m$ — порядковая полуорма на V . Для этого используем предложения 5.38 и 5.25:

$$\begin{aligned} \|v\|_m &= \sup \left\{ |f(v)| : f: V \rightarrow \mathbb{C} \text{ — состояние} \right\} = \sup \left\{ |\tilde{g}(v)| : g: V_{sa} \rightarrow \mathbb{R} \text{ — состояние} \right\} = \\ &= \sup \left\{ |g(v)| : g: V_{sa} \rightarrow \mathbb{R} \text{ — состояние} \right\} = \|v\|. \end{aligned}$$

(3) Выберем произвольное $v \in V$ и любое состояние $f: V \rightarrow \mathbb{C}$. Существует единственное $\theta \in \mathbb{R}$ такое, что $|f(v)| = e^{i\theta} f(v) = f(e^{i\theta} v)$. Положим $w = e^{i\theta} v$. Так как функционал f — положительный, то $f(\operatorname{Re}(w))$, $f(\operatorname{Im}(w)) \in \mathbb{R}$, и так как $f(w) = |f(v)| \in \mathbb{R}$, а $f(w) = f(\operatorname{Re}(w)) + if(\operatorname{Im}(w))$, имеем: $f(\operatorname{Im}(w)) = 0$ и $f(w) = f(\operatorname{Re}(w))$. Следовательно,

$$|f(v)| = f(w) = f(\operatorname{Re}(w)) \leq \|\operatorname{Re}(w)\| = \|\operatorname{Re}(w)\|' = \left\| \frac{w + w^*}{2} \right\|' \leq \frac{1}{2} (\|w\|' + \|w^*\|') = \|w\|' = \|v\|',$$

где первое неравенство имеет место в силу того, что $\operatorname{Re}(w) \in V_{sa}$ и, поэтому, применима теорема 5.33. Так как $\|v\|_m$ равно супремуму левой части полученного соотношения по всем состояниям f , то $\|v\|_m \leq \|v\|'$, что и требовалось. \square

5.2.1.2 Максимальная порядковая полуорма $\|\cdot\|_M$

Пусть V — упорядоченное *-пространство с порядковой единицей e и соответствующей порядковой полуормой $\|\cdot\|$ на V_{sa} . Напомним, что каждый элемент $v \in V$ представим в виде $v = x + iy$, где $x, y \in V_{sa}$. Определим *максимальную порядковую полуорму* $\|\cdot\|_M: V \rightarrow [0, \infty)$ так:

$$\|v\|_M = \inf \left\{ \sum_{k=1}^n |\lambda_k| \|v_k\| : v = \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k, v_k \in V_{sa}, \lambda_k \in \mathbb{C} \right\}.$$

Следующая теорема доказывается аналогично теореме 5.42.

Теорема 5.43. Пусть V — упорядоченное *-пространство с порядковой единицей e , и пусть $\|\cdot\|$ — порядковая полунорма на V_{sa} . Тогда

- (1) $\|\cdot\|_M$ является *-полунормой на V ;
- (2) $\|v\|_M = \|v\|$ для всех $v \in V_{sa}$, т.е. $\|\cdot\|_M$ — порядковая полунорма на V ;
- (3) если $\|\cdot\|'$ — любая *-полунорма на V , для которой $\|v\|' = \|v\|$ при всех $v \in V_{sa}$, то $\|w\|_M \geq \|w\|'$ для всех $w \in V$.

Доказательство. Докажем сначала, что $\|\cdot\|_M$ является полунормой на V . Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$ и $v \in V$. При $\lambda = 0$ равенство $\|\lambda v\|_M = |\lambda| \|v\|_M$ очевидно, так как обе его части равны нулю. При $\lambda \neq 0$ каждое представление $\lambda v = \sum_k \lambda_k v_k$ можно записать в виде $\lambda v = \sum_k \lambda (\lambda_k / \lambda) v_k$, и, обозначив $\mu_k = \lambda_k / \lambda$, переписать так: $\lambda v = \sum_k \lambda \mu_k v_k$, откуда, переходя к инфимуму по μ_k , получим равенство $\|\lambda v\|_M = |\lambda| \|v\|_M$.

Неравенство треугольника следует из того, что каждому представлению $v = \sum_k \lambda_k v_k$ и $w = \sum_k \mu_k u_k$, соответствует представление $v + w = \sum_k \lambda_k v_k + \sum_k \mu_k u_k$.

Далее, если $v = \sum_k \lambda_k v_k$, где $v_k \in V_{sa}$ и $\lambda_k \in \mathbb{C}$, то $v^* = \sum_k \overline{\lambda_k} v_k$, откуда следует, что $\|v\|_M = \|v^*\|_M$, то есть $\|\cdot\|_M$ — это *-полунорма.

Пусть теперь $v \in V_{sa}$. Тогда среди представлений v в виде $v = \sum_k \lambda_k v_k$ есть тривиальное $v = 1v$, поэтому из неравенства треугольника вытекает, что в этом случае на нем достигается инфимум, и поэтому $\|v\|_M = \|v\|$.

Наконец, пусть $\|\cdot\|'$ — любая порядковая *-полунорма на V . Если $v = \sum_k \lambda_k v_k$, то

$$\|v\|' \leq \sum_k |\lambda_k| \|v_k\|' = \sum_k |\lambda_k| \|v_k\|,$$

где неравенство — это неравенство треугольника, а равенство имеет место поскольку $\|v\|' = \|v\|$ для любого $v \in V_{sa}$ по предположению. Переходя к инфимуму, получаем $\|v\|' \leq \|v\|_M$, что и требовалось. \square

Предложение 5.44. Пусть V — упорядоченное *-пространство с порядковой единицей e . Тогда любые две порядковые полунормы на V эквивалентны. Более того, если $\|\cdot\|'$ — произвольная порядковая полунорма на V , то

$$\{v \in V : \|v\|' = 0\} = \bigcap_{\substack{f: V \rightarrow \mathbb{C} \\ \text{состояние}}} \ker f.$$

Доказательство. Так как $\|v\|_m \leq \|v\|' \leq \|v\|_M$ для всех $v \in V$, достаточно проверить эквивалентность минимальной и максимальной порядковых полунорм. Неравенство $\|v\|_m \leq \|v\|_M$ справедливо для каждого $v \in V$ в силу теорем о минимальности и максимальности норм $\|\cdot\|_m$ и $\|\cdot\|_M$. С другой стороны, пусть $\|\cdot\|$ обозначает порядковую полунорму на V_{sa} , тогда, представив v в виде $\operatorname{Re}(v) + i \operatorname{Im}(v)$ и воспользовавшись леммой 5.41, получим

$$\|v\|_M \leq \|\operatorname{Re}(v)\|_M + |i| \|\operatorname{Im}(v)\|_M = \|\operatorname{Re}(v)\| + \|\operatorname{Im}(v)\| = \|\operatorname{Re}(v)\|_m + \|\operatorname{Im}(v)\|_m \leq \|v\|_m + \|v\|_m = 2\|v\|_m,$$

что и завершает доказательство эквивалентности полунорм.

Далее, эквивалентность полунорм влечет $\{v \in V : \|v\|' = 0\} = \{v \in V : \|v\|_m = 0\}$. Теперь второе утверждение предложения вытекает из определения минимальной порядковой полунормы. \square

Следующий результат легко вытекает из предложений 5.25, 5.37 и 5.44.

Предложение 5.45. Пусть V — упорядоченное *-пространство с порядковой единицей e . Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- (1) порядковая полунорма на V_{sa} является нормой;
- (2) $\bigcap_{\substack{f: V_{sa} \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{состояние}}} \ker f = \{0\}$;
- (3) $\bigcap_{\substack{f: V \rightarrow \mathbb{C} \\ \text{состояние}}} \ker f = \{0\}$;
- (4) существует порядковая полунорма, являющаяся нормой;

(5) *все порядковые полунормы на V являются нормами.*

Непосредственно из предложений 5.45 и 5.39 выводим следующий результат.

Следствие 5.46. *Пусть V — упорядоченное *-пространство с архимедовой порядковой единицей e . Тогда каждая порядковая полунорма является нормой.*

Тема 6

Квантовые метрические пространства

План. Обобщенная полунорма, обобщенная полуметрика, обобщенное полуметрическое пространство, факторизация обобщенной полунормы, обобщенная липшицева полунорма, продолжение липшицевых функций, комплексные меры, положительные меры, полная вариация комплексной меры, абсолютная непрерывность одной меры относительно другой, мера, сконцентрированная на данном множестве, взаимно сингулярные меры, σ -конечная мера, теорема Лебега–Радона–Никодима, производная одной меры по другой, полярное разложение комплексной меры, борелевская комплексная мера, регулярная комплексная мера, теорема Рисса о связи борелевской комплексной меры и комплексных линейных функционалов, расстояние Монжа–Канторовича, мера Радона, теорема Рисса о связи борелевской вещественной меры и вещественных линейных функционалов, транспортный план, функционал Монжа–Канторовича, проблема Монжа–Канторовича, упорядоченные пространства с архимедовой порядковой единицей (напоминание), состояния, представление Кэдисона, липшицева полунорма на упорядоченном линейном пространстве, Lip -норма, компактное квантовое метрическое пространство, пространства с липшицевыми полунормами, липшицева топология и $*$ -слабая топология, критерий совпадения липшицевой и $*$ -слабой топологий, равномерно ограниченное семейство функций, равномерно непрерывное семейство функций, теорема Арцела–Асколи, критерий того, что индуцированная липшицевой полунормой обобщенная метрика на пространстве состояний задает $*$ -слабую топологию, преобразование компактного метрического пространства в квантовое, полунепрерывность снизу липшицевых полунорм и восстановление полунормы из метрики, полунепрерывная снизу обобщенная полунорма, поляр, преполяр, сбалансированное подмножество векторного пространства, замкнутая выпуклая сбалансированная оболочка, функционал Минковского, радиальное подмножество векторного пространства, пополнение Минковского и замыкание полунорм, радиус квантового метрического пространства.

Приведем одну конструкцию, которая позволяет в случае “некоммутативной геометрии”, т.е. для C^* -алгебр, определить метрику на пространствах состояний. Эта метрика порождается так называемой липшицевой полунормой. В действительности, эта метрика обобщает расстояние Монжа–Канторовича, заданного на пространстве вероятностных мер. При этом, семейство вероятностных мер можно рассматривать как пространство состояний соответствующей C^* -алгебры. Перейдем к деталям.

В дальнейшем мы введем в рассмотрение обобщенную липшицеву полунорму, которая может принимать и бесконечные значения. При работе с такими нормами возникают тонкости, связанные с необходимостью вводить соглашение о том, как трактовать неопределенность $0 \cdot \infty$. Приведем начала теории таких полунорм.

6.1 Обобщенные полунормы и обобщенные полуметрики

Пусть V — произвольное векторное пространство над полем \mathbb{F} . Отображение $L: V \rightarrow [0, \infty]$ называется **обобщенной полунормой**, если оно

- $L(0) = 0$;
- **субаддитивно**, т.е. $L(v + w) \leq L(v) + L(w)$ для любых $v, w \in V$;
- **положительно однородно**, т.е. $L(\alpha v) = |\alpha|L(v)$ для любых $\alpha \in \mathbb{F}$ и $v \in V$, с учетом следующего соглашения: $0 \cdot \infty = 0$.

Если $L(v) = 0$ влечет $v = 0$, то слово “полунорма” мы заменяем на “норма”. Если отображение L конечно, то слово “обобщенный” будем опускать.

Замечание 6.1. Отметим, что введенное соглашение разрешать неопределенность в данном случае однозначно определено, так как $L(0v) = L(0) = 0$, поэтому если $L(v) = \infty$, то для выполнения и в этом случае положительной однородности необходимо выполнение соглашения $0 = 0 \cdot \infty$. Впрочем, есть и другой подход к определению обобщенных полунорм: положительную однородность можно требовать лишь для $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$. При таком условии мы все равно получим положительную однородность для $\alpha = 0$ и $L(v) < \infty$. Случай $\alpha = 0$ и $L(v) = \infty$ нужно будет обходить стороной.

Предложение 6.2. Пусть L — обобщенная полунорма на векторном пространстве V над полем \mathbb{F} . Тогда множество

$$(6.1) \quad V_f = \{v \in V : L(v) < \infty\}$$

является линейным подпространством в V .

Доказательство. Для любых $v, w \in V_f$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ имеем

$$L(\alpha v + \beta w) \leq |\alpha|L(v) + |\beta|L(w) < \infty,$$

так как все элементы этой формулы конечны. Следовательно, $\alpha v + \beta w \in V_f$, тем самым V_f — подпространство в V , что и требовалось. \square

Покажем, что каждая обобщенная полунорма получается таким образом.

Предложение 6.3. Пусть V — произвольное векторное пространство над полем \mathbb{F} , а W — произвольное линейное подпространство V . Пусть $L_f: W \rightarrow [0, \infty)$ — полунорма. Определим теперь отображение $L: V \rightarrow [0, \infty]$, положив $L(v) = L_f(v)$ для всех $v \in W$, и $L(v) = \infty$ для всех $v \in V \setminus W$. Тогда L — обобщенная полунорма, и W совпадает с подпространством V_f , заданным формулой (6.1).

Доказательство. Для $v, w \in W$ и $\alpha \in \mathbb{F}$ свойства обобщенной полунормы выполняются, так как они имеют место для L_f . Рассмотрим оставшиеся случаи.

Начнем с субаддитивности L . Если $v \in W$ и $w \in V \setminus W$, то $v + w \in V \setminus W$, откуда

$$L(v + w) = \infty \leq L(v) + L(w) = \infty.$$

Если $v, w \in V \setminus W$, то $L(v + w)$ может быть как конечным, так и бесконечным. Но, в любом случае,

$$L(v + w) \leq \infty = L(v) + L(w).$$

Проанализируем положительную однородность. Как уже отмечалось, достаточно рассмотреть случай $v \in V \setminus W$, т.е. когда $L(v) = \infty$. Если $\alpha \neq 0$, то $\alpha v \in V \setminus W$, откуда

$$L(\alpha v) = \infty = |\alpha|L(v).$$

Если же $\alpha = 0$, то $L(\alpha v) = 0$, и, в силу соглашения, $|\alpha|L(v) = 0 \cdot \infty = 0$, так что снова имеется равенство. \square

Для обобщенной полунормы L на V положим $V_0 = \{v \in V : L(v) = 0\}$. Легко видеть, что $V_0 \subset V_f$ также является линейным подпространством. Обозначим \tilde{V} фактор-пространство V/V_0 , а через \tilde{V}_f — фактор-пространство V_f/V_0 , тогда $\tilde{V}_f \subset \tilde{V}$. Пусть $\pi: V \rightarrow \tilde{V}$ — отображение факторизации. Для удобства, обозначим $[v]$ элемент $\pi(v) \in \tilde{V}$. Кроме того, положим $\tilde{L}(v) = \inf\{L(v + k) : k \in V_0\}$.

Предложение 6.4. Определенное выше отображение $\tilde{L}: \tilde{V} \rightarrow [0, \infty]$ является обобщенной нормой, а его ограничение на \tilde{V}_f — нормой.

Доказательство. Проверим аддитивность \tilde{L} : для $[v], [w] \in \tilde{V}$ имеем

$$\begin{aligned} \tilde{L}([v] + [w]) &= \tilde{L}([v + w]) = \inf\{L(v + w + k) : k \in V_0\} = \inf\{L(v + k_1 + w + k_2) : k_1, k_2 \in V_0\} \leq \\ &\leq \inf\{L(v + k_1) + L(w + k_2) : k_1, k_2 \in V_0\} = \\ &= \inf\{L(v + k_1) : k_1 \in V_0\} + \inf\{L(w + k_2) : k_2 \in V_0\} = \tilde{L}([v]) + \tilde{L}([w]). \end{aligned}$$

Проверим положительную однородность. Выберем произвольные $[v] \in \tilde{V}$ и $\alpha \in \mathbb{F}$. Пусть сначала $\alpha \neq 0$, тогда

$$\begin{aligned} \tilde{L}(\alpha[v]) &= \tilde{L}([\alpha v]) = \inf\{L(\alpha v + k) : k \in V_0\} = \inf\{L(\alpha(v + k/\alpha)) : k/\alpha \in V_0\} = \inf\{L(\alpha(v + k)) : k \in V_0\} = \\ &= \inf\{|\alpha|L(v + k) : k \in V_0\} = |\alpha| \inf\{L(v + k) : k \in V_0\} = |\alpha|\tilde{L}([v]). \end{aligned}$$

Пусть теперь $\alpha = 0$. Тогда

$$\tilde{L}(\alpha[v]) = \tilde{L}([0]) = \inf\{L(k) : k \in V_0\} = 0.$$

С другой стороны, не зависимо от значения $\tilde{L}([v])$, имеем

$$|\alpha|\tilde{L}([v]) = 0\tilde{L}([v]) = 0$$

в силу соглашения $0 \cdot \infty = 0$.

Тем самым, мы показали, что \tilde{L} является обобщенной полунормой на \tilde{V} и, поэтому, полунормой на \tilde{V}_f . Докажем положительную определенность \tilde{L} . Предположим противное, т.е. что для некоторого $[v] \neq [0]$ выполняется $\tilde{L}([v]) = 0$. Тогда $\inf\{L(v+k) : k \in V_0\} = 0$, поэтому существует последовательность $k_i \in V_0$ такая, что $L(v-k_i) \rightarrow 0$. Так как $[v] = v + V_0 \neq [0] = V_0$, то $v \notin V_0$, откуда $L(v) > 0$. С другой стороны,

$$L(v) = L(v - k_i + k_i) \leq L(v - k_i) + L(k_i) = L(v - k_i) \rightarrow 0,$$

противоречие. □

Предложение 6.5 (Сравнение обобщенных полунорм). Пусть L_1 и L_2 — обобщенные полунормы на векторном пространстве V , и $X_i = \{v \in V : L_i(v) \leq 1\}$, $i = 1, 2$. Тогда

- (1) $X_1 \subset X_2$, если и только если $L_1 \geq L_2$;
- (2) $L_1 = L_2$, если и только если $X_1 = X_2$.

Доказательство. (1) Пусть сначала $X_1 \subset X_2$. Покажем, что тогда $L_1 \geq L_2$. Предположим противное, т.е. существует $v \in V$ такой, что $L_1(v) < L_2(v)$. Тогда $L_2(v) > 0$, в частности, $v \neq 0$. Если $L_2(v) = \infty$, то для любого ненулевого $r \in \mathbb{R}$ имеем $L_2(rv) = \infty$, но $L_1(v) < \infty$. Если $L_1(v) = 0$, то $v \in X_1 \subset X_2$, поэтому $L_2(v) \leq 1$, противоречие. Если же $L_1(v) > 0$, то $w = v/L_1(v) \neq 0$ и $w \in X_1 \subset X_2$, поэтому $L_2(w) < \infty$, и снова противоречие.

Пусть теперь $L_2(v) < \infty$, тогда для $w = v/L_2(v)$ имеем $L_2(w) = 1$ и, в силу предположения $L_1(v) < L_2(v)$ и положительной однородности обобщенных полуметрик, имеем $L_1(w) < L_2(w) = 1$. Если $L_1(w) = 0$, то для произвольного вещественного $r > 1$ имеем $L_1(rw) = 0$ и $L_2(rw) > 1$, поэтому $rw \in X_1$, но $rw \notin X_2$, противоречие. Если же $L_1(w) \neq 0$, то положим $r = 1/L_1(w)$. Так как $L_1(w) < 1$, то $r > 1$. Но тогда $L_1(rw) = 1$ и $L_2(rw) > 1$, поэтому $rw \in X_1$, но $rw \notin X_2$, и снова получаем противоречие.

Обратно, пусть $L_1 \geq L_2$. Тогда для каждого $v \in X_1$ выполняется $L_2(v) \leq L_1(v) \leq 1$, поэтому $v \in X_2$, так что $X_1 \subset X_2$.

(2) Если $L_1 = L_2$, то и $X_1 = X_2$. Обратно, пусть $X_1 = X_2$, но $L_1 \neq L_2$, т.е. существует $v \in V$, для которого, без ограничения общности, выполняется $L_1(v) < L_2(v)$, в частности, $L_1(v) < \infty$. Если $L_1(v) = 0$, то $v \in X_1 = X_2$, поэтому $0 < L_2(v) \leq 1$. Но тогда для вещественного $r > 1/L_2(v)$ имеем $L_1(rv) = 0$, но $L_2(rv) > 1$, поэтому $rv \in X_1$, но $rv \notin X_2$, противоречие.

Пусть теперь $L_1(v) > 0$, тогда для $w = v/L_1(v)$ имеем $1 = L_1(w) < L_2(w)$, поэтому $w \in X_1$, но $w \notin X_2$, противоречие. Доказательство закончено. □

Обобщенная полунорма порождает на V обобщенную полуметрику. Напомним, что для множества X функция $\rho : X \times X \rightarrow [0, \infty]$ называется **обобщенной полуметрикой**¹, если она обладает следующими свойствами:

- $\rho(x, x) = 0$ при всех $x \in X$;
- $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ при всех $x, y \in X$ (**симметричность**);
- $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ (**неравенство треугольника**).

Множество X , на котором задана такая функция ρ , называется **обобщенным полуметрическим пространством**. Если в качестве X взять векторное пространство V с обобщенной полунормой L , то $\rho_L(v, w) := \rho(v, w) = L(v-w)$ будет являться обобщенной полуметрикой. Доказательство стандартно.

Если $V_f \subset V$ — подпространство, определенное формулой (6.1), то $\rho(v, w) < \infty$, если и только если $v - w \in V_f$. Таким образом, все V распадается в объединение подпространства V_f и аффинных подпространств $u + V_f$, полученных их V_f всевозможными сдвигами $u \in V$. При этом все сдвиги являются изометриями V , в частности, все аффинные подпространства $u + V_f$ изометричны. На каждом из этих подпространств обобщенная

¹Вместо термина “полуметрика” иногда используется другой термин — “псевдометрика”.

полуметрика ρ конечна, а на точках их разных подпространств — бесконечна. Соответствующая топология, заданная ρ , превращает V в несвязное объединение различных аффинных подпространств вида $u + V_f$, на каждом из которых топология порождена полунормой. Если L не является нормой, то топология нехаусдорфова, а если является — то хаусдорфова.

В общем случае, т.е. когда обобщенная полуметрика ρ задана на множестве X , используется терминология, аналогичная той, что мы ввели для обобщенных полунорм. А именно, если $\rho(x, y) < \infty$ для любых $x, y \in X$, то в названии для ρ опускается слово “обобщенный”, а если $\rho(x, y) = 0$ в точности тогда, когда $x = y$, то вместо термина полуметрика употребляется термин метрика.

Далее, на множестве X с обобщенной полуметрикой естественно задаются две эквивалентности: \sim_0 и \sim_∞ . Для \sim_0 эквивалентными считаются элементы из X , находящиеся на нулевом расстоянии, во для \sim_∞ — на бесконечном. Если X_i — классы эквивалентности \sim_∞ , то каждый X_i является полуметрическим пространством, а расстояние между любыми элементами разных классов равно ∞ . Разбиение X , заданное эквивалентностью \sim_0 , является подразбиением в $\{X_i\}$, при этом расстояние между элементами любых двух классов эквивалентности \sim_0 не зависит от выбора представителей. Таким образом, если на множестве X/\sim_0 классов эквивалентности \sim_0 задать расстояние, равное расстоянию между любыми представителями классов, то получится корректно определенная обобщенная метрика. При этом каждое $\{X_i/\sim_0\}$ — разбиение X/\sim_0 на классы эквивалентности \sim_∞ , и каждое X_i/\sim_0 представляет собой метрическое пространство.

6.1.1 Факторизация

Пусть A и B — векторные пространства над полем \mathbb{F} , $\pi: A \rightarrow B$ — эпиморфизм, и L_A — обобщенная полунорма на A . Положим $L_B(b) = \inf\{L_A(a) : a \in \pi^{-1}(b)\}$.

Теорема 6.6. *Отображение $L_B: B \rightarrow [0, \infty]$ — обобщенная полунорма. При этом, если L_A — полунорма, то L_B — также полунорма.*

Доказательство. Положим $A_f = \{a \in A : L_A(a) < \infty\}$, тогда A_f — линейное подпространство в A по предложению 6.2. Ясно, что отображение L_B конечно в точности на тех $b \in B$, для которых $\pi^{-1}(b) \cap A_f \neq \emptyset$. Иными словами, L_B конечно в точности на $B_f := \pi(A_f)$, которое, в силу линейности π , является линейным подпространством в B . Так как вне A_f отображение L_A бесконечно, то ограничение отображения π на A_f порождает ту же самую функцию на B_f . Таким образом, если мы покажем, что эпиморфизм $\pi|_{A_f, B_f}: A_f \rightarrow B_f$ порождает на B_f полунорму, то, в силу предложения 6.3, L_B будет обобщенной полунормой. Чтобы не загромождать текст обозначениями, мы в оставшейся части доказательства будем сразу считать L_A полунормой.

Заметим сначала, что если $b \in B$ и $\alpha \in \mathbb{F}$, $\alpha \neq 0$, то $\pi^{-1}(\alpha b) = \alpha \pi^{-1}(b)$. Действительно, пусть $\pi(c) = \alpha b$, тогда $\pi(c/\alpha) = \pi(c)/\alpha = b$, поэтому $c \in \pi^{-1}(b)$ и, значит, $\alpha c \in \alpha \pi^{-1}(b)$, так что $\pi^{-1}(\alpha b) \subset \alpha \pi^{-1}(b)$. Пусть теперь $c \in \alpha \pi^{-1}(b)$, тогда $c = \alpha a$ для некоторого $a \in \pi^{-1}(b)$. Но тогда $\pi(c) = \pi(\alpha a) = \alpha \pi(a) = \alpha b$, поэтому $c \in \pi^{-1}(\alpha b)$, откуда $\pi^{-1}(\alpha b) \supset \alpha \pi^{-1}(b)$, откуда и вытекает декларируемое равенство. Если же $\alpha = 0$, то $\pi^{-1}(\alpha b) = \pi^{-1}(0) = \ker \pi$, но $\alpha \pi^{-1}(b) = \{0\}$, так что имеет место лишь включение $\alpha \pi^{-1}(b) \subset \pi^{-1}(\alpha b)$.

Таким образом, если $\alpha \neq 0$, то

$$\begin{aligned} L_B(\alpha b) &= \inf\{L_A(a) : a \in \pi^{-1}(\alpha b)\} = \inf\{L_A(a) : a \in \alpha \pi^{-1}(b)\} = \\ &= \inf\{L_A(\alpha c) : c \in \pi^{-1}(b)\} = \inf\{|\alpha|L_A(c) : c \in \pi^{-1}(b)\} = |\alpha|L_B(b). \end{aligned}$$

Если же $\alpha = 0$, то $L_B(\alpha b) = L_B(0) = \inf\{L_A(a) : a \in \pi^{-1}(0)\} = 0$, и мы доказали положительную однородность функции L_B .

Пусть теперь $b, b' \in B$. Покажем, что $\pi^{-1}(b + b') = \pi^{-1}(b) + \pi^{-1}(b')$. Действительно, если $c \in \pi^{-1}(b) + \pi^{-1}(b')$, то $c = a + a'$, где $a \in \pi^{-1}(b)$ и $a' \in \pi^{-1}(b')$. Но тогда $\pi(c) = \pi(a + a')$, откуда $c \in \pi^{-1}(a + a')$ и, значит, $\pi^{-1}(b) + \pi^{-1}(b') \subset \pi^{-1}(b + b')$. Обратно, пусть $c \in \pi^{-1}(b + b')$ и $a \in \pi^{-1}(b)$, тогда $\pi(c - a) = \pi(c) - \pi(a) = b + b' - b = b'$, откуда $c - a = a'$ для некоторого $a' \in \pi^{-1}(b')$, так что $c = a + a'$ и, значит $c \in \pi^{-1}(b) + \pi^{-1}(b')$, т.е. $\pi^{-1}(b + b') \subset \pi^{-1}(b) + \pi^{-1}(b')$, откуда и вытекает декларируемое равенство.

Таким образом,

$$\begin{aligned} L_B(b + b') &= \inf\{L_A(c) : c \in \pi^{-1}(b + b')\} = \inf\{L_A(a + a') : a \in \pi^{-1}(b), a' \in \pi^{-1}(b')\} = \\ &= \inf\{L_A(a) + L_A(a') : a \in \pi^{-1}(b), a' \in \pi^{-1}(b')\} = L_B(b) + L_B(b'). \end{aligned}$$

Доказательство закончено. □

Определение 6.7. Обобщенная полунорма L_B из теоремы 6.6 называется *обобщенной фактор-полунормой*, и если L_B — полунорма, то — *фактор-полунормой*.

Предложение 6.8. Пусть A и B — векторные пространства над полем \mathbb{F} , $\pi: A \rightarrow B$ — эпиморфизм, L_A — обобщенная полунорма на A , а L_B — фактор-полунорма. Пусть для $t \in (0, \infty)$

$$B_A^t = \{a \in A : L_A(a) \leq t\} \quad \text{и} \quad B_B^t = \{b \in B : L_B(b) \leq t\}$$

обозначают шары радиуса t для полунорм L_A и L_B соответственно. Тогда имеем $\pi(B_A^t) \subset t B_B^t$.

Доказательство. Действительно, для каждого $a_0 \in B_A^t$ и $b_0 = \pi(a_0)$ выполняется

$$L_B(b_0) = \inf\{L_A(a) : a \in \pi^{-1}(b_0)\} \leq L_A(a_0) \leq t,$$

что и требовалось. \square

6.2 Обобщенная липшицева полунорма на обобщенном метрическом пространстве

Пусть (X, ρ) — произвольное обобщенное метрическое пространство, \mathbb{F} — поле действительных или комплексных чисел, и $f: X \rightarrow \mathbb{F}$ — функция. Положим

$$(6.2) \quad L_\rho(f) = \sup \left\{ \frac{|f(x) - f(y)|}{\rho(x, y)} : x, y \in X, x \neq y \right\}.$$

Отметим, что $L_\rho(f)$ может быть бесконечным, а также равным нулю для ненулевой функции f . По определению, величина $L_\rho(f)$ конечна, если и только если функция f — липшицева. Напомним, что для липшицевой функции f величина $L_\rho(f)$ называется *растяжением*, являясь наименьшей константой Липшица.

Замечание 6.9. Для обобщенной метрики определение липшицевой функции такое же, как и для метрики. Например, если $\rho(x, y) = \infty$ для каждой пары $x \neq y$, то все функции будут липшицевыми, а $L_\rho \equiv 0$. В общем случае, если $\{X_i\}$ — разбиение множества X на классы эквивалентности \sim_∞ ($x \sim_\infty y$, если и только если $\rho(x, y) = \infty$), то функция $f: X \rightarrow \mathbb{F}$ — липшицева, если и только если каждое ограничение $f|_{X_i}$ является липшицевой функцией в обычном смысле, т.е. на метрическом пространстве.

Обозначим \mathbb{F}^X векторное пространство всех функций на X со значениями в \mathbb{F} .

Предложение 6.10. Для любых $f, g \in \mathbb{F}^X$ и произвольных $\alpha \in \mathbb{F}$ имеем

- (1) $L_\rho(f + g) \leq L_\rho(f) + L_\rho(g)$;
- (2) $L_\rho(\alpha f) = |\alpha| L_\rho(f)$, где мы полагаем $0 \cdot \infty = 0$;
- (3) $L_\rho(0) = 0$, где $0: X \rightarrow \mathbb{F}$ — постоянная функция, равная нулю.

Иными словами, L_ρ является обобщенной полунормой на \mathbb{F}^X .

Доказательство. (1) Для любых $x, y \in X$, $x \neq y$ имеем

$$\frac{|f(x) + g(x) - f(y) - g(y)|}{\rho(x, y)} \leq \frac{|f(x) - f(y)|}{\rho(x, y)} + \frac{|g(x) - g(y)|}{\rho(x, y)},$$

откуда и вытекает требуемое в силу того, что супремум суммы двух функций не превосходит суммы супремумов этих функций.

(2) Снова для любых $x, y \in X$, $x \neq y$ имеем

$$\frac{|\alpha f(x) - \alpha f(y)|}{\rho(x, y)} = |\alpha| \frac{|f(x) - f(y)|}{\rho(x, y)},$$

поэтому супремумы левой и правой частей равны. При этом супремум левой части равен $L_\rho(\alpha f)$, а супремум правой при $L_\rho(f) < \infty$ или при $\alpha \neq 0$ равен $|\alpha| L_\rho(f)$, а при $L_\rho(f) = \infty$ и $\alpha = 0$ равен нулю, что, в силу соглашения $0 \cdot \infty = 0$, приводит к формуле $0 = 0 \cdot \infty = |\alpha| L_\rho(f)$, значит и в этом случае утверждение имеет место.

(3) Очевидно. \square

Обобщенная полунорма L_ρ называется **обобщенной липшицевой полунормой**, порожденной обобщенной метрикой ρ пространства X . Отметим, что в дальнейшем мы введем еще одно понятие, которое будем называть липшицевой полунормой, однако эта новая обобщенная полунорма будет задаваться аксиоматически, без помощи заранее заданной обобщенной полуметрики, и всегда будет предполагаться конечной, т.е. полунормой.

Оказывается, исходная обобщенная метрика однозначно восстанавливается по порожденной ей обобщенной липшицевой полунорме L_ρ . Мы начнем с разбора случая, когда ρ — метрика.

Предложение 6.11. Пусть ρ — метрика на множестве X , а L_ρ — обобщенная липшицева полунорма, порожденная ρ . Тогда для любых $x, y \in X$ выполняется

$$(6.3) \quad \rho(x, y) = \sup \left\{ |f(x) - f(y)| : L_\rho(f) \leq 1 \right\}.$$

Доказательство. Так как $|f(x) - f(y)| \leq L_\rho(f)\rho(x, y)$, то правая часть формулы (6.3) не превосходит $\rho(x, y)$. С другой стороны, возьмем в качестве f функцию $f(y) = \rho(x, y)$, тогда $L_\rho(f) \leq 1$, так как $|f(y) - f(z)| = |\rho(x, y) - \rho(x, z)| \leq \rho(y, z)$. Кроме того, $|f(x) - f(y)| = \rho(x, y)$, откуда правая часть формулы (6.3) не меньше $\rho(x, y)$. \square

Обобщим предложение 6.11 на произвольные обобщенные метрики.

Предложение 6.12. Пусть ρ — обобщенная метрика на множестве X , а L_ρ — обобщенная липшицева полунорма, порожденная ρ . Тогда для любых $x, y \in X$ выполняется

$$(6.4) \quad \rho(x, y) = \sup \left\{ |f(x) - f(y)| : L_\rho(f) \leq 1 \right\}.$$

Доказательство. Пусть \sim_∞ — определенная выше эквивалентность на X , в которой эквивалентными являются пары точек, находящихся на конечном расстоянии, и пусть $\{X_i\}$ — разбиение X на классы этой эквивалентности. Обозначим ρ_i ограничения ρ на X_i , тогда ρ_i — полуметрика. Покажем, что для $x, y \in X_i$ выполняется

$$\rho(x, y) = \sup \left\{ |g(x) - g(y)| : g: X_i \rightarrow \mathbb{F}, L_{\rho_i}(g) \leq 1 \right\}.$$

Действительно, если $f: X \rightarrow \mathbb{F}$ такова, что $L_\rho(f) \leq 1$, то и для $g = f|_{X_i}$ имеем $L_{\rho_i}(g) \leq 1$. С другой стороны, для каждой функции $g: X_i \rightarrow \mathbb{F}$ функция $f: X \rightarrow \mathbb{F}$, являющаяся продолжением g на все X нулем, удовлетворяет $L_{\rho_i}(g) = L_\rho(f)$, что и завершает доказательство приведенной только что формулы для $\rho(x, y)$.

Из сказанного вытекает, что формула (6.4) восстанавливает ρ на каждом X_i . Пусть теперь $x \in X_i$, а $y \in X_j$ для $i \neq j$. Заметим, что для функции f , постоянной на каждом X_i , имеем $L_\rho(f) = 0$, поэтому все такие функции можно выбирать для вычисления супремума в формуле (6.4). Но тогда этот супремум равен ∞ , что и завершает восстановление ρ на всем X . \square

Замечание 6.13. Как видно из формулировки предложения 6.11, для восстановления исходной метрики совсем не обязательно знать L_ρ на всем пространстве \mathbb{F}^X . Ее достаточно знать на подмножестве $\text{Lip}^\rho(X) \subset \mathbb{F}^X$, состоящем из всех 1-липшицевых функций относительно ρ . Это подмножество не является векторным пространством. С другой стороны, множество $\text{Lip}^\rho(X) \supset \text{Lip}_1^\rho(X)$, состоящее из всех липшицевых функций, является, в силу предложения 6.10, векторным пространством. Отметим, что L_ρ является полунормой на $\text{Lip}^\rho(X)$. Более того, если $L_\rho(f) = 0$, то это означает, что $f(x) - f(y) = 0$ при всех $x, y \in X$, т.е. f — константа. Таким образом, если $\text{Lip}^\rho(X)$ профакторизовать по всем константам, то на полученном векторном пространстве функция L_ρ индуцирует норму, которую мы также обозначим L_ρ . Именно такая конструкция будет возникать в дальнейшем в различных ситуациях.

Соглашение 6.14. Если из контекста понятно, о какой метрике идет речь, то вместо $\text{Lip}^\rho(X)$ и $\text{Lip}_1^\rho(X)$ будем сокращенно писать $\text{Lip}(X)$ и $\text{Lip}_1(X)$ соответственно.

6.2.1 Продолжение липшицевых функций

Пусть (Z, ρ) — произвольное метрическое пространство и $X \subset Z$ — непустое замкнутое подмножество. Пусть $\text{Lip}(Z)$ и $\text{Lip}(X)$ — пространства вещественнозначных липшицевых функций, а $\pi: \text{Lip}(Z) \rightarrow \text{Lip}(X)$ — отображение ограничения на X функций, заданных на Z . Пусть L_X и L — липшицевы полунормы на $\text{Lip}(X)$ и $\text{Lip}(Z)$, соответствующие метрикам ρ_X и ρ соответственно. Так как липшицева полунорма определяется как супремум выражений по всем парам точек из пространства, переход от пространства к подмножеству не увеличивает этот супремум, поэтому $L_X(\pi(f)) \leq L(f)$ для каждой $f \in \mathbb{R}^Z$.

Теорема 6.15 (Макшейн, Уитни). Для каждой функции $g \in \text{Lip}(X)$ существует $f \in \text{Lip}(Z)$ такая, что $\pi(f) = g$ и $L_X(g) = L(f)$.

Доказательство. Положим для краткости $M = L_X(g)$ и для каждого $x \in X$ определим функцию $f_x: Z \rightarrow \mathbb{R}$ так:

$$f_x(z) = g(x) + M \rho(z, x).$$

Лемма 6.16. Каждая функция f_x является M -липшицевой.

Доказательство. Для произвольных $z, w \in Z$ имеем

$$|f_x(z) - f_x(w)| = M |\rho(z, x) - \rho(w, x)| \leq M \rho(z, w),$$

что и требовалось. \square

Из определения функции f_x и M -липшицевости функции g вытекает, что $f_x(x) = g(x)$, и для каждого $y \in X$ выполняется

$$f_y(x) = g(y) + M \rho(x, y) \geq g(x) = f_x(x),$$

т.е. в точке $x \in X$ значение функции f_x не превосходит значений всех остальных функций f_y , $y \in X$.

Положим $f(z) = \inf_{x \in X} f_x(z)$. Из сказанного выше вытекает, что для каждого $x \in X$ выполняется $f(x) = \inf_{y \in X} f_y(x) = f_x(x) = g(x)$, т.е. f действительно продолжает g .

Лемма 6.17. Пусть на множестве W заданы две функции $\varphi, \psi: W \rightarrow \mathbb{R}$, причем их инфимумы конечны. Тогда

$$\inf_W \varphi - \inf_W \psi \leq \sup_W (\varphi - \psi).$$

Доказательство. Действительно,

$$\inf_W \varphi - \inf_W \psi = \sup_{w' \in W} (\inf_{w \in W} \varphi(w) - \psi(w')) \leq \sup_{w' \in W} (\varphi(w') - \psi(w')).$$

\square

Применим лемму 6.17 к нашему случаю. Имеем

$$f(z) - f(y) = \inf_{x \in X} f_x(z) - \inf_{x \in X} f_x(y) \leq \sup_{x \in X} (f_x(z) - f_x(y)) \leq M \rho(z, y),$$

где последнее неравенство вытекает из леммы 6.16. Таким образом, функция f является M -липшицевой, что и требовалось. \square

Замечание 6.18. В теореме 6.15 нельзя заменить вещественнозначные функции на комплекснозначные. Действительно, пусть $Z = \{e, p_1, p_2, p_3\}$ четырехточечное метрическое пространство, в котором расстояние от e до всех p_i равно 1, а расстояние между разными p_i равно 2. Пусть $X = \{p_1, p_2, p_3\}$ и $g: X \rightarrow \mathbb{C}$ изометричное вложение, так что $M = L_X(g) = 1$. Тогда если $f(e)$ не совпадает с центром треугольника $g(X)$, то расстояние от $g(e)$ до одной из вершин этого треугольника будет больше радиуса описанной вокруг треугольника окружности, т.е. больше $2/\sqrt{3}$. Поэтому минимальное расстояние от $f(e)$ до вершин треугольника $f(X)$ равно $2/\sqrt{3}$, и эта последняя величина — наименьшая липшицева константа всевозможных продолжений функции g . Следовательно, такое g невозможно продолжить до липшицевой функции с той же константой Липшица.

Из теоремы 6.15 и предыдущих рассуждений немедленно получаем

Следствие 6.19. Во введенных выше обозначениях, для каждой $g \in \text{Lip}(X)$ имеем $L_X(g) = \min L(f)$, где минимум берется по всевозможным липшицевым продолжениям функции g на все Z .

6.3 Комплексные меры

Как мы уже отмечали, обсуждаемые ниже метрики являются обобщением расстояния Монжа–Канторовича, заданного на пространстве вероятностных мер, которое рассматривается как пространство состояний C^* -алгебры. Чтобы определить такое представление, мы напомним понятие комплексной меры и некоторые факты, связанные с такими мерами. Детали см., например, в монографии Рудина [22].

Для удобства изложения, **счетным разбиением множества E** назовем каждую последовательность E_1, E_2, \dots подмножеств E , в которой $E_i \cap E_j = \emptyset$ при всех $i \neq j$ и $\cup E_i = E$. Отметим, что если такая последовательность содержит лишь конечное число E_i , отличных от пустого множества, то такое разбиение фактически является конечным.

В настоящем разделе обозначим X некоторое множество и фиксируем на нем некоторую σ -алгебру \mathcal{A} его подмножеств, элементы которой будем традиционно называть **измеримыми множествами**. Каждое счетное разбиение множества $E \in \mathcal{A}$, состоящее из измеримых множеств, будем называть **измеримым**. Напомним, что функция $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ называется **измеримой**, если для каждого борелевского подмножества $B \subset \mathbb{C}$ имеем $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$.

Комплексной мерой на \mathcal{A} называется каждая функция $\mu: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ такая, что

$$(1) \mu(\emptyset) = 0, \text{ и}$$

(2) для каждого счетного измеримого разбиения $\{E_i\}$ множества $E \in \mathcal{A}$ ряд $\sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$ абсолютно сходится и

$$\mu(E) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i) \quad (\text{счетная аддитивность}).$$

Стандартные меры на \mathcal{A} , т.е. принимающие значения в $[0, \infty]$, будем называть **положительными**. Так как абсолютная сходимость ряда в определении комплексной меры означает конечность суммы модулей элементов этого ряда, то положительная мера является комплексной, если и только если она конечна.

Определим функцию $|\mu|: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$, положив $|\mu|(E) = \sup \sum_{i=1}^{\infty} |\mu(E_i)|$, где супремум берется по всевозможным счетным измеримым разбиениям $\{E_i\}$ множества $E \in \mathcal{A}$.

Теорема 6.20. *Функция $|\mu|$ является положительной мерой на \mathcal{A} , причем $|\mu|(X) < \infty$.*

Мера $|\mu|$ называется **полной вариацией** комплексной меры μ . Из теоремы 6.20 вытекает, что лишь ограниченные меры могут являться полными вариациями комплексных мер.

Легко видеть, что линейная комбинация комплексных мер также является комплексной мерой, поэтому семейство всех комплексных мер образует комплексное векторное пространство \mathcal{M} . Из теоремы 6.20 вытекает, что для каждой $\mu \in \mathcal{M}$ выполняется $|\mu| \in \mathcal{M}$.

Положим $\|\mu\| = |\mu|(X)$.

Задача 6.21. Докажите, что определенная нами функция $\|\cdot\|$ на \mathcal{M} является нормой.

Для $\lambda, \mu \in \mathcal{M}$ говорят, что λ **абсолютно непрерывна относительно μ** и пишут $\lambda \ll \mu$, если для каждого $E \in \mathcal{A}$ такого, что $\mu(E) = 0$, выполняется $\lambda(E) = 0$.

Пример 6.22. Так как $|\mu(E)| \leq |\mu|(E)$ для каждого $E \in \mathcal{A}$, то $\mu \ll |\mu|$.

Для $\mu \in \mathcal{M}$ и $A \in \mathcal{A}$ говорят, что μ **сконцентрирована на A** , если для каждого $E \in \mathcal{A}$ выполняется $\mu(E) = \mu(E \cap A)$. Последнее равносильно тому, что $\mu(E) = 0$ для всех $E \in \mathcal{A}$ таких, что $E \cap A = \emptyset$.

Если для мер $\lambda, \mu \in \mathcal{M}$ существуют $A, B \in \mathcal{A}$ такие, что $A \cap B = \emptyset$, λ сконцентрирована на A , μ сконцентрирована на B , то эти меры называются **взаимно сингулярными**, что записывается $\lambda \perp \mu$.

Напомним, что положительная мера называется **σ -конечной**, если X представимо в виде счетного объединения измеримых множеств конечной меры.

Также для $\mu \in \mathcal{M}$ обозначим через $L^1(\mu)$ множество всех измеримых функций $f: X \rightarrow \mathbb{C}$, рассматриваемых с точностью до их значений на множествах μ -меры ноль и таких, что

$$\|f\|_1 := \int_X |f| d\mu < \infty.$$

Теорема 6.23 (Лебег–Радон–Никодим). *Пусть μ — положительная σ -конечная мера, а $\lambda \in \mathcal{M}$. Тогда*

(1) существует и единственна пара $\lambda_a, \lambda_s \in \mathcal{M}$ такая, что

$$\lambda = \lambda_a + \lambda_s, \quad \lambda_a \ll \mu, \quad \lambda_s \perp \mu.$$

Если λ — положительна (и конечна), то λ_a и λ_s — такие же.

(2) Существует единственная $h \in L^1(\mu)$ такая, что

$$\lambda_a(E) = \int_E h d\mu$$

для всех $E \in \mathcal{A}$.

Функция h из теоремы 6.23 называется **производной меры** λ_a по μ и записывается $h = d\lambda_a/d\mu$ или $d\lambda_a = h d\mu$.

Как следствие, получим **полярное разложение** комплексной меры μ .

Следствие 6.24. Для $\mu \in \mathcal{M}$ существует измеримая функция $h: X \rightarrow \mathbb{C}$ такая, что $|h(x)| = 1$ для всех $x \in X$ и $d\mu = h d|\mu|$.

Приведем еще одно следствие.

Следствие 6.25. Пусть μ — положительная мера, $g \in L^1(\mu)$, и $\lambda \in \mathcal{M}$. Предположим, что для каждого $E \in \mathcal{A}$ выполняется

$$\lambda(E) = \int_E g d\mu.$$

Тогда

$$|\lambda|(E) = \int_E |g| d\mu.$$

Пусть теперь X — локально компактное хаусдорфово топологическое пространство, а \mathcal{A} — борелевская σ -алгебра (наименьшая σ -алгебра, содержащая топологию). Каждая мера на таком \mathcal{A} , комплексная или положительная, называется **борелевской**. Если для **положительной конечной** меры μ и каждого $E \in \mathcal{A}$ выполняется

$$\begin{aligned} \mu(E) &= \inf\{\mu(V) : E \subset V, \text{ где } V \subset X \text{ — открытое множество}\} = \\ &= \sup\{\mu(K) : E \supset K, \text{ где } K \subset X \text{ — компактное множество}\}, \end{aligned}$$

то мера μ называется **регулярной**.² **Комплексная борелевская мера** $\mu \in \mathcal{M}$ называется **регулярной**, если таковой является ее полная вариация $|\mu|$.

Напомним, что через $C_0(X)$ мы обозначали все непрерывные функции на X , зануляющиеся на бесконечности, т.е. такие $f: X \rightarrow \mathbb{C}$, что для каждого $\varepsilon > 0$ существует компакт $K \subset X$, для которого $|f|(x) < \varepsilon$ при всех $x \in X \setminus K$. Напомним также, что пространство $C_0(X)$ с суп-нормой является одним из важнейших примеров коммутативной C^* -алгебры. Как и раньше, через $C_0(X)^*$ обозначим двойственное банахово пространство, состоящее из всех непрерывных (т.е. ограниченных) линейных отображений (функционалов) $\Phi: C_0(X) \rightarrow \mathbb{C}$.

Теорема 6.26 (Рисс, см. [22]). Пусть X — локально компактное хаусдорфово топологическое пространство. Каждая борелевская комплексная мера $\mu \in \mathcal{M}$ порождает непрерывный линейный функционал $\Phi: C_0(X) \rightarrow \mathbb{C}$ по формуле $\Phi(f) = \int_X f d\mu$. Обратно, для каждого $\Phi \in C_0(X)^*$ существует единственная **регулярная борелевская комплексная мера** $\mu \in \mathcal{M}$ такая, что

$$\Phi(f) = \int_X f d\mu$$

для всех $f \in C_0(X)$. Более того,

$$\|\Phi\| = |\mu|(X).$$

Кроме того, если для каждой вещественной неотрицательной $f \in C_0(X)$ число $\Phi(f)$ также вещественное неотрицательное, то μ — **положительная мера**.

²Это определение взято из Рудина [22]. Часто в определении регулярности вместо компактов K рассматривают замкнутые множества.

Задача 6.27. Приведите пример двух разных борелевских комплексных мер, порождающих один и тот же линейный функционал $\Phi \in C_0(X)$.

Обозначим $\mathcal{M}_r(X) \subset \mathcal{M}(X)$ множество регулярных борелевских комплексных мер на локально компактном хаусдорфовом пространстве X . Легко видеть, что $\mathcal{M}_r(X)$ также является комплексным векторным пространством с нормой $\mu \mapsto |\mu|(X)$, а соответствие из теоремы 6.26 уважает комплексные линейные комбинации и сопряжение $*$. Тем самым, с учетом сказанного, теорема 6.26 влечет следующую переформулировку.

Следствие 6.28. *Соответствие между нормированными пространствами $C_0(X)^*$ и $\mathcal{M}_r(X)$, описанное в теореме 6.26, является линейным изометричным $*$ -изоморфизмом.*

Напомним, что $C_0(X)$ является C^* -алгеброй, и что (пример 4.6) множество $C_0(X)_{sa}$ самосопряженных элементов в $C_0(X)$ состоит в точности из всех вещественных функций, а его подмножество $C_0(X)^+$ положительных элементов — из всех неотрицательных вещественных функций. Для C^* -алгебры \mathbb{C} множество положительных элементов — это в точности все неотрицательные вещественные числа.

Далее, функционал $\Phi \in C_0(X)^*$ положителен, если он сопоставляет каждому $f \in C_0(X)^+$ неотрицательное вещественное число. Таким образом, в силу теоремы 6.26, положительные функционалы соответствуют в точности всем положительным мерам $\mu \in \mathcal{M}_r(X)$.

Напомним, что состоянием называется положительный функционал единичной нормы. В силу сказанного выше, пространство состояний $\mathcal{S}(C_0(X)) \subset C_0(X)^*$ соответствует в точности пространству всех регулярных вероятностных мер $\mathcal{P}_r(X) \subset \mathcal{M}_r(X)$. Это пространство, будучи наделенным $*$ -слабой топологией, компактно. Ниже мы зададим на $C_0(X)^*$ расстояние с помощью обобщенной липшицевой полуnormы на $C_0(X)$, и покажем, что соответствующая топология, индуцированная на $\mathcal{S}(C_0(X))$, — это, в точности, введенная выше $*$ -слабая топология. Этим, в частности, объясняется важность рассматриваемых здесь липшицевых полуnorm.

6.4 Расстояние Монжа–Канторовича

Покажем, как обобщенные липшицевы полуnormы возникают в транспортной задаче Монжа–Канторовича. Мы приведем конструкцию функционала Монжа–Канторовича в частном случае. Более общие постановки смотри, например, в [19].

Пусть X — метрическое пространство. В этом случае (см. [21, Теорема 7.1.7, с. 85]), каждая борелевская мера μ регулярна в том смысле, что для каждого борелевского множества $B \subset X$ и любого $\varepsilon > 0$ существуют открытое множество $U \subset X$ и замкнутое множество $F \subset X$ такие, что $F \subset B \subset U$ и $|\mu|(U \setminus F) < \varepsilon$.

Напомним, что борелевская мера μ называется *радоновской* или *мерой Радона*, если для каждого борелевского множества $B \subset X$ и каждого $\varepsilon > 0$ существует такое компактное подмножество $K \subset X$, что $K \subset B$ и $|\mu|(B \setminus K) < \varepsilon$ ([21, с. 82]). Не всякая борелевская мера на метрическом пространстве является радоновой. Тем не менее, если пространство X — полное и сепарабельное (польское), то все борелевские меры — меры Радона (см. [21, Теорема 7.1.7, с. 85]).

Таким образом, в случае польского метрического пространства, в частности, для компактных метрических пространств все борелевские меры регулярны в смысле Рудина (см. рассуждения перед теоремой 6.26). Переформулируем эту теорему в случае компактных метрических пространств.

Теорема 6.29 (Рисс, см. [22]). *Пусть X — компактное метрическое пространство. Каждая борелевская комплексная мера $\mu \in \mathcal{M}$ порождает непрерывный линейный функционал $\Phi: C(X) \rightarrow \mathbb{C}$ по формуле $\Phi(f) = \int_X f d\mu$. Обратно, для каждого $\Phi \in C(X)^*$ существует единственная борелевская комплексная мера $\mu \in \mathcal{M}$ такая, что*

$$\Phi(f) = \int_X f d\mu$$

для всех $f \in C(X)$. Более того,

$$\|\Phi\| = |\mu|(X).$$

Кроме того, если для каждой вещественной неотрицательной $f \in C(X)$ число $\Phi(f)$ также вещественное неотрицательное, то μ — положительная мера.

Нам также понадобится вещественный аналог теоремы 6.29. Рассуждения про связь борелевости, регулярности и радоновости, проделанные перед этой теоремой, вместе с теоремой [21, теорема 7.10.4, с. 134], приводят к следующему результату.

Теорема 6.30 (Рисс). Пусть X — компактное метрическое пространство. Каждая (конечная) борелевская вещественная мера $\mu \in \mathcal{M}$ порождает на пространстве $C(X)$ вещественных непрерывных функций непрерывный вещественный линейный функционал $\Phi: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$ по формуле $\Phi(f) = \int_X f d\mu$. Обратно, для каждого $\Phi \in C(X)^*$ существует единственная (конечная) борелевская вещественная знакопеременная (принимающая значения в \mathbb{R}) мера $\mu \in \mathcal{M}$ такая, что

$$\Phi(f) = \int_X f d\mu$$

для всех $f \in C(X)$. Более того,

$$\|\Phi\| = |\mu|(X).$$

Кроме того, если для каждой неотрицательной $f \in C(X)$ число $\Phi(f)$ также неотрицательное, то μ — положительная мера.

До конца этого раздела X обозначает компактное метрическое пространство. Пусть $\mathcal{P}(X)$ — множество всех борелевских вероятностных мер на X (такие меры будем сокращенно называть просто вероятностными). Для любых $\lambda, \mu \in \mathcal{P}(X)$ обозначим $\Pi(\lambda, \mu)$ семейство всех борелевских вероятностных мер на $X \times X$ таких, что для любых борелевских $A, B \subset X$ и любой $\pi \in \Pi(\lambda, \mu)$ выполняется $\pi(A \times Y) = \lambda(A)$ и $\pi(X \times B) = \mu(B)$. Говорят, что такая мера π **соединяет** λ и μ . Также, благодаря транспортной интерпретации, меры π называют **транспортными планами типа** (λ, μ) .

Определим теперь отображение $K: \Pi(\lambda, \mu) \rightarrow [0, \infty]$, положив значение на π равным интегралу Лебега

$$(6.5) \quad K(\pi) = \int_{X \times X} |xy| d\pi(x, y).$$

Величина $K(\pi)$ может быть проинтерпретирована как стоимость перемещения сырья, распределение которого задается мерой λ , к потребителю, распределенному посредством меры μ . Это перемещение осуществляется с помощью плана перемещения, заданного мерой π . Здесь предполагается, что цена перемещения единицы сырья равна расстоянию, на которое оно перемещается. Впрочем, вместо функции $|xy|$ под интегралом в выражении 6.5 может стоять любая неотрицательная интегрируемая функция. Транспортная задача состоит в минимизации стоимости перемещения.

Отображение, заданное формулой 6.5, называется **функционалом Монжа–Канторовича**, а проблема поиска точной нижней грани этого функционала — **проблемой Монжа–Канторовича**. Положим

$$|\lambda\mu| = \inf_{\pi \in \Pi(\lambda, \mu)} K(\pi).$$

Напомним, что для каждой λ -интегрируемой по Лебегу функции f интеграл $\int_X f d\lambda$ часто обозначается $\lambda(f)$, что мы и будем делать. Также отметим, что все липшицевы функции интегрируемы по каждой вероятностной мере. Оказывается (см. например [24]), величину $|\lambda\mu|$ можно посчитать через липшицевы функции на X :

$$(6.6) \quad |\lambda\mu| = \sup \left\{ |\lambda(f) - \mu(f)| : L(f) \leq 1 \right\}.$$

Полученная функция на $\mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X)$ является метрикой и называется **метрикой Монжа–Канторовича**. Как мы и описали в конце раздела 6.3, определенная выше метрика Монжа–Канторовича задается с помощью обобщенной липшицевой полуnormы на C^* -алгебре $C(X)$. Кроме того, известно, что соответствующая метрическая топология является $*$ -слабой.

6.5 Упорядоченные пространства с порядковой единицей (напоминание)

Проделанные выше построения естественно переносятся на упорядоченные векторные пространства. Напомним основные понятия и конструкции теории таких пространств. В данном разделе A обозначает **вещественное** векторное пространство.

Конусом в вещественном линейном пространстве A называется каждое подмножество A , инвариантное относительно всех неотрицательных линейных комбинаций его элементов. Каждый конус $A^+ \subset A$ такой, $A^+ \cap (-A^+) = \{0\}$ порождает на A следующий частичный порядок: $a \leq b$, если и только если $b - a \in A^+$.

Ясно, $0 \in A^+$ и A^+ — это множество всех неотрицательных элементов из A . Кроме того, этот порядок инвариантен относительно сдвигов и умножения на неотрицательные числа. Более того, каждый частичный порядок, инвариантный относительно неотрицательных линейных комбинаций, задается некоторым конусом A^+ (предложение 5.4). Вещественное векторное пространство с таким частичным порядком называется **упорядоченным**.

Элемент $e \in A$ упорядоченного векторного пространства называется **порядковой единицей**, если для каждого $a \in A$ существует число $r > 0$, для которого $a \leq re$. Мы показывали (лемма 5.6), что в упорядоченном векторном пространстве с порядковой единицей сама единица всегда неотрицательна, и $A^+ - A^+ = A$ (такие порядки называются **полными**).

Порядковая единица $e \in A$ называется **архимедовой**, если для каждого $a \in A$ такого, что $re + a \geq 0$ для всех $r > 0$, выполняется $a \in A^+$. Собственный класс всех упорядоченных векторных пространств с архимедовой порядковой единицей обозначим OUS (от английского термина “order-unit space”). При этом, если мы желаем подчеркнуть, что e — порядковая единица для $A \in OUS$, будем писать $(A, e) \in OUS$. Если же из контекста понятно обозначение для порядковой единицы, будем пользоваться упрощенной записью $A \in OUS$.

На $(A, e) \in OUS$ естественно определяется норма:

$$(6.7) \quad \|a\| = \inf\{r \in \mathbb{R} : -re \leq a \leq re\}.$$

Отметим, что архимедовость порядковой единицы влечет положительную определенность $\|\cdot\|$, а без свойства архимедовости $\|\cdot\|$ является лишь полунормой (предложение 5.25). Кроме того, $\|e\| = 1$ (теорема 5.33).

Через A' будем обозначать двойственное пространство всех (вещественных) непрерывных линейных функционалов. В силу задачи 1.9, пространство A' банахово. Функционал $\mu \in A'$ называется **положительным**, если $\mu(A^+) \subset [0, \infty)$. Отметим, что положительность функционала равносильна сохранению порядка (предложение 5.9).

Положительный функционал $\mu \in A'$ такой, что $\mu(e) = 1$, называется **состоянием**.

Предложение 6.31. Функционал $\mu \in A'$ является состоянием, если и только если $\|\mu\| \leq 1$ и $\mu(e) = 1$.

Доказательство. Так как $\|e\| = 1$ и $\mu(e) = 1$, то $\|\mu\| \geq 1$. По условию, имеет место и обратное неравенство, поэтому $\|\mu\| = \mu(e)$. В силу следствия 5.31, положительность функционала $\mu \in A'$ равносильна $\|\mu\| = \mu(e)$. Следовательно, μ — положительный функционал, для которого $\mu(e) = 1$, т.е. μ — состояние. Обратно, каждое состояние удовлетворяет $\mu(e) = 1$ (по определению) и $\|\mu\| = \mu(e) = 1$ по следствию 5.31. \square

Предложение 6.32. Пространство состояний $\mathcal{S}(A)$ — выпуклое подмножество A' , являющееся хаусдорфовым компактом в $*$ -слабой топологии.

Доказательство. Хаусдорфовость пространства состояний следует из хаусдорфовости $*$ -слабой топологии (теорема 1.31). Докажем выпуклость.

Из предложения 6.31 вытекает, что $\mathcal{S}(A)$ представляет собой пересечение замкнутого единичного шара $B' = \{\mu \in A' : \|\mu\| \leq 1\}$ и аффинного гиперпространства $\Pi = \{\mu \in A' : \mu(e) = 1\}$. Так как B' — шар относительно нормы, то он — выпуклый. Гиперпространство тоже выпуклое. Таким образом, $\mathcal{S}(A)$ — выпукло как пересечение выпуклых множеств.

Наконец, докажем компактность. Шар B' компактен в $*$ -слабой топологии в силу теоремы Банаха–Алаоглу 1.33. Так как $*$ -слабая топология хаусдорфова (теорема 1.31), то шар B' замкнут в A' . Гиперпространство Π замкнуто в $*$ -слабой топологии, так как эта топология определяется как самая слабая среди которых все линейные функционалы $J_a \in A''$, $a \in A$, $J_a(\varphi) = \varphi(a)$ непрерывны. В частности, J_e — непрерывный функционал в $*$ -слабой топологии и, значит, множество $\Pi = J_e^{-1}(1) \subset A'$ — замкнуто. Таким образом, $B' \cap \Pi$ — замкнутое в $*$ -слабой топологии подмножество A' и, значит, компактное подмножество B' и, тем самым, всего A' . \square

Предложение 6.33. Пусть L — полунорма на $A \in OUS$. Для любых $\lambda, \mu \in A'$ положим

$$(6.8) \quad \rho_L(\lambda, \mu) = \sup\{|\lambda(a) - \mu(a)| : a \in A, L(a) \leq 1\}.$$

Тогда ρ_L — обобщенная метрика.

Доказательство. То, что $\rho_L \geq 0$, $\rho_L(\lambda, \lambda) = 0$ для всех $\lambda \in A'$, симметричность и неравенство треугольника проверяются непосредственно. Покажем, что ρ_L положительно определена. Предположим, что для $\lambda, \mu \in A'$

имеем $\rho_L(\lambda, \mu) = 0$. Это равносильно $\lambda(a) = \mu(a)$ для всех a таких, что $L(a) \leq 1$. Пусть $L(a) > 1$. Положим $b = a/L(a)$, тогда $L(b) = 1$ и, значит,

$$\lambda(b) = \lambda\left(\frac{a}{L(a)}\right) = \frac{\lambda(a)}{L(a)} = \mu(b) = \frac{\mu(a)}{L(a)},$$

откуда $\lambda(a) = \mu(a)$. Таким образом, $\lambda(a) = \mu(a)$ для всех $a \in A$ и, значит, $\lambda = \mu$. \square

Для дальнейшего нам понадобится аналог представления Гельфанда, полученный Кэдисоном [18] в случае упорядоченных пространств.

6.6 Представление Кэдисона

Этот раздел основан на работах [18] и [25].

Пусть K — произвольное выпуклое подмножество вещественного векторного пространства V . Функция $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ называется **аффинной**, если для любых $x, y \in K$ и каждого $t \in [0, 1]$ выполняется

$$f((1-t)x + ty) = (1-t)f(x) + tf(y).$$

Легко видеть, что линейная комбинация аффинных функций также является аффинной функцией. Пусть теперь V — топологическое векторное пространство, т.е. на V задана некоторая топология, в которой линейные комбинации непрерывны. Тогда линейные комбинации непрерывных аффинных функций на K снова непрерывны, поэтому множество $\text{Aff}(K)$ всех непрерывных аффинных функций на K образует векторное пространство. Отметим, что на $\text{Aff}(K)$ имеется естественный частичный порядок (как на пространстве функций) и что все постоянные функции лежат в $\text{Aff}(K)$.

Предложение 6.34. Пусть $K \subset V$ — выпуклое компактное подмножество топологического векторного пространства V . Тогда $\text{Aff}(K)$ — нормированное подпространство в $C(K)$ с индуцированным из $C(K)$ частичным порядком и порядковой единицей e , равной постоянной функции 1, причем порядковая единица e — архимедова.

Доказательство. Так как все функции в $\text{Aff}(K)$ ограничены в силу компактности K , то $\text{Aff}(K) \subset C(K)$ — нормированное пространство с sup -нормой.

Как мы уже отмечали выше, все постоянные функции содержатся в $\text{Aff}(K)$, в частности, $1 \in \text{Aff}(K)$. Так как каждая $f \in \text{Aff}(K)$ ограничена, $f \leq r \cdot 1$ для некоторого $r \geq 0$, а это и означает, что $e = 1$ — порядковая единица.

Докажем теперь, что порядковая единица e является архимедовой. Действительно, пусть для $f \in \text{Aff}(K)$ и каждого $r > 0$ выполняется $f + r \geq 0$, т.е. для каждого $x \in K$ имеем $f(x) + r \geq 0$ при всех $r > 0$. Но тогда и $f(x) \geq 0$ при всех x , так что $f \geq 0$. \square

Пусть $A \in \text{OVS}$, A' — двойственное пространство относительно нормы (6.7), а $S(A) \subset A'$ — пространство состояний со $*$ -слабой топологией, являющееся выпуклым хаусдорфовым компактом в силу предложения 6.32. Применим полученные выше результаты к случаю $K = S(A)$.

Следствие 6.35. Пространство $\text{Aff}(S(A))$ с sup -нормой является подпространством в $C(S(A))$ и представляет собой упорядоченное векторное пространство с архимедовой порядковой единицей $e = 1$.

Для каждого $a \in A$ рассмотрим отображение $\varkappa(a): S(A) \rightarrow \mathbb{R}$, заданное так: $\varkappa(a): f \mapsto f(a)$. Так как на $S(A)$ введена $*$ -слабая топология, каждое отображение $\varkappa(a)$ непрерывно. Кроме того, для любых $f, g \in S(A)$ и $t \in [0, 1]$ элемент $(1-t)f + tg$ содержится в $S(A)$ по предложению 6.32, и

$$\varkappa(a)((1-t)f + tg) = ((1-t)f + tg)(a) = (1-t)f(a) + tg(a) = ((1-t)\varkappa(f) + t\varkappa(g))(a),$$

так что $\varkappa(a) \in \text{Aff}(S(A))$ при каждом $a \in A$.

Предложение 6.36. Отображение $\varkappa: A \rightarrow \text{Aff}(S(A))$ линейно.

Доказательство. Для любых $a, b \in A$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ и $f \in S(A)$ имеем

$$\varkappa(\alpha a + \beta b)(f) = f(\alpha a + \beta b) = \alpha f(a) + \beta f(b) = \alpha \varkappa(a)(f) + \beta \varkappa(b)(f),$$

поэтому $\varkappa(\alpha a + \beta b) = \alpha \varkappa(a) + \beta \varkappa(b)$. \square

Предложение 6.37. *Отображение $\varkappa: A \rightarrow \text{Aff}(\mathcal{S}(A))$ инъективно.*

Доказательство. Предположим противное, т.е. существуют $a, b \in A$ такие, что $\varkappa(a) = \varkappa(b)$. Тогда для любого $f \in \mathcal{S}(A)$ имеем $f(a) = f(b)$, т.е. $f(a - b) = 0$ для всех состояний f . Однако, в силу предложения 5.20, имеем $a - b = 0$, и полученное противоречие завершает доказательство. \square

Предложение 6.38. *Отображение $\varkappa: A \rightarrow \text{Aff}(\mathcal{S}(A))$ является порядковым изоморфизмом (т.е. \varkappa и ему обратное, определенное на образе \varkappa , сохраняют порядки). Более того, если e_A — порядковая единица в A , то $\varkappa(e_A)$ — порядковая единица в $\text{Aff}(\mathcal{S}(A))$, т.е. \varkappa — унитарный порядковый изоморфизм.*

Доказательство. Так как $\mathcal{S}(A)$ состоит из положительных линейных функционалов f , то для $a, b \in A$, $a \leq b$, если и только если $f(a) \leq f(b)$. Последнее означает, что $a \leq b$ равносильно $\varkappa(a)(f) \leq \varkappa(b)(f)$ для любого $f \in \mathcal{S}(A)$, т.е. $\varkappa(a) \leq \varkappa(b)$. Этим доказано, что \varkappa — порядковый изоморфизм.

Далее, по определению состояния, для каждого $f \in \mathcal{S}(A)$ выполняется $f(e_A) = 1$, т.е. $\varkappa(e_A)(f) = f(e_A) = 1$ для всех f , поэтому $\varkappa(e_A)$ — порядковая единица в $\text{Aff}(\mathcal{S}(A))$. Доказательство закончено. \square

Так как нормы на упорядоченных векторных пространствах с порядковыми единицами задаются в терминах порядков, мгновенно заключаем

Следствие 6.39. *Построенное выше отображение $\varkappa: A \rightarrow \text{Aff}(\mathcal{S}(A))$ является линейным изометричным вложением, если на $\text{Aff}(\mathcal{S}(A))$ задавать расстояние с помощью порядковой нормы.*

Следующее почти очевидное предложение имеет важное следствие.

Предложение 6.40. *Пусть $C(K)$ — пространство вещественных непрерывных функций на хаусдорфовом компакте K . Тогда $\text{sup-норма } \|\cdot\|_\infty$ совпадает с порядковой нормой, заданной стандартным частичным порядком: $f \leq g$, если и только если $f(x) \leq g(x)$ для всех $x \in K$.*

Доказательство. По определению порядковой нормы, для $f \in C(K)$ имеем

$$\|f\| = \inf\{r \in \mathbb{R} : -r \cdot 1 \leq f(x) \leq r \cdot 1, x \in K\} = \sup\{|f(x)| : x \in K\} = \|f\|_\infty,$$

что и требовалось. \square

Следствие 6.41. *Построенное выше отображение $\varkappa: A \rightarrow \text{Aff}(\mathcal{S}(A))$ является изометричным вложением пространства A с порядковой нормой в пространство $\text{Aff}(\mathcal{S}(A))$ с sup-нормой . Иными словами, для каждого $a \in A$ имеем*

$$\|a\| = \sup_{f \in \mathcal{S}(A)} |f(a)|.$$

Отображение \varkappa называется **представлением Кэдисона**. Оно позволяет рассматривать каждое упорядоченное вещественное пространство с архимедовой порядковой единицей как линейное подпространство в вещественном векторном пространстве $\text{Aff}(K) \subset C(K)$, состоящем из всех аффинных функций на выпуклом хаусдорфовом компактном подмножестве K некоторого вещественного топологического векторного пространства. Как и в случае с представлением Гельфанда, представление Кэдисона позволяет извлекать разные нетривиальные результаты относительно упорядоченных вещественных векторных пространств из соответствующих результатов о пространствах вещественных функций с sup-нормой .

Соглашение 6.42. По аналогии с тем, как мы это делали в случае с представлением Гельфанда, для каждого $a \in A$ функцию $\varkappa(a) \in \text{Aff}(\mathcal{S}(A))$ будем также обозначать \hat{a} .

6.7 Компактные квантовые метрические пространства

Обсудим теперь конструкцию квантового метрического пространства, введенную Риффелем [7]. В ней, вместо исходного вещественного пространства самосопряженных элементов C^* -алгебры, выступает вещественное пространство A с частичным порядком и архимедовой порядковой единицей. Этот порядок и порядковая единица задают норму. Положительный конус A^+ , порождающий частичный порядок, служит аналогом положительных самосопряженных элементов. Последнее позволяет определить на этом пространстве положительные вещественные функционалы и состояния — такие функционалы с единичной нормой (сравните с определением состояний на C^* -алгебре). На множестве $\mathcal{S}(A)$ всех состояний вводится $*$ -слабая топология, в которой

$\mathcal{S}(A)$ является компактом (теорема Алаоглу). Далее показывается, что эту топологию можно задать с помощью метрики на вещественно-двойственном к A пространстве A' , причем эта метрика порождается с помощью липшицевой полуноормы L на A . Собственно, эти метрические пространства и будут играть основную роль в изложении. Впрочем, Риффель предпочитает называть квантовыми метрическими пространствами не метрические компакты $\mathcal{S}(A)$, а пары (A, L) . Отметим, что таким образом у Риффеля возникают **компактные** квантовые метрические пространства. Латремольер [23] предложил обобщение конструкции Риффеля на более широкий класс квантовых метрических пространств.

6.7.1 Липшицева полуноорма на упорядоченном пространстве

Определение 6.43. Пусть $(A, e) \in \mathcal{OUS}$. *Липшицевой полуноормой* на A назовем полуноорму $L: A \rightarrow [0, \infty)$, удовлетворяющую следующему свойству: для каждого $a \in A$ условие $L(a) = 0$ равносильно $a \in \mathbb{R}e = \{\alpha e : \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Замечание 6.44. Стоит отличать липшицеву полуноорму из определения 6.43 от обобщенной липшицевой полуноормы, введенной для метрических пространств по формуле (6.2).

Пусть L — липшицева полуноорма на $(A, e) \in \mathcal{OUS}$. Определим $\rho_L: A' \times A' \rightarrow [0, \infty]$ по формуле (6.8):

$$\rho_L(\lambda, \mu) = \sup \left\{ |\lambda(a) - \mu(a)| : a \in A, L(a) \leq 1 \right\}.$$

По предложению 6.33, ρ_L является обобщенной метрикой, в частности, ρ_L может, вообще говоря, принимать на $\mathcal{S}(A)$ бесконечные значения.

Замечание 6.45. Отметим, что если $\lambda(e) \neq \mu(e)$, то $\rho_L(\lambda, \mu) = \infty$, так как в качестве $a \in A$ в формуле (6.8) можно брать всевозможные re , $r \in \mathbb{R}$. Таким образом, отображение ρ_L может быть конечным лишь на аффинных подпространствах $\{\lambda \in A' : \lambda(e) = \text{const}\}$. Положим

$$A'^{\circ} = \ker J_e = \{\lambda \in A' : \lambda(e) = 0\}.$$

Тогда все аффинные подпространства $\{\lambda \in A' : \lambda(e) = \text{const}\}$ получаются из A'° сдвигом на некоторый вектор $\nu \in A'$, и если $\lambda, \mu \in A'^{\circ}$, то $\lambda + \nu, \mu + \nu \in \nu + A'^{\circ}$ и $\rho_L(\lambda + \nu, \mu + \nu) = \rho_L(\lambda, \mu)$, т.е. такие сдвиги на ν сохраняют расстояние ρ_L . Таким образом, достаточно описать ρ_L на A'° .

Предложение 6.46. Для любого $a \in A$ и произвольных $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ имеем

$$|\lambda(a) - \mu(a)| \leq L(a)\rho_L(\lambda, \mu).$$

Доказательство. Действительно, по определению,

$$\rho_L(\lambda, \mu) = \sup \left\{ |\lambda(a) - \mu(a)| : a \in A, L(a) \leq 1 \right\},$$

поэтому для каждого $a \in A$, $L(a) \leq 1$ выполняется

$$|\lambda(a) - \mu(a)| \leq \rho_L(\lambda, \mu).$$

Пусть теперь $L(a) > 1$. Положим $b = a/L(a)$, тогда

$$|\lambda(a) - \mu(a)| = |L(a)\lambda(b) - L(a)\mu(b)| = L(a)|\lambda(b) - \mu(b)| \leq L(a)\rho_L(\lambda, \mu),$$

что и требовалось. □

6.7.2 Лір-норма

Определение 6.47. Для $(A, e) \in \mathcal{OUS}$ назовем *Лір-нормой* каждую липшицеву полуноорму L , удовлетворяющую следующему условию: обобщенная метрика $\rho_L: A' \times A' \rightarrow [0, \infty]$, заданная формулой (6.8), т.е.

$$(6.9) \quad \rho_L(\lambda, \mu) = \sup \left\{ |\lambda(a) - \mu(a)| : a \in A, L(a) \leq 1 \right\},$$

порождает *-слабую топологию на A' .

Замечание 6.48. Термин Лір-норма является традиционным и активно используется в цитированных выше работах Риффеля. Тем не менее, следует помнить, что в действительности Лір-норма является **полунормой**, а использование термина норма — лишь дань традиции.

Предложение 6.49. Пусть L — произвольная Лір-норма на A , тогда ρ_L — метрика на $\mathcal{S}(A)$.

Доказательство. То, что ρ_L — обобщенная метрика вытекает из предложения 6.33. Покажем теперь, что ρ_L — метрика, т.е. что она — конечна.

Предположим противное, т.е. существуют $\lambda_0, \mu_0 \in \mathcal{S}(A)$ такие, что $\rho_L(\lambda_0, \mu_0) = \infty$. Тогда множество $Y = \{\lambda \in \mathcal{S}(A) : \rho_L(\lambda, \mu_0) < \infty\}$ непусто (содержит, например, μ_0) и не совпадает с $\mathcal{S}(A)$. С другой стороны, Y открыто (так как равно объединению открытых шаров с центром в μ_0) и замкнуто, так как $\mathcal{S}(A) \setminus Y$ непусто ($\lambda_0 \notin Y$) и, в силу неравенства треугольника, для каждого $\lambda' \in \mathcal{S}(A) \setminus Y$, конечного $r > 0$ и $\lambda \in U_r(\lambda')$ выполняется

$$\rho_L(\lambda, \mu_0) \geq \rho_L(\lambda', \mu_0) - \rho_L(\lambda', \lambda) = \infty,$$

так что $U_r(\lambda') \subset \mathcal{S}(A) \setminus Y$. Таким образом, если ρ_L не является метрикой на $\mathcal{S}(A)$, то $\mathcal{S}(A)$ несвязно. Но, в силу предложения 6.32, пространство $\mathcal{S}(A)$ выпукло и, значит, связно, так что полученное противоречие завершает доказательство. \square

Определение 6.50. **Компактным квантовым метрическим пространством** называется каждая пара (A, L) , где $A \in \mathcal{OUS}$, а L — это Лір-норма на A . Семейство всех компактных квантовых метрических пространств обозначим \mathcal{CQ} (от “compact quantum”).

Прежде чем переходить к изучению компактных квантовых метрических пространств, приведем ряд полезных для дальнейшего результатов о пространствах, в которых полунормы L липшицевы, т.е. не требуется, чтобы липшицева полунорма порождала *-слабую топологию на пространстве состояний.

6.8 Пространства с липшицевыми полунормами

Для $(A, e) \in \mathcal{OUS}$ пусть \tilde{A} обозначает факторпространство $A/(\mathbb{R}e)$ и $\pi: A \rightarrow \tilde{A}$ — каноническую проекцию. Рассмотрим на A произвольную липшицеву полунорму L , и пусть L^\sim — полученная из L фактор-полунорма на \tilde{A} (см. определение 6.7 и теорему 6.6, гарантирующую, что L^\sim — полунорма, так как получена из полунормы L). Также обозначим $\|\cdot\|^\sim$ полунорму на \tilde{A} , полученную из порядковой нормы на A .

Предложение 6.51. Полунорма $\|\cdot\|^\sim$ является нормой.

Доказательство. Заметим сначала, что как пространство $\mathbb{R}e$, так и все его сдвиги, т.е. $\pi^{-1}(b)$ для всех $b \in \tilde{A}$, — полные относительно индуцированной нормы в силу их конечномерности. Далее, предположим противное, т.е. существует ненулевой $b \in \tilde{A}$, для которого $\|b\|^\sim = 0$. По определению фактор-полунормы, существует последовательность $a_i \in \pi^{-1}(b)$, для которой $\|a_i\| \rightarrow 0$. Но тогда последовательность a_i фундаментальна и, в силу полноты пространства $\pi^{-1}(b)$, сходится к некоторому $a \in \pi^{-1}(b)$. Из непрерывности нормы, $\|a\| = 0$, поэтому $a = 0$ и, значит, $b = \pi(a) = 0$, противоречие. \square

Далее, покажем, что ограничение на диаметр пространства состояний относительно расстояния ρ_L , заданного липшицевой полунормой L , равносильно неравенству, связывающему норму элементов факторпространства $A/(\mathbb{R}e)$ и значения L на этих элементах.

Теорема 6.52. Пусть $A \in \mathcal{OUS}$ и L — произвольная липшицева полунорма на A . Тогда для каждого положительного $r \in \mathbb{R}$ следующие условия эквивалентны:

- (1) для всех $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ выполняется $\rho_L(\lambda, \mu) \leq 2r$;
- (2) для всех $b \in \tilde{A}$ имеем $\|b\|^\sim \leq r L^\sim(b)$.

Доказательство. Докажем сначала две леммы.

Лемма 6.53. Условие $\rho_L(\lambda, \mu) \leq 2r$ для всех $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ равносильно

$$(6.10) \quad |\lambda(a) - \mu(a)| \leq 2r L(a)$$

для всех $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ и всех $a \in A$.

Доказательство. Пусть $\rho_L(\lambda, \mu) \leq 2r$ для всех $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$. Тогда, по предложению 6.46, имеем

$$|\lambda(a) - \mu(a)| \leq L(a)\rho_L(\lambda, \mu) \leq 2rL(a).$$

Обратно, если $|\lambda(a) - \mu(a)| \leq 2rL(a)$ для всех $a \in A$ и любых $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$, то $|\lambda(a) - \mu(a)| \leq 2r$ для всех a таких, что $L(a) \leq 1$, откуда

$$\rho_L(\lambda, \mu) = \sup\{|\lambda(a) - \mu(a)| : a \in A, L(a) \leq 1\} \leq 2r.$$

Доказательство закончено. \square

Лемма 6.54. Пусть $\pi: A \rightarrow \tilde{A}$ — каноническая проекция. Тогда для любого $b \in \tilde{A}$ существуют $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ такие, что для каждого $a \in \pi^{-1}(b)$ выполняется

$$\mu(a) = \max\{\nu(a) : \nu \in \mathcal{S}(A)\}, \quad \lambda(a) = \min\{\nu(a) : \nu \in \mathcal{S}(A)\}, \quad \|b\|^\sim = \frac{\mu(a) - \lambda(a)}{2}.$$

Доказательство. Для каждого $a \in A$ положим $\alpha(a) = \sup\{r \in \mathbb{R} : re \leq a\}$ и $\beta(a) = \inf\{r \in \mathbb{R} : a \leq re\}$. По теореме 5.18, величины $\alpha := \alpha(a)$ и $\beta := \beta(a)$ конечны и $\alpha \leq \beta$. По следствию 5.19, для любого $a \in A$ выполняется

$$[\alpha, \beta] = \{\lambda(a) : \lambda \in \mathcal{S}(A)\},$$

а по предложению 5.24, $\|a\| = \max\{|\alpha|, |\beta|\}$. Поэтому для любого $s \in \mathbb{R}$ и $\alpha_s := \alpha(a + se)$, $\beta_s := \beta(a + se)$ имеем

$$[\alpha_s, \beta_s] = \{\lambda(a + se) : \lambda \in \mathcal{S}(A)\} = \{\lambda(a) : \lambda \in \mathcal{S}(A)\} + s = [\alpha + s, \beta + s]$$

и $\|a + se\| = \max\{|\alpha + s|, |\beta + s|\}$. Иными словами, $\|a + se\|$ равно расстоянию от $0 \in \mathbb{R}$ до наиболее удаленного от 0 конца отрезка $s + [\alpha, \beta]$.

Выберем теперь в качестве a любой элемент из $\pi^{-1}(b)$, тогда

$$\|b\|^\sim = \inf_{s \in \mathbb{R}} \|a + se\| = \inf_{s \in \mathbb{R}} \max\{|\alpha + s|, |\beta + s|\} = \frac{\beta - \alpha}{2},$$

так как при всевозможных сдвигах отрезка $[\alpha, \beta]$ на s наиболее удаленный конец сдвинутого отрезка находится на минимальном расстоянии, если и только если середина этого отрезка совмещена с 0, и тогда это расстояние равно половине длины отрезка.

Напомним, что $\mathcal{S}(A)$ со $*$ -слабой топологией является компактом, причем эта топология индуцируется из $*$ -слабой топологии на всем A' , а в этой топологии отображения $J_a: A' \rightarrow \mathbb{R}$, $J_a(\lambda) = \lambda(a)$ непрерывны. Поэтому существуют $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$, для которых $\alpha = \min\{\nu(a) : \nu \in \mathcal{S}(A)\} = \lambda(a)$ и $\beta = \max\{\nu(a) : \nu \in \mathcal{S}(A)\} = \mu(a)$, откуда, в силу леммы 6.53,

$$\|b\|^\sim = \frac{\mu(a) - \lambda(a)}{2},$$

что и требовалось. \square

Вернемся к доказательству теоремы. Пусть выполняется условие (1). Пользуясь леммой 6.54, выберем $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$, для которых $\|b\|^\sim = \frac{\lambda(a) - \mu(a)}{2}$ для каждого $a \in \pi^{-1}(b)$. По лемме 6.53, $|\lambda(a) - \mu(a)| \leq 2rL(a)$, откуда

$$\|b\|^\sim = \frac{|\lambda(a) - \mu(a)|}{2} \leq \frac{2rL(a)}{2} = rL(a).$$

С другой стороны, так как для любого $t \in \mathbb{R}$ выполняется $\lambda(a + te) - \mu(a + te) = \lambda(a) - \mu(a)$, то неравенство $\|b\|^\sim \leq rL(a)$ выполняется для любого $a \in \pi^{-1}(b)$, в частности,

$$\|b\|^\sim \leq \inf\{rL(a) : a \in \pi^{-1}(b)\} = rL^\sim(b).$$

Тем самым, мы показали, что условие (1) теоремы влечет условие (2).

Обратно, пусть выполняется условие (2), т.е. $\|b\|^\sim \leq rL^\sim(b)$ для всех $b \in \tilde{A}$. Выберем произвольные $\lambda', \mu' \in \mathcal{S}(A)$. В силу леммы 6.53, достаточно показать, что $|\lambda'(a) - \mu'(a)| \leq 2rL(a)$ для всех $a \in A$. Выберем любое $a \in A$ и пусть $b = \pi(a)$. Без ограничения общности будем считать, что $\lambda'(a) \leq \mu'(a)$. По лемме 6.54, существуют $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ такие, что $\lambda(a) \leq \lambda'(a) \leq \mu'(a) \leq \mu(a)$ и $\|b\|^\sim = (\mu(a) - \lambda(a))/2$. Но тогда

$$|\lambda'(a) - \mu'(a)| = \mu'(a) - \lambda'(a) \leq \mu(a) - \lambda(a) = 2\|b\|^\sim \leq 2rL^\sim(b) \leq 2rL(a),$$

где последнее неравенство вытекает из определения L^\sim . Доказательство теоремы закончено. \square

Предложение 6.55. *Обозначим $D_2 \subset A^\circ$ замкнутый шар (относительно ограничения на A° двойственной нормы) с центром в нуле и радиусом 2. Тогда*

$$D_2 = \{\lambda - \mu : \lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)\}.$$

Доказательство. По определению состояния, $\|\lambda\| = \lambda(e) = 1$ и $\|\mu\| = \mu(e) = 1$, где e — порядковая единица в A , поэтому $(\lambda - \mu)(e) = \lambda(e) - \mu(e) = 0$, так что $\lambda - \mu \in A^\circ$, и $\|\lambda - \mu\| \leq \|\lambda\| + \|\mu\| = 2$, поэтому $\lambda - \mu \in D_2 \subset A^\circ$.

Обратно, пусть $\nu \in D_2$. Если $\nu = 0$, то для каждого $\lambda \in \mathcal{S}(A)$ имеем $\nu = \lambda - \lambda$. Пусть теперь $\nu \neq 0$, тогда $\|\nu\| > 0$. Для краткости, положим $K = \mathcal{S}(A)$ и рассмотрим представление Кэдисона $\varkappa: A \rightarrow \text{Aff}(K) \subset C(K)$, тогда ν , в силу следствия 6.41, можно рассматривать как непрерывный линейный функционал на $\varkappa(A) \subset C(K)$. По теореме Хана–Банаха 1.11, функционал ν продолжается до непрерывного линейного функционала ν' на все $C(K)$ с той же нормой. По теореме 6.30, функционал ν' можно рассматривать как вещественную (знакопеременную) меру на K , для которой полная вариация $|\nu'|$ равна ее норме $\|\nu'\|$. Так как $\nu \in A^\circ$, то $\nu(e) = 0$. Так как \varkappa — изометричный унитарный изоморфизм с образом, а ν' — продолжение ν , то $\nu'(1) = 0$.

По теореме 4.64, вещественная мера ν' представима в виде разности положительных вещественных мер λ' и μ' , т.е. $\nu' = \lambda' - \mu'$, причем

$$\|\nu'\| = |\nu'| = |\lambda'| + |\mu'| = \|\lambda'\| + \|\mu'\|.$$

Так как $\nu'(1) = 0$, то $\lambda'(1) = \mu'(1)$. Кроме того, для положительных мер λ' и μ' выполняется $\|\lambda'\| = \lambda'(1)$ и $\|\mu'\| = \mu'(1)$, откуда $\|\lambda'\| = \|\mu'\| = \|\nu'\|/2 \leq 1$.

Положим

$$\lambda = \varkappa'(\lambda') = \lambda' \circ \varkappa = \lambda'|_{\varkappa(A)} \circ \varkappa \quad \text{и} \quad \mu = \varkappa'(\mu') = \mu' \circ \varkappa = \mu'|_{\varkappa(A)} \circ \varkappa,$$

где $\varkappa': C(K)' \rightarrow A'$ — двойственное отображение. Так как \varkappa — изоморфизм с образом и λ', μ' — положительные функционалы, то $\lambda, \mu \in A'$ — также положительные функционалы. Так как \varkappa — изометрия с образом, то $\|\lambda\| = \|\lambda'|_{\varkappa(A)}\|$ и $\|\mu\| = \|\mu'|_{\varkappa(A)}\| = \|\mu'\|$. Поскольку λ' и μ' определены на большем пространстве, чем их ограничения $\lambda'|_{\varkappa(A)}$ и $\mu'|_{\varkappa(A)}$, то

$$\|\lambda\| \leq \|\lambda'\| \quad \text{и} \quad \|\mu\| \leq \|\mu'\|.$$

Но $e \in A$, поэтому, в силу предложения 5.29, имеем $\|\lambda\| = \lambda(e)$ и $\|\mu\| = \mu(e)$. Но тогда, в силу унитарности \varkappa , заключаем, что $\|\lambda\| = \lambda(e) = \lambda'(1) = \|\lambda'\|$ и, аналогично, $\|\mu\| = \|\mu'\|$. В частности, $\|\lambda\| = \|\mu\|$. Таким образом, если мы покажем, что $\|\lambda'\| = \|\mu'\| = 1$, то отсюда мгновенно выведем $\|\lambda\| = \|\mu\| = 1$ и, значит, $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$.

Предположим противное, тогда $0 < \|\lambda\| = \|\mu\| < 1$. Положим $t = \|\lambda\|$, $\bar{\lambda} = \lambda/t$ и $\bar{\mu} = \mu/t$, тогда $\bar{\lambda}, \bar{\mu} \in \mathcal{S}(A)$. Кроме того,

$$\nu = t\bar{\lambda} - t\bar{\mu} = \bar{\lambda} - (t\bar{\mu} + (1-t)\bar{\lambda}).$$

Так как $\mathcal{S}(A)$ выпукло в силу предложения 6.32, то $t\bar{\mu} + (1-t)\bar{\lambda} \in \mathcal{S}(A)$, и мы снова получили искомое представление. Доказательство закончено. \square

Пусть $A \in \mathcal{OUS}$ и L — липшицева полунорма на A . Зададим двойственную обобщенную полунорму L' на A' , порожденную L , стандартным образом:

$$L'(\lambda) = \sup\{|\lambda(a)| : a \in A, L(a) \leq 1\}.$$

Замечание 6.56. По предложению 6.33, функция $\rho_L: A' \times A' \rightarrow [0, \infty]$, заданная формулой (6.8), является обобщенной метрикой. Непосредственно из определений для ρ_L и L' вытекает, что имеет место следующее соотношение:

$$\rho_L(\lambda, \mu) = L'(\lambda - \mu).$$

Предложение 6.57. *Для $\lambda \in A'$, $\lambda \notin A'^\circ$ имеем $L'(\lambda) = \infty$.*

Доказательство. Если $\lambda \notin A'^\circ$, то $\lambda(e) \neq 0$. Так как для любого $r \in \mathbb{R}$ выполняется $L(re) = 0$, то $L'(\lambda) \geq |\lambda(re)| = |r| \cdot |\lambda(e)|$, откуда, устремляя r к бесконечности, получаем требуемое. \square

Теорема 6.58. *Пусть $A \in \mathcal{OUS}$ и L — липшицева полунорма на A , а L' — двойственная обобщенная полунорма, порожденная L . Пусть $\|\cdot\|'$ обозначает двойственную норму на A' . Тогда следующие утверждения эквивалентны:*

- (1) для любых $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ имеем $\rho_L(\lambda, \mu) \leq 2r$;

(2) для любого $\lambda \in A^\circ$ выполняется $L'(\lambda) \leq r \|\lambda\|'$.

Доказательство. Пусть сначала верно первое условие. Выберем произвольное $\lambda \in A^\circ$ и докажем выполнение второго условия. Если $\lambda = 0$, то второе условие верно. Если же $\lambda \neq 0$, то второе условие равносильно $L'(\nu) \leq 2r$ для всякого $\nu \in A^\circ$, $\|\nu\|' = 2$. Напомним (замечание 6.56), что $\rho_L(\lambda, \mu) = L'(\mu - \lambda)$ для $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$, а также что, по предложению 6.55, шар $D_2 \subset A^\circ$ радиуса 2 с центром в нуле (относительно двойственной нормы) состоит из всех разностей $\lambda - \mu$, $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$. Таким образом, для ν существуют $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ такие, что $\nu = \lambda - \mu$, откуда

$$L'(\nu) = L'(\lambda - \mu) = \rho_L(\lambda, \mu) \leq 2r.$$

Тем самым, мы доказали выполнение второго условия.

Обратно, пусть выполняется второе условие предложения. Тогда достаточно показать, что для произвольных $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ имеет место $L'(\lambda - \mu) \leq 2r$. Положим $\nu = \lambda - \mu$, тогда все такие ν — это в точности точки из D_2 , см. выше. Если $\nu = 0$, то условие выполняется. Пусть теперь $\nu \neq 0$. Пользуясь сформулированной выше эквивалентностью, второе условие влечет $L'(\nu) \leq 2r$ для каждого $\nu \in A^\circ$, $\|\nu\| = 2$. В силу положительной однородности полунормы, для каждого $\alpha \in [0, 1]$ выполняется

$$L'(\alpha\nu) = \alpha L'(\nu) \leq L'(\nu) \leq 2r,$$

поэтому неравенство $L'(\nu) \leq 2r$ выполняется и для всех $\nu \in D_2$, что и требовалось. \square

Следствие 6.59. Пусть $A \in \text{OUS}$ и L — произвольная липшицева полунорма на A . Тогда для каждого положительного $r \in \mathbb{R}$, следующие условия эквивалентны:

- (1) для всех $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ выполняется $\rho_L(\lambda, \mu) \leq 2r$;
- (2) для всех $\lambda \in A^\circ$ выполняется $L'(\lambda) \leq r \|\lambda\|'$;
- (3) для всех $b \in \tilde{A}$ имеем $\|b\| \sim \leq r L^\sim(b)$.

6.8.1 Липшицева топология и *-слабая топология

Обсудим связь *-слабой топологии на пространстве состояний с топологией, заданной с помощью липшицевой полунормы. Последнюю топологию будем называть *липшицевой*.

Предложение 6.60. Пусть L — липшицева полунорма на $A \in \text{OUS}$. Топология, порожденная ρ_L на $\mathcal{S}(A)$, содержит *-слабую топологию, т.е. является более тонкой.

Доказательство. Нам понадобится следующая лемма.

Лемма 6.61. Пусть X — произвольное множество, \mathcal{F} — семейство отображений $f: X \rightarrow \mathbb{F}$, и τ — самая слабая топология на X , в которой все $f \in \mathcal{F}$ непрерывны. Пусть $Y \subset X$ — подпространство в X , т.е. его топология τ_Y индуцирована из τ . Обозначим \mathcal{F}' ограничения всех $f \in \mathcal{F}$ на Y . Обозначим τ' самую слабую топологию на Y , в которой все отображения $g \in \mathcal{F}'$ непрерывны. Тогда $\tau' = \tau_Y$.

Доказательство. Обозначим $\tau_{\mathbb{F}}$ стандартную топологию на \mathbb{F} . Отметим, что предбаза топологии τ — это $\mathcal{S} = \{f^{-1}(U) : U \in \tau_{\mathbb{F}}, f \in \mathcal{F}\}$. Далее, предбаза τ_Y — это $\{Y \cap V : V \in \mathcal{S}\}$, а предбаза для τ' — это

$$\{g^{-1}(U) : U \in \tau_{\mathbb{F}}, g \in \mathcal{F}'\} = \{Y \cap f^{-1}(U) : U \in \tau_{\mathbb{F}}, f \in \mathcal{F}\} = \{Y \cap V : V \in \mathcal{S}\},$$

что и требовалось. \square

Из леммы 6.61 вытекает, что для доказательства предложения достаточно показать непрерывность для всех $a \in A$ функционалов $J_a: \mathcal{S}(A) \rightarrow \mathbb{R}$, $J_a(\lambda) = \lambda(a)$ в топологии, порожденной ρ_L (напомним, что *-слабая топология — это слабая из всех топологий, в которой все эти функционалы непрерывны). Выберем произвольный $\lambda \in \mathcal{S}(A)$, любое $\varepsilon > 0$ и покажем, что существует $\delta > 0$ такое, что для всякого $\mu \in \mathcal{S}(A)$, $\rho_L(\lambda, \mu) < \delta$ вытекает $|J_a(\lambda) - J_a(\mu)| < \varepsilon$. Последнее равносильно $|\lambda(a) - \mu(a)| < \varepsilon$. Условие $\rho_L(\lambda, \mu) < \delta$ эквивалентно $\sup\{|\lambda(b) - \mu(b)| : L(b) \leq 1\} < \delta$. Если $L(a) \leq 1$, то можно положить $\delta = \varepsilon$, так как

$$|\lambda(a) - \mu(a)| \leq \sup\{|\lambda(b) - \mu(b)| : L(b) \leq 1\} < \delta = \varepsilon.$$

Пусть теперь $L(a) > 1$. Положим $c = a/L(a)$ и $\delta = \varepsilon/L(a)$, тогда $L(c) = 1$ и

$$|\lambda(a) - \mu(a)| = L(a)|\lambda(c) - \mu(c)| < L(a)\delta = L(a)\frac{\varepsilon}{L(a)} = \varepsilon.$$

Доказательство закончено. \square

6.8.2 Критерий совпадения липшицевой и *-слабой топологий

Выясним, когда липшицева полунорма L превращается в Лип-норму, т.е. когда ρ_L задает *-слабую топологию на $\mathcal{S}(A)$. Для доказательства соответствующей теоремы напомним теорему Арцела–Асколи в нужной нам упрощенной форме. Семейство функций $\mathcal{F} \subset C(X)$ на метрическом пространстве X называется **равномерно ограниченным**, если существует положительное $M \in \mathbb{R}$ такое, что $|f(x)| < M$ для всех $x \in X$ и $f \in \mathcal{F}$. Семейство $\mathcal{F} \subset C(X)$ называется **равностепенно непрерывным**, если для каждого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ для всех $f \in \mathcal{F}$, как только $|xy| < \delta$.

Теорема 6.62 (теорема Арцела–Асколи, [22]). *Пусть X — компактное метрическое пространство и $\mathcal{F} \subset C(X)$ — равномерно ограниченное и равностепенно непрерывное семейство. Тогда \mathcal{F} вполне ограничено в топологии на $C(X)$, заданной \sup -нормой.*

Теорема 6.63. *Пусть L — липшицева полунорма $A \in \text{OUS}$. Тогда ρ_L задает *-слабую топологию на $\mathcal{S}(A)$, если и только если*

- (1) множество $\mathcal{S}(A)$ ограничено относительно ρ_L , и
- (2) множество $\mathcal{B}_1 := \{a \in A : L(a) \leq 1, \|a\| \leq 1\}$ вполне ограничено по отношению к норме $\|\cdot\|$.

Доказательство. Пусть ρ_L задает *-слабую топологию на $\mathcal{S}(A)$, т.е. L является Лип-нормой, а ρ_L , в силу предложения 6.49, — метрикой. По предложению 6.32, $\mathcal{S}(A)$ с такой топологией компактно. Так как эта топология задается ρ_L , то ρ_L непрерывно и, значит, ограничено в силу компактности $\mathcal{S}(A)$.

Рассмотрим теперь элементы $a \in \mathcal{B}_1$ как линейные функционалы $J_a: \mu \mapsto \mu(a)$ на A' (см. обсуждение после следствия 1.12). Эти функционалы непрерывны в топологии, заданной нормой, и J является изометричным вложением A в A'' . Так как для любых $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ и любого $a \in A$, $L(a) \leq 1$, в частности, для любого $a \in \mathcal{B}_1$ выполняется

$$|J_a(\lambda) - J_a(\mu)| = |\lambda(a) - \mu(a)| \leq \rho_L(\lambda, \mu),$$

то семейство функционалов $\{J_a\}_{a \in \mathcal{B}_1}$ равностепенно непрерывно. Так как отображение J изометрично (относительно расстояния, заданного нормами), а \mathcal{B}_1 содержится в единичном шаре относительно нормы, то семейство $\{J_a\}_{a \in \mathcal{B}_1}$ равномерно ограничено. Тогда, по теореме 6.62, семейство $\{J_a\}_{a \in \mathcal{B}_1}$ вполне ограничено в $C(\mathcal{S}(A))$, наделенном \sup -нормой.

Напомним, что через $\text{Aff}(\mathcal{S}(A)) \subset C(\mathcal{S}(A))$ мы обозначили пространство всех непрерывных аффинных функций, а через $\varkappa: A \rightarrow \text{Aff}(\mathcal{S}(A))$ — представление Кэдисона, сопоставляющее каждому $a \in A$ ограничение отображения J_a на $\mathcal{S}(A)$. По следствию 6.41, отображение \varkappa — изометричное вложение A в $\text{Aff}(\mathcal{S}(A))$, где расстояние в A задается нормой, а в $\text{Aff}(\mathcal{S}(A))$ — \sup -нормой, т.е. индуцируется из $C(\mathcal{S}(A))$. Следовательно, \mathcal{B}_1 , как и его образ $\{J_a\}_{a \in \mathcal{B}_1}$ в $C(\mathcal{S}(A))$, — вполне ограничены.

Обратно, пусть $\mathcal{S}(A)$ ограничено относительно ρ_L и \mathcal{B}_1 вполне ограничено относительно $\|\cdot\|$. Мы должны показать, что ρ_L задает *-слабую топологию на $\mathcal{S}(A)$. По предложению 6.60, топология, заданная ρ_L содержит *-слабую топологию. Докажем обратное включение. Для этого выберем произвольное $\mu \in \mathcal{S}(A)$, любое $\varepsilon > 0$ и покажем, что открытый шар $U_\varepsilon(\mu)$ в $\mathcal{S}(A)$ в метрике ρ_L содержит некоторую *-слабую окрестность μ .

Пусть r таково, что $\rho_L(\lambda, \mu) \leq 2r$ для всех $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$. По теореме 6.52, для каждого $b \in \tilde{A}$ выполняется $\|b\| \sim \leq r L^\sim(b)$. Положим

$$\mathcal{B}_r = \{a \in A : \|a\| \leq r, L(a) \leq 1\} \text{ и } \mathcal{B}^L = \{a \in A : L(a) \leq 1\}.$$

Лемма 6.64. *Пусть $\pi: A \rightarrow \tilde{A} = A/(\mathbb{R}e)$ — каноническая проекция, тогда $\pi(\mathcal{B}_r) = \pi(\mathcal{B}^L)$.*

Доказательство. Так как $\mathcal{B}_r \subset \mathcal{B}^L$, то $\pi(\mathcal{B}_r) \subset \pi(\mathcal{B}^L)$. Докажем обратное включение. Пусть $b \in \pi(\mathcal{B}^L)$, тогда $L^\sim(b) \leq 1$ и $\|b\| \sim \leq r L^\sim(b) \leq r$.

Лемма 6.65. Для любого $b \in \tilde{A}$ существует единственный $a \in \pi^{-1}(b)$ такой, что $\|a\| = \|b\|^\sim$. А именно, если $c \in \pi^{-1}(b)$, а

$$\alpha(c) = \sup\{r \in \mathbb{R} : re \leq c\} \quad \text{и} \quad \beta(c) = \inf\{r \in \mathbb{R} : c \leq re\},$$

то $a = c - e(\alpha(c) + \beta(c))/2$, причем a не зависит от выбора c . Более того, для любого $s \in \mathbb{R}$ имеем

$$\|a + se\| = \|b\|^\sim + |s| = \frac{\beta(c) - \alpha(c)}{2} + |s|,$$

в частности, $\|b\|^\sim = (\beta(c) - \alpha(c))/2$.

Доказательство. Действительно, $\pi^{-1}(b) = \{c + se : s \in \mathbb{R}\}$, поэтому, как мы уже отмечали в доказательстве леммы 6.54, положив $\alpha = \alpha(c)$ и $\beta = \beta(c)$, имеем $\|c + se\| = \max\{|\alpha + s|, |\beta + s|\}$, и минимум $\|c + se\|$ достигается при таком s , что середина отрезка $[\alpha + s, \beta + s]$ совмещается с нулем, т.е. когда $s = -(\alpha + \beta)/2$. Таким образом, в качестве a подходит ровно один элемент, а именно, $c - e(\alpha + \beta)/2$. Для такого элемента a выполняется $\alpha(a) = (\alpha - \beta)/2$ и $\beta(a) = (\beta - \alpha)/2$. Если $s \geq 0$, то $\|a + se\| = (\beta - \alpha)/2 + s$, а если $s \leq 0$, то $\|a + se\| = (\beta - \alpha)/2 - s$, откуда и получаем искомые формулы. \square

Вернемся к доказательству леммы 6.64. В силу леммы 6.65, выберем $a \in \pi^{-1}(b)$ такой, что $\|a\| = \|b\|^\sim$. Тогда $\|a\| = \|b\|^\sim \leq rL^\sim(b) \leq rL(a) \leq r$. Отсюда заключаем, что $b \in \pi(\mathcal{B}_r)$, т.е. $\pi(\mathcal{B}_r) = \pi(\mathcal{B}^L)$. \square

Лемма 6.66. Пространство $r\mathcal{B}_1 = \{a \in A : \|a\| \leq r, L(a) \leq r\}$ вполне ограничено.

Доказательство. Действительно, $r\mathcal{B}_1 = \{ra : a \in \mathcal{B}_1\}$, поэтому, в силу положительной однородности полунорм, если S — конечная ε -сеть в \mathcal{B}_1 , то rS — конечная $r\varepsilon$ -сеть в $r\mathcal{B}_1$. \square

Вернемся к доказательству теоремы. Так как подмножество вполне ограниченного множества само вполне ограничено, из леммы 6.66 вытекает, что $\mathcal{B}_r \subset r\mathcal{B}_1$ также вполне ограничено. Так как отображение π не увеличивает расстояния, то $\pi(\mathcal{B}_r) = \pi(\mathcal{B}^L)$ также вполне ограничено (здесь мы также воспользовались леммой 6.64). Выберем в $\pi(\mathcal{B}^L)$ конечную $\varepsilon/4$ -сеть $\{b_1, \dots, b_n\}$ и пусть, в соответствии с леммой 6.65, a_i — единственный элемент в $\pi^{-1}(b_i)$, для которого $\|b_i\|^\sim = \|a_i\|$. Положим

$$\mathcal{O} = \left\{ \nu \in \mathcal{S}(A) : |(\mu - \nu)(a_j)| < \varepsilon/4, 1 \leq j \leq n \right\} = \left\{ \nu \in \mathcal{S}(A) : |J_{a_j}(\mu - \nu)| < \varepsilon/4, 1 \leq j \leq n \right\}.$$

Так как все J_{a_j} непрерывны в $*$ -слабой топологии, множество \mathcal{O} открыто в этой топологии. Кроме того, $\mu \in \mathcal{O}$. Таким образом, если мы покажем, что $\mathcal{O} \subset U_\varepsilon(\mu)$, то завершим доказательство теоремы. Сделаем это.

Выберем произвольное $\nu \in \mathcal{O}$. Мы должны показать, что $\rho_L(\mu, \nu) < \varepsilon$. Напомним, что $\rho_L(\mu, \nu)$ равно супремуму величин $|\mu(a) - \nu(a)|$ по всем $a \in A$, $L(a) \leq 1$. С другой стороны, для каждого $s \in \mathbb{R}$ имеем $\mu(a + se) - \nu(a + se) = \mu(a) - \nu(a)$. Отсюда вытекает, что

$$(6.11) \quad \rho_L(\mu, \nu) = \sup \left\{ |\mu(a) - \nu(a)| : a \in A, L(a) \leq 1, \|a\| = \|\pi(a)\|^\sim \right\}.$$

Таким образом, достаточно проверить, что для каждого a из формулы (6.11) выполняется $|\mu(a) - \nu(a)| < 3\varepsilon/4$. Пусть a_j такой, что $\|\pi(a) - b_j\| < \varepsilon/4$. Тогда, по лемме 6.65, существует $s \in \mathbb{R}$, для которого

$$\|a - a_j - se\| = \|\pi(a) - b_j\| < \varepsilon/4.$$

Так как $\|\mu\| = \|\nu\| = 1$, то

$$|\mu(a) - \mu(a_j + se)| = |\mu(a - a_j - se)| < \varepsilon/4$$

и аналогично $|\nu(a) - \nu(a_j + se)| < \varepsilon/4$. Имеем

$$|\mu(a) - \nu(a)| \leq |\mu(a) - \mu(a_j + se)| + |\mu(a_j + se) - \nu(a_j + se)| + |\nu(a_j + se) - \nu(a)| < \varepsilon/4 + \varepsilon/4 + \varepsilon/4 = 3\varepsilon/4$$

поэтому $\mathcal{O} \subset U_\varepsilon(\mu)$. Доказательство закончено. \square

Следствие 6.67. Пусть на $(A, e) \in OUS$ задана Лір-норма L , и $B \subset A$ — линейное подпространство, содержащее e . Тогда ограничение L на B также является Лір-нормой.

Доказательство. При переходе к B полунорма L остается ограниченной и ее ядро по-прежнему совпадает с $\mathbb{R}e$, так как $e \in B$. Таким образом, $L_B := L|_B$ — липшицева полунорма.

Далее, так как L является Лип-нормой, то теорема 6.63 влечет ограниченность метрики ρ_L на $\mathcal{S}(A)$ и полную ограниченность множества $\mathcal{B}_1 = \{a \in A : L(a) \leq 1, \|a\| \leq 1\}$. Соответствующее множество

$$\mathcal{B}_1(B) = \{b \in B : L_B(b) = L(b) \leq 1, \|b\| \leq 1\}$$

содержится в \mathcal{B}_1 , поэтому также вполне ограничено. Для завершения доказательства того, что L_B является Лип-нормой, остается проверить, в силу теоремы 6.63, что метрика ρ_{L_B} ограничена на $\mathcal{S}(B)$.

Как и выше, обозначим \tilde{B} фактор-пространство $B/(\mathbb{R}e)$, являющееся подпространством в $\tilde{A} = A/(\mathbb{R}e)$. Напомним, что для каждого $\tilde{b} \in \tilde{B}$ и $b \in \tilde{b}$ определены $\|\tilde{b}\|_{\tilde{B}} = \inf_{s \in \mathbb{R}} \|b + se\|$ и та же самая формула имеет место для $\|\tilde{b}\|_{\tilde{A}}$, когда \tilde{b} рассматривается как элемент из \tilde{A} . Таким образом, норма на \tilde{B} является ограничением нормы из \tilde{A} . Далее, если $b \in \tilde{b}$, то

$$L_{\tilde{B}}(\tilde{b}) = \inf_{s \in \mathbb{R}} \{L_B(b + se)\},$$

и такая же формула задает $L^{\sim}(\tilde{b})$, так что и $L_{\tilde{B}}$ — ограничение L^{\sim} . Так как L является Лип-нормой, то, по теореме 6.63, ρ_L ограничена на $\mathcal{S}(A)$, т.е. существует $r > 0$ такое, что $\rho_L(\lambda, \mu) \leq 2r$ для всех $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$. По следствию 6.59, эта ограниченность влечет $\|\tilde{a}\|_{\tilde{A}} \leq r L^{\sim}(\tilde{a})$ для всех $\tilde{a} \in \tilde{A}$. Из сказанного выше вытекает, что это неравенство выполняется для всех $\tilde{b} \in \tilde{B}$, а именно, $\|\tilde{b}\|_{\tilde{B}} \leq r L_{\tilde{B}}(\tilde{b})$. Однако последнее, в силу того же следствия 6.59, влечет $\rho_{L_B}(\lambda, \mu) \leq 2r$ для всех $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(B)$, что и доказывает ограниченность метрики ρ_{L_B} на $\mathcal{S}(B)$. \square

6.8.3 Преобразование компактного метрического пространства в квантовое

В качестве иллюстрации покажем, как из теоремы 6.63 вытекает, что для компактного метрического пространства X липшицева полунорма L , определенная на $A = \text{Lip}(X)$ и построенная по метрике пространства X , является Лип-нормой. Напомним (см. раздел 6.3), что $\mathcal{S}(A)$ состоит в точности из всех борелевских вероятностных мер на X , при этом для любых $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ имеем

$$\rho_L(\lambda, \mu) = \sup \left\{ |\lambda(f) - \mu(f)| : f \in A, L(f) \leq 1 \right\},$$

где $\lambda(f) = \int_X f(t) d\lambda(t)$. Заметим, что величина $|\lambda(f) - \mu(f)|$ не меняется, если в f прибавить произвольную константу. Таким образом,

$$\rho_L(\lambda, \mu) = \sup \left\{ |\lambda(f) - \mu(f)| : f \in A, L(f) \leq 1, f(a) = 0 \right\},$$

где $a \in A$ — произвольный фиксированный элемент из A . Но тогда каждая f из предыдущей формулы удовлетворяет $\|f\|_{\infty} \leq r$, где $r = \sup_{x \in X} |ax|$ конечно, так как пространство X компактно. Следовательно, $|\lambda(f)| \leq r$ и $|\mu(f)| \leq r$, откуда $\rho_L(\lambda, \mu) \leq 2r$, т.е. пространство $\mathcal{S}(A)$ с метрикой ρ_L ограничено.

Докажем теперь полную ограниченность множества $\mathcal{B}_1 = \{f \in A : L(f) \leq 1, \|f\|_{\infty} \leq 1\}$. Ограниченность по норме дает равномерную ограниченность этого семейства, а ограниченность по липшицевой полунорме — равностепенную непрерывность. Теперь полная ограниченность \mathcal{B}_1 следует из теоремы Арцела–Асколи (теорема 6.62).

Итак, мы получили следующий результат.

Следствие 6.68. Пусть X — компактное метрическое пространство, $A = \text{Lip}(X)$ — векторное пространство вещественных липшицевых функций на X , наделенное суп-нормой, и L — липшицева полунорма, построенная по суп-норме. Тогда L является Лип-нормой, т.е. (A, L) — компактное квантовое метрическое пространство. Более подробно, $(\mathcal{S}(A), \rho_L)$ — компактное метрическое пространство, топология которого совпадает со $*$ -слабой топологией, индуцированной из A' .

Определение 6.69. Компактное квантовое метрическое пространство (A, L) из следствия 6.68 будем называть **ассоциированным** с компактным метрическим пространством X .

В обозначениях следствия 6.68, рассмотрим отображение $\delta: X \rightarrow A'$, сопоставляющее каждому $x \in X$ дельта-функцию Дирака $\delta_x: A \rightarrow \mathbb{R}$, $\delta_x(f) = f(x)$. Так как для любых $f, g \in A$ имеем

$$|\delta_x(f) - \delta_x(g)| = |f(x) - g(x)| \leq \|f - g\|_\infty,$$

то $\|\delta_x\| \leq 1$, так что δ_x является непрерывным линейным функционалом, т.е. $\delta_x \in A'$. Так как

$$|\delta_x(1) - \delta_x(0)| = 1,$$

то $\|\delta_x\| = 1$. Кроме того, $\delta_x(1) = 1$, поэтому, в силу следствия 5.32, $\delta_x \in \mathcal{S}(A)$.

Далее,

$$\rho_L(\delta_x, \delta_y) = \sup\left\{|\delta_x(f) - \delta_y(f)| : f \in A, L(f) \leq 1\right\} = \sup\left\{|f(x) - f(y)| : f \in A, L(f) \leq 1\right\} \leq |xy|,$$

где последнее неравенство вытекает из того, что каждая f является 1-липшицевой. Выберем в качестве f функцию $y \mapsto |xy|$, тогда $|f(x) - f(y)| = |xy|$, поэтому $\rho_L(\delta_x, \delta_y) = |xy|$. Иными словами, отображение δ изометрично вкладывает X в $\mathcal{S}(A)$.

Напомним, что, в силу предложения 6.32, множество $\mathcal{S}(A) \subset A'$ выпукло. Точка выпуклого множества называется *экстремальной*, если она не является серединой никакого невырожденного отрезка с концами в этом выпуклом множестве.

Задача 6.70. Пусть X — компактное метрическое пространство, $A = \text{Lip}(X)$ — векторное пространство вещественных липшицевых функций на X , наделенное sup -нормой, $\delta: X \rightarrow A'$ — отображение, сопоставляющее каждому $x \in X$ дельта-функцию Дирака $\delta_x: A \rightarrow \mathbb{R}$, $\delta_x(f) = f(x)$. Тогда $\delta(X)$ — множество экстремальных точек выпуклого хаусдорфова компакта $\mathcal{S}(A)$.

6.8.4 Полунепрерывность снизу липшицевых полунорм и восстановление полунормы из метрики

Для $A \in \text{OUS}$, пусть L — липшицева полунорма на A , и ρ_L — соответствующая обобщенная метрика на $\mathcal{S}(A)$. Воспользуемся формулой (6.2) и получим обобщенную полунорму L_{ρ_L} на $\text{Aff}(\mathcal{S}(A)) \subset C(\mathcal{S}(A))$:

$$L_{\rho_L}(f) = \sup\left\{\frac{|f(\lambda) - f(\mu)|}{\rho_L(x, y)} : \lambda, \mu \in \mathcal{S}(A), \lambda \neq \mu\right\}.$$

Представление Кэдисона $\varkappa: A \rightarrow \text{Aff}(\mathcal{S}(A))$ позволяет рассматривать A как линейное подпространство в $\text{Aff}(\mathcal{S}(A))$ и ограничить на него L_{ρ_L} . Таким образом, L_{ρ_L} можно рассматривать как обобщенную полунорму на A . Мы приведем условие на L , которое гарантирует, что $L_{\rho_L} = L$. Это условие называется полунепрерывность снизу. Начнем со следующего общего результата.

Предложение 6.71. В сделанных выше обозначениях, имеем $A \approx \varkappa(A) \subset \text{Lip}^{\rho_L}(\mathcal{S}(A))$, т.е. все функции $\hat{a} = \varkappa(a)$ являются липшицевыми относительно обобщенной метрики ρ_L . Более того, $L_{\rho_L} \leq L$.

Доказательство. Выберем произвольное $a \in A$ и любые $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$, тогда, в силу предложения 6.46, имеем

$$|\hat{a}(\lambda) - \hat{a}(\mu)| = |\lambda(a) - \mu(a)| \leq L(a)\rho_L(\lambda, \mu),$$

и так как липшицева полунорма L конечна, то тем самым мы доказали липшицевость всех функций \hat{a} относительно обобщенной метрики ρ_L , т.е. $\varkappa(A) \subset \text{Lip}^{\rho_L}(\mathcal{S}(A))$. Кроме того, у каждой такой функции \hat{a} в качестве липшицевой константы можно взять $L(a)$, поэтому

$$L_{\rho_L}(a) = L_{\rho_L}(\hat{a}) = \sup\left\{\frac{|\hat{a}(\lambda) - \hat{a}(\mu)|}{\rho_L(\lambda, \mu)} : \lambda, \mu \in \mathcal{S}(A), \lambda \neq \mu\right\} \leq \sup\left\{\frac{L(a)\rho_L(\lambda, \mu)}{\rho_L(\lambda, \mu)} : \lambda, \mu \in \mathcal{S}(A), \lambda \neq \mu\right\} = L(a),$$

так что $L_{\rho_L} \leq L$. □

Предложение 6.72. Пусть L и M — липшицевы полунормы на $A \in \text{OUS}$, причем $M \geq L$. Тогда $\rho_M \leq \rho_L$, в частности,

- (1) если ρ_L конечна, то ρ_M — тоже;
- (2) если ρ_L ограничена, то ρ_M — тоже;
- (3) если ρ_L задает $*$ -слабую топологию на $\mathcal{S}(A)$, то ρ_M — тоже.

Доказательство. Заметим, что $\{a \in A : M(a) \leq 1\} \subset \{a \in A : L(a) \leq 1\}$, поэтому супремум в определении ρ_M берется по меньшему множеству, чем супремум в определении ρ_L , откуда $\rho_M \leq \rho_L$. Пункты (1) и (2) очевидны. Для доказательства пункта (3) напомним, что $*$ -слабая топология на $\mathcal{S}(A)$ компактна и хаусдорфова. В силу предложения 6.33, ρ_M является обобщенной метрикой, поэтому порожденная ей топология на $\mathcal{S}(A)$ — хаусдорфова. Но тогда тождественное отображение из $\mathcal{S}(A)$ в себя, рассматриваемое как отображение из пространства со $*$ -слабой топологией (совпадающей с топологией, порожденной ρ_L) в пространство с топологией, заданной ρ_M — это биективное отображение из компактного пространства в хаусдорфово и, значит, это отображение — гомеоморфизм, что и доказывает пункт (3). \square

Определение 6.73. Пусть V — нормированное пространство, а L — произвольная обобщенная полунорма на V . Тогда L называется *полунепрерывной снизу*, если для любой последовательности $v_1, v_2, \dots \in V$, сходящейся по норме к некоторому $v \in V$, выполняется

$$L(v) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} L(v_n).$$

Замечание 6.74. Отметим, что если обобщенная полунорма L на нормированном пространстве V полунепрерывна снизу, то ограничение L на каждое линейное подпространство в V также полунепрерывно снизу.

Пример 6.75. В силу следствия 6.68, липшицева полунорма L компактного метрического пространства X , определенная на $A = \text{Lip}(X)$ и построенная по метрике пространства X , является Lip -нормой. Покажем теперь, что L полунепрерывна снизу. Для этого рассмотрим произвольную последовательность $f_i \in \text{Lip}(X)$, сходящуюся по sup -норме к некоторой функции $f \in \text{Lip}(X)$. Мы должны показать, что $\liminf_{i \rightarrow \infty} L(f_i) \geq L(f)$. Предположим противное, т.е. $\liminf_{i \rightarrow \infty} L(f_i) < L(f)$. Последнее означает, что для некоторого $\varepsilon > 0$ существует подпоследовательность f_{i_s} такая, что $L(f_{i_s}) \leq L(f) - \varepsilon$ для всех s . Без ограничения общности будем считать, что эта подпоследовательность совпадает со всей последовательностью. По определению L , существуют такие различные $x, y \in X$, что $|f(x) - f(y)| > (L(f) - \varepsilon/2)|xy|$.

Пусть i таково, что $\|f - f_i\|_\infty < \frac{\varepsilon}{4}|xy|$, тогда $|f_i(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4}|xy|$ и $|f_i(y) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{4}|xy|$. Но тогда

$$\begin{aligned} (L(f) - \varepsilon/2)|xy| &< |f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_i(x) + f_i(x) - f_i(y) + f_i(y) - f(y)| \leq \\ &\leq |f(x) - f_i(x)| + |f_i(x) - f_i(y)| + |f_i(y) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{4}|xy| + |f_i(x) - f_i(y)| + \frac{\varepsilon}{4}|xy|, \end{aligned}$$

откуда $|f_i(x) - f_i(y)| > (L(f) - \varepsilon)|xy|$, поэтому $L(f_i) > L(f) - \varepsilon$, противоречие.

Предложение 6.76. Пусть L — обобщенная полунорма на нормированном пространстве V . Тогда L полунепрерывна снизу, если и только если множество $\{v \in V : L(v) \leq 1\}$ замкнуто относительно нормы. Отметим, что множество $\{v \in V : L(v) \leq 1\}$ замкнуто тогда и только тогда, когда замкнуты множества $B_t^L = \{v \in V : L(v) \leq t\}$ для всех неотрицательных t .

Доказательство. Предположим сначала, что обобщенная полунорма L полунепрерывна снизу. Покажем, что тогда множество B_1^L замкнуто относительно нормы. Предположим противное, тогда существует $v \in V \setminus B_1^L$ и последовательность $v_n \in B_1^L$, сходящаяся к v по норме. Так как для всех v_n выполняется $L(v_n) \leq 1$, полунепрерывность снизу влечет

$$L(v) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} L(v_n) \leq 1,$$

поэтому $v \in B_1^L$, противоречие.

Обратно, пусть B_1^L замкнуто относительно нормы. Покажем, что L полунепрерывна снизу. Предположим противное, т.е. существует последовательность v_1, v_2, \dots из V , сходящаяся по норме к некоторому $v \in V$, для которой $L(v) > r := \liminf_{n \rightarrow \infty} L(v_n)$, в частности, $r < \infty$. По определению нижнего предела, для любого $\varepsilon > 0$ существует подпоследовательность v_{s_1}, v_{s_2}, \dots , для которой $L(v_{s_n}) \leq r + \varepsilon$. Выберем ε так, чтобы $s := r + \varepsilon < L(v)$. Без ограничения общности будем считать, что условие $L(v_n) \leq s$ выполняется для всей последовательности

v_n . Рассмотрим новую последовательность $w_n = v_n/s$, тогда $L(w_n) \leq 1$ для всех n и $w_n \rightarrow w = v/s$. Так как множество B_1^L замкнуто относительно нормы, то $w \in B_1^L$, откуда $L(w) \leq 1$. Следовательно,

$$L(v) = L(sw) = sL(w) \leq s < L(v),$$

противоречие.

Наконец, эквивалентность замкнутости B_1^L и всего семейства B_t^L , $t > 0$ вытекает из того, что умножение на ненулевое число является гомеоморфизмом и, поэтому, сохраняет свойство множества быть замкнутым. Кроме того, $B_0^L = \bigcap_{t>0} B_t^L$, поэтому B_0^L замкнуто как пересечение замкнутых множеств. Доказательство закончено. \square

Пусть $A \in \mathcal{OUS}$ и ρ — произвольная обобщенная метрика на $\mathcal{S}(A)$, вообще говоря, не имеющая отношение к $*$ -слабой топологии на $\mathcal{S}(A)$, относительно которой определяется пространство непрерывных функций $C(\mathcal{S}(A))$, наделенное \sup -нормой. Обозначим L_ρ соответствующую обобщенную липшицеву полунорму на векторном пространстве $\mathbb{F}^{\mathcal{S}(A)}$ всех функций, заданных на $\mathcal{S}(A)$. Тем же символом обозначим ограничение L_ρ на $C(\mathcal{S}(A))$.

Предложение 6.77. *Во введенных выше обозначениях, обобщенная полунорма L_ρ полунепрерывна снизу. В частности, если L — липшицева полунорма на A , и $\rho = \rho_L$ — соответствующая обобщенная метрика на $\mathcal{S}(A)$, то ограничение L_ρ на образ $\varkappa(A) \subset C(\mathcal{S}(A))$ представления Кэдисона \varkappa , значит, соответствующая обобщенная полунорма на A , также полунепрерывна снизу.*

Доказательство. Мы должны показать, что для любой последовательности $f_n \in C(\mathcal{S}(A))$, сходящейся по \sup -норме к $f \in C(\mathcal{S}(A))$, выполняется $L_\rho(f) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} L_\rho(f_n)$.

Положим $\alpha = (\lambda, \mu) \in (\mathcal{S}(A) \times \mathcal{S}(A)) \setminus \{\lambda = \mu\}$, $f \in C(\mathcal{S}(A))$, $F_\alpha(f) = \frac{|f(\lambda) - f(\mu)|}{\rho(\lambda, \mu)}$, тогда $\{F_\alpha(f)\}_\alpha$ — семейство функций на $C(\mathcal{S}(A))$, непрерывных в топологии, заданной \sup -нормой.

Заметим, что $L_\rho(f) = \sup_\alpha F_\alpha(f)$, и мы должны проверить неравенство

$$\sup_\alpha F_\alpha(f) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sup_\alpha F_\alpha(f_n).$$

Это неравенство вытекает из следующей леммы.

Лемма 6.78. *Пусть X — топологическое пространство, \mathcal{A} — множество и $\{g_\alpha(x)\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ — семейство непрерывных вещественных функций на X . Положим $h(x) = \sup_{\alpha \in \mathcal{A}} g_\alpha(x)$. Тогда функция h полунепрерывна снизу, т.е. для любой последовательности $x_n \in X$, сходящейся к некоторому x , выполняется $h(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} h(x_n)$.*

Доказательство. Предположим противное, т.е. существует сходящаяся к некоторому $x \in X$ последовательность x_n , для которой $h(x) > r := \liminf_{n \rightarrow \infty} h(x_n)$, в частности, $r < \infty$ и для каждого $\varepsilon > 0$ существует последовательность $n_k \in \mathbb{N}$, для которой $h(x_{n_k}) \leq r + \varepsilon$. По определению h , имеем $g_\alpha(x_{n_k}) \leq h(x_{n_k}) \leq r + \varepsilon$ для всех α и k . Из непрерывности функций g_α вытекает, что $g_\alpha(x) \leq r + \varepsilon$ для всех $\alpha \in \mathcal{A}$, поэтому $h(x) \leq r + \varepsilon$. В силу произвольности выбора ε , имеем $h(x) \leq r$, противоречие. \square

Доказательство предложения закончено. \square

Для доказательства следующей теоремы нам понадобится понятие полярности и соответствующая теорема о биполярности. Доказательство этих результатов мы опустим, отослав читателя к [26]. Мы приведем формулировку в интересующих нас случаях нормированных пространств. В [26] рассматривается более общая ситуация, а именно, когда векторное пространство — топологическое и локально выпуклое (топология задается семейством полунорм).

Пусть A — нормированное пространство, например $A \in \mathcal{OUS}$, а $X \subset A$ — произвольное непустое подмножество. **Полярной** X° множества X называется множество подмножество в двойственном пространстве A^* , заданное так

$$X^\circ = \left\{ f \in A^* : |f(x)| \leq 1 \text{ для всех } x \in X \right\}.$$

Пример 6.79. Если $X = \{0\}$, то $X^\circ = A^*$. Если же $X \subset A$ — замкнутый единичный шар с центром в 0 (относительно нормы), то $X^\circ \subset A^*$ — замкнутый единичный шар с центром в 0 относительно двойственной нормы.

Аналогичным образом определяется преполяра, а именно, для непустого $F \subset A^*$ его **преполяра** ${}^\circ F$ — это подмножество A , заданное так:

$${}^\circ F = \left\{ a \in A : |f(a)| \leq 1 \text{ для всех } f \in F \right\}.$$

Биполярной непустого множества $X \subset A$ называется множество ${}^\circ(X^\circ) \subset A$.

Определение 6.80. Непустое подмножество $X \subset A$ называется **сбалансированным**, если для любого $x \in X$ все точки cx , $|c| \leq 1$ лежат в X (если A — вещественное пространство, то $c \in [-1, 1]$). В частности, каждое сбалансированное множество содержит 0.

Для $X \subset A$ пересечение всех множеств $Y \supset X$, обладающих данным набором свойств \mathcal{P} , называется **\mathcal{P} -оболочкой** X . Так, например, определяется **замкнутая выпуклая сбалансированная оболочка** X .

Теорема 6.81 (см. [26, 1.8 Bipolar Theorem, p. 127]). *Для непустого $X \subset A$ его биполяра ${}^\circ(X^\circ)$ является замкнутой выпуклой сбалансированной оболочкой множества X .*

Мы применим теорему 6.81 в доказательстве следующей теоремы.

Теорема 6.82. *Пусть $(A, \epsilon) \in \mathcal{OUS}$ и L — липшицева полунорма, а ρ_L — соответствующая обобщенная метрика на $\mathcal{S}(A)$. Обозначим L_{ρ_L} порожденную ρ_L обобщенную полунорму на $C(\mathcal{S}(A))$ и, значит, на A (благодаря представлению Кэдисона). Тогда*

- (1) $Z := \{a \in A : L_{\rho_L}(a) \leq 1\}$ является замыканием по норме множества $X := \{a \in A : L(a) \leq 1\}$;
- (2) обобщенная полунорма L_{ρ_L} — наибольшая из полунепрерывных снизу полунорм, меньших L ;
- (3) $\rho_{L_{\rho_L}} = \rho_L$.

Доказательство. (1) Мы должны показать, что Z является замыканием X . Так как L — полунорма, то X — выпуклое и сбалансированное подмножество в A .

Лемма 6.83. *Пусть V — нормированное пространство (вещественное или комплексное), W — непустое подмножество V , и \overline{W} — замыкание W . Тогда*

- (1) если W выпукло, то и \overline{W} выпукло;
- (2) если W сбалансировано, то и \overline{W} сбалансировано.

Таким образом, замыкание выпуклого сбалансированного множества W является замкнутой выпуклой сбалансированной оболочкой W .

Доказательство. (1) Выберем произвольные $x, y \in \overline{W}$, тогда каждая точка отрезка $[x, y]$ имеет вид $(1-t)x + ty$ для некоторого $t \in [0, 1]$. Так как x и y лежат в замыкании W , то существуют лежащие в W последовательности $x_n \rightarrow x$ и $y_n \rightarrow y$. В силу непрерывности операций векторного пространства, имеем $(1-t)x_n + ty_n \rightarrow (1-t)x + ty$. Но $(1-t)x_n + ty_n \in W$, так как W — выпукло, поэтому $(1-t)x + ty \in \overline{W}$ и, значит, $[x, y] \subset \overline{W}$, что и доказывает выпуклость \overline{W} .

(2) Выберем произвольное $x \in \overline{W}$ и покажем, что для каждого $c \in \mathbb{F}$, $|c| \leq 1$, все точки cx содержатся в \overline{W} . Рассмотрим последовательность $x_n \in W$, сходящуюся к x . Тогда для каждого $c \in \mathbb{F}$, $|c| \leq 1$, имеем $cx_n \in W$ и $cx_n \rightarrow cx$. Следовательно, $cx \in \overline{W}$ в силу замкнутости \overline{W} . \square

Вернемся к доказательству теоремы. В силу леммы 6.83, \overline{X} является замкнутой выпуклой сбалансированной оболочкой X , и, по теореме 6.81, совпадает с биполярной ${}^\circ(X^\circ)$. Таким образом, мы должны показать, что $Z = {}^\circ(X^\circ)$.

Напомним, что двойственная обобщенная полунорма L' на A' определяется так:

$$L'(f) = \sup \left\{ |f(a)| : a \in A, L(a) \leq 1 \right\} = \sup \left\{ |f(a)| : a \in X \right\}.$$

Пусть $Y \subset A'$ — единичный шар с центром в нуле относительно обобщенной полунормы L' , т.е.

$$Y = \{f \in A' : L'(f) \leq 1\} = \left\{ f \in A' : |f(a)| \leq 1 \text{ для всех } a \in X \right\} = X^\circ.$$

Таким образом, нам остается показать, что $Z = {}^\circ Y$.

По определению, L_{ρ_L} — обобщенная полунорма на $C(\mathcal{S}(A))$, а ее ограничение на $\varkappa(A)$ (которое мы отождествляем с A) задается так:

$$L_{\rho_L}(a) = \sup \left\{ \frac{|\lambda(a) - \mu(a)|}{\rho_L(\lambda, \mu)} : \lambda, \mu \in \mathcal{S}(A), \lambda \neq \mu \right\},$$

поэтому

$$L_{\rho_L}(a) \leq 1 \Leftrightarrow |\lambda(a) - \mu(a)| \leq \rho_L(\lambda, \mu) \quad \forall \lambda, \mu \in \mathcal{S}(A), \lambda \neq \mu.$$

Отметим, что последнее неравенство автоматически выполняется и для $\lambda = \mu$, так что мы уберем ограничение $\lambda \neq \mu$.

По предложению 6.55, множество всех $\nu = \lambda - \mu$, где $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$, составляет шар D_2 в A'° радиуса 2 с центром в нуле (относительно двойственной нормы).

Лемма 6.84. *Для любых $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ выполняется $\rho_L(\lambda, \mu) = L'(\lambda - \mu)$.*

Доказательство. По определению,

$$L'(\lambda - \mu) = \sup \left\{ |(\lambda - \mu)(a)| : a \in A, L(a) \leq 1 \right\} = \sup \left\{ |\lambda(a) - \mu(a)| : a \in A, L(a) \leq 1 \right\} = \rho_L(\lambda, \mu),$$

что и требовалось. □

Таким образом, в силу леммы 6.84,

$$L_{\rho_L}(a) \leq 1 \Leftrightarrow |\nu(a)| \leq L'(\nu) \quad \text{для всех } \nu \in D_2.$$

Так как ρ_L является обобщенной метрикой по предложению 6.33, то $L'(\nu) = L'(\lambda - \mu) = \rho_L(\lambda, \mu) \neq 0$ для $\nu \neq 0$. Используя положительную однородность по ν в неравенстве $|\nu(a)| \leq L'(\nu)$, заключаем, что оно равносильно условию

$$|\nu(a)| \leq L'(\nu) \Leftrightarrow |\nu(a)| \leq 1 \quad \text{для всех } \nu \in A'^{\circ} \text{ таких, что } L'(\nu) \leq 1.$$

По предложению 6.57, $L'(\lambda) = \infty$ для всех $\lambda \notin A'^{\circ}$, поэтому предыдущее условие равносильно

$$|f(a)| \leq 1 \quad \text{для всех } f \in A' \text{ таких, что } L'(f) \leq 1.$$

Итак, мы показали, что

$$Z = \{a \in A : |f(a)| \leq 1, f \in A', L'(f) \leq 1\} = \{a \in A : |f(a)| \leq 1, f \in Y\} = {}^\circ Y,$$

что и требовалось.

(2) Так как $X \subset Z$, то, в силу предложения 6.5, имеем $L_{\rho_L} \leq L$, в частности, L_{ρ_L} — полунорма. По предложению 6.77, полунорма L_{ρ_L} полунепрерывна снизу. Пусть M — полунорма на A такая, что $L_{\rho_L} < M \leq L$. Мы должны показать, что M не может быть полунепрерывной снизу. Положим $W = \{a \in A : M(a) \leq 1\}$. По предложению 6.5, $X \subset W \subset Z$ и $W \neq Z$. Но тогда множество W не замкнуто в A по норме, что противоречит предложению 6.76.

(3) Напомним, что для $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$

$$\rho_L(\lambda, \mu) = \sup \left\{ |\lambda(a) - \mu(a)| : a \in X \right\}, \quad \rho_{L_\rho}(\lambda, \mu) = \sup \left\{ |\lambda(a) - \mu(a)| : a \in Z \right\}.$$

Функции $h(a) = |\lambda(a) - \mu(a)|$ непрерывны на A в топологии, заданной нормой, так как такими являются функционалы λ и μ . Но супремумы непрерывной функции по подмножеству топологического пространства и замыканию этого подмножества равны (убедитесь), поэтому $\rho_L(\lambda, \mu) = \rho_{L_\rho}(\lambda, \mu)$, что и требовалось. □

Из теоремы 6.82 мгновенно вытекает, полунепрерывности липшицевой полунормы достаточно для ее восстановления из соответствующей обобщенной метрики.

Следствие 6.85. *Пусть $A \in OUS$ и L — полунепрерывная снизу липшицева полунорма, а ρ_L — соответствующая обобщенная метрика на $\mathcal{S}(A)$. Обозначим L_{ρ_L} порожденную ρ_L обобщенную полунорму на $C(\mathcal{S}(A))$ и, значит, на A (благодаря представлению Кэдисона). Тогда $L_{\rho_L} = L$.*

Доказательство. Так как, по теореме 6.82, L_{ρ_L} является наибольшей полунепрерывной снизу липшицевой полунормой, не превосходящей L , то, в силу предположения следствия, $L = L_{\rho_L}$. \square

Приведем пример липшицевой полунормы, которая индуцирует $*$ -слабую топологию на $\mathcal{S}(A)$, т.е. является Лип-нормой, однако она — не полунепрерывна снизу.

Пример 6.86. Пусть $I = [-1, 1] \subset \mathbb{R}$, а $A = C^1(I)$ — векторное пространство всех непрерывно дифференцируемых функций на отрезке $[-1, 1]$. В качестве нормы выберем суп-норму $\|\cdot\|_\infty$. Определим теперь полунорму L так:

$$L(f) = \|f'\|_\infty + |f'(0)|.$$

Отметим, что A содержит стандартную порядковую единицу e , равную постоянной функции 1. Пусть для $f \in A$ выполняется $L(f) = 0$. Это равносильно $\|f'\|_\infty = 0$ и $f'(0) = 0$. Первое равенство дает $f' = 0$, т.е. $f = \text{const}$. Второе равенство выполняется для постоянных функций. Таким образом, $L(f) = 0$ в точности на константах, т.е. L — липшицева полунорма.

Задача 6.87. Докажите, что L задает $*$ -слабую топологию на $\mathcal{S}(A)$.

Покажем теперь, что L не полунепрерывна снизу. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ зададим непрерывную функцию $g_n: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ так: $g_n(t) = n|t|$ при $|t| \leq 1/n$, и $g_n(t) = 1$ на оставшихся t , тогда функция $f_n(t) = \int_{-1}^t g_n(s) ds$ принадлежит A . Легко проверить, что f_n равномерно сходится к $f(t) = t+1$, т.е. сходится по норме пространства A к $f \in A$. Имеем

$$L(f_n) = \|g_n\|_\infty + |g_n(0)| = 1 + 0 = 1, \quad L(f) = \|1\|_\infty + |1| = 2,$$

поэтому $L(f) > \liminf_{n \rightarrow \infty} L(f_n)$, так что L не полунепрерывна снизу.

6.8.5 Функционал Минковского

Для дальнейшего нам понадобится функционал Минковского. Напомним его определение и как он связан с обобщенными полунормами.

Для произвольного подмножества K векторного пространства V **функционал Минковского** $\Phi := \Phi_K: V \rightarrow [0, \infty]$, **соответствующий** K , определяется так:

$$\Phi(v) = \Phi_K(v) = \inf\{r \in (0, \infty) : v \in rK\} = \inf\{r \in (0, \infty) : v/r \in K\}.$$

Отметим, что для вектора v может не существовать ни одного r , удовлетворяющего условию из определения Φ . В этом случае, принимая во внимание естественное соглашение $\inf \emptyset = \infty$, имеем $\Phi(v) = \infty$. Например, если $K = \{0\}$, то $\Phi(0) = 0$, а на каждом ненулевом векторе функционал Φ равен ∞ .

Лемма 6.88. Функционал $\Phi = \Phi_K$ равен ∞ на всем V , если и только если $K = \emptyset$.

Доказательство. Пусть $K = \emptyset$, тогда для любых $v \in V$ и $r \in (0, \infty)$ имеем $rv \notin K$, поэтому $\Phi(v) = \inf \emptyset = \infty$. Обратно, если $\Phi(v) = \infty$, то это означает, что для каждого $r \in (0, \infty)$ имеем $rv \notin K$, в частности, $v \notin K$. Таким образом, ни один вектор из V не содержится в K , поэтому $K = \emptyset$. \square

Функционалы Минковского естественно возникают при изучении обобщенных полунорм.

Предложение 6.89. Пусть L — обобщенная полунорма на векторном пространстве V и

$$K = \{v \in V : L(v) \leq 1\}.$$

Тогда функционал Минковского Φ_K совпадает с L . В частности, $K = \{v \in V : \Phi_K(v) \leq 1\}$.

Доказательство. Выберем произвольное $v \in V$. Если $L(v) = \infty$, то для каждого $r \in (0, \infty)$ также $L(v/r) = \infty$, поэтому ни для одного такого r не выполняется $v/r \in K$ и, значит, $\Phi(v) = \infty = L(v)$.

Пусть теперь $L(v) < \infty$. Тогда множество $\{r \in (0, \infty) : v/r \in K\}$ непусто. Выберем из него произвольное r , тогда $v/r \in K$, откуда $L(v/r) \leq 1$ и, значит, $L(v) \leq r$. Переходя к точной нижней грани по r , заключаем, что $L(v) \leq \Phi(v)$.

Докажем теперь, что $L(v) \geq \Phi(v)$. Предположим противное, т.е. что для некоторого $v \in V$ выполняется $L(v) < \Phi_K(v)$. В частности, $\Phi_K(v) > 0$. Выберем произвольное $r \in (0, \infty)$ такое, что $L(v) < r < \Phi(v)$, тогда $L(v/r) < 1$, поэтому $v/r \in K$ и, значит, $\Phi(v) \leq r$, противоречие, завершающее доказательство. \square

Предложение 6.90. Пусть $K_1 \subset K_2$ — подмножества векторного пространства V и Φ_i — функционал Минковского, соответствующий K_i , $i = 1, 2$. Тогда $\Phi_1 \geq \Phi_2$.

Доказательство. Выберем произвольное $v \in V$, тогда

$$\Phi_1(v) = \inf\{r \in (0, \infty) : v \in rK_1\} \geq \inf\{r \in (0, \infty) : v \in rK_2\} = \Phi_2(v),$$

что и требовалось. \square

Всюду ниже K обозначает произвольное подмножество векторного пространства V , а $\Phi = \Phi_K$ — соответствующий функционал Минковского.

Предложение 6.91. Если $0 \in K$, то $\Phi(0) = 0$, если же $0 \notin K$, то $\Phi(0) = \infty$.

Доказательство. Если $0 \in K$, то при каждом $r \in (0, \infty)$ выполняется $0 \in rK$, так что точная нижняя грань таких r равна 0, т.е. $\Phi(0) = 0$.

Если же $0 \notin K$, то ни для одного $r \in (0, \infty)$ не выполняется $0 \in rK$, поэтому $\Phi(0) = \infty$ как точная нижняя грань для пустого множества. \square

Для произвольного $F \subset \mathbb{F}$ положим $FK = \{\alpha v : \alpha \in F, v \in K\}$. Нам особенно понадобится множество $(0, 1]K$, которое мы обозначим K^σ . Так как $1 \in (0, 1]$, то $K \subset K^\sigma$.

Лемма 6.92. Во введенных выше обозначениях, $0 \in K$ тогда и только тогда, когда $0 \in K^\sigma$.

Доказательство. Если $0 \in K$, то так как $K \subset K^\sigma$, имеем $0 \in K^\sigma$. Если же $0 \notin K$, то в K^σ также нет нуля потому, что $K^\sigma = \cup_{v \in K} (0, 1]\{v\}$, и все v из предыдущей формулы отличны от нуля. \square

Предложение 6.93. Имеем $\Phi = \Phi_{K^\sigma}$.

Доказательство. Выберем произвольный $v \in V$. Пусть сначала $v = 0$. По лемме 6.92, в K и K^σ одновременно или содержится, или не содержится 0. В силу предложения 6.91, если 0 содержится в K и K^σ , то $\Phi(v) = \Phi_{K^\sigma}(v) = 0$, а если нет, то $\Phi(v) = \Phi_{K^\sigma}(v) = \infty$.

Пусть теперь $v \neq 0$. Так как $K \subset K^\sigma$, то, в силу предложения 6.90, имеем $\Phi \geq \Phi_{K^\sigma}$. Таким образом, достаточно проверить, что $\Phi(v) \leq \Phi_{K^\sigma}(v)$. Предположим противное, т.е. что $\Phi(v) > \Phi_{K^\sigma}(v)$, в частности, $\Phi_{K^\sigma}(v) < \infty$. Так как $\Phi_{K^\sigma}(v)$ равно, по определению, точной нижней грани тех $r \in (0, \infty)$, для которых $v \in rK^\sigma$, и, в силу $\Phi_{K^\sigma}(v) < \infty$, множество таких r непусто, поэтому существует $r \in (0, \infty)$ такое, что $\Phi(v) > r$ и $v \in rK^\sigma$. Последнее влечет существование $w \in K^\sigma$, для которого $v = rw$. По определению K^σ , существуют $u \in K$ и $t \in (0, 1]$ такие, что $w = tu$, откуда $v = rtu$. Таким образом, $v \in rtK$, поэтому $\Phi(v) \leq rt \leq r < \Phi(v)$, противоречие. \square

Пример 6.94. Евклидова норма на плоскости \mathbb{R}^2 совпадает с функционалом Минковского Φ_K для K , равного объединению начала координат и единичной окружности с центром в нуле. Такой же функционал получится, если к K добавить любое подмножество единичного круга с центром в нуле.

Предложение 6.95. Для каждого $v \in V$ и $t \in (0, \infty)$ выполняется $\Phi(tv) = t\Phi(v)$.

Доказательство. Если $\Phi(v) = \infty$, то не существует $r \in (0, \infty)$ такого, что $v/r \in K$. Значит, и для любого $t \in (0, \infty)$ также не существует $r \in (0, \infty)$, для которого $tv/r \in K$. Следовательно, для таких t имеем $\infty = \Phi(tv) = t\infty = t\Phi(v)$.

Если же $\Phi(v) < \infty$, то при каждом $r \in (0, \infty)$ условие $v \in rK$ равносильно условию $tv \in trK$, поэтому точные нижние грани r_0 тех r , для которых выполняется первое или второе условия, равны, и значит, $\Phi(v) = r_0$ и $\Phi(tv) = tr_0 = t\Phi(v)$, что и требовалось. \square

Множество $K \subset V$ назовем **радиальным**,³ если для любого $v \in K$ имеем место включение $(0, 1]\{v\} \subset K$. Отметим, что пустое множество K является радиальным.

Следующее предложение очевидно.

Предложение 6.96. Для любого $K \subset V$ множество $K^\sigma = (0, 1]K$ — радиальное. Множество K — радиальное, если и только если $K = K^\sigma$. В частности, для любого $K \subset V$ имеем $(K^\sigma)^\sigma = K^\sigma$.

³В некоторых текстах под радиальным понимают более широкое множество, добавляя начало координат.

Предложение 6.97. Множество $K \subset V$ — радиальное, если и только если для любых вещественных $0 < t_1 \leq t_2 < \infty$ выполняется $t_1 K \subset t_2 K$.

Доказательство. Для $K = \emptyset$ предложение очевидно выполняется. Рассмотрим теперь случай $K \neq \emptyset$.

Пусть K — радиальное множество. Выберем произвольные $0 < t_1 \leq t_2 < \infty$ и пусть $w \in t_1 K$, тогда $w = t_1 v$ для некоторого $v \in K$. Так как K — радиальное, то $(0, 1]\{v\} \subset K$, откуда $t_i(0, 1]\{v\} = (0, t_i]\{v\} \subset t_i K$, $i = 1, 2$, поэтому

$$w = t_1 v \in (0, t_1]\{v\} \subset (0, t_2]\{v\} \subset t_2 K,$$

так что $t_1 K \subset t_2 K$ в силу произвольности w .

Обратно, пусть для любых вещественных $0 < t_1 \leq t_2 < \infty$ выполняется $t_1 K \subset t_2 K$. Покажем, что K — радиальное. Выберем произвольное $v \in K$, а также любое $t \in (0, 1]$. Мы должны показать, что $t v \in K$. Но $t v \in t K$, а по условию, $t K \subset 1 K = K$, что и требовалось. \square

Положим

$$K_d = \{v \in V : \Phi(v) < 1\}, \quad K_u = \{v \in V : \Phi(v) \leq 1\}.$$

Лемма 6.98. Начало координат $0 \in V$ или одновременно принадлежит всем K , K^σ , K_d и K_u , или одновременно ни в одном из них не содержится.

Доказательство. Так как, в силу леммы 6.92, множества K и K^σ одновременно или содержат, или не содержат 0 , утверждение настоящей леммы достаточно доказать для K , K_d и K_u .

Если $0 \in K$, то, по предложению 6.91, $\Phi(0) = 0$, поэтому 0 принадлежит K_d и K_u . Если же $0 \notin K$, то, по предложению 6.91, $\Phi(0) = \infty$, поэтому 0 не принадлежит ни K_d , ни K_u . \square

Лемма 6.99. Множества K , K^σ , K_d и K_u или одновременно пусты, или все непусты.

Доказательство. Пусть $K = \emptyset$, тогда $K^\sigma = (0, 1]K = \emptyset$. По лемме 6.88, имеем $\Phi \equiv \infty$, поэтому не существует $v \in V$, для которого $\Phi(v) \leq 1$, откуда $K_d = K_u = \emptyset$.

Пусть теперь $K \neq \emptyset$, тогда $K^\sigma = (0, 1]K \neq \emptyset$. По лемме 6.88, существует $v \in V$ такой, что $\Phi(v) < \infty$. По предложению 6.95, для $\Phi(v) < r < \infty$ выполняется $\Phi(v/r) < 1$, так что $v/r \in K_d \subset K_u$, откуда K_d и K_u непусты. \square

Предложение 6.100. Множества K^σ , K_d и K_u — радиальные.

Доказательство. Радиальность K^σ содержится в предложении 6.96. Докажем радиальность K_d и K_u . Достаточно рассмотреть случай непустых K_d и K_u . Выберем произвольный $v \in K_d$. Тогда $\Phi(v) < 1$ и, в силу предложения 6.95, для всех $t \in (0, 1]$ выполняется $\Phi(tv) = t\Phi(v) < 1$, так что $(0, 1]\{v\} \subset K_d$, поэтому K_d — радиальное. Аналогично для K_u . \square

Предложение 6.101. Для произвольного $K \subset V$ имеем

- (1) $K \subset K_u$;
- (2) если K — радиальное, то $K_d \subset K$;
- (3) если K не является радиальным, то включение $K_d \subset K$ может оказаться неверным.

Доказательство. По лемме 6.99 и в силу радиальности пустого множества, для $K = \emptyset$ пункты (1) и (2) выполняются, а в пункте (3) множество K автоматически не является пустым. Таким образом, будем сразу предполагать, что $K \neq \emptyset$.

(1) Выберем произвольное $v \in K$, тогда при $r = 1$ имеем $v \in r K$, откуда $\Phi(v) \leq 1$, т.е. $v \in K_u$ и, значит, $K \subset K_u$.

(2) Так как $K \neq \emptyset$, то, по лемме 6.99, имеем $K_d \neq \emptyset$. Пусть $v \in K_d$, тогда $\Phi(v) < 1$, т.е. существует $0 < r < 1$, для которого $v \in r K \subset K$, где последнее включение вытекает из предложения 6.97.

(3) Рассмотрим для примера $K = \{1\} \subset \mathbb{R}$. Тогда $K_d = (0, 1)$, но $(0, 1) \not\subset \{1\}$. \square

Предложение 6.102. Для $K \subset V$ и $K' \subset V$ предположим, что $K_d \subset K' \subset K_u$. Тогда

- (1) множество K' — радиальное;
- (2) $\Phi = \Phi_{K'}$.

Доказательство. Если $K = \emptyset$, то, по лемме 6.99, имеем $K_d = K_u = \emptyset$, откуда $K' = \emptyset = K$, поэтому K' — радиальное и $\Phi = \Phi_{K'}$. Пусть теперь $K \neq \emptyset$.

(1) Берем произвольное $v \in K'$, тогда $\Phi(v) \leq 1$, так как $K' \subset K_u$. Для каждого $v' \in (0, 1)\{v\}$ существует $t \in (0, 1)$ такое, что $v' = tv$. В силу предложения 6.95, имеем $\Phi(v') = \Phi(tv) = t\Phi(v) < 1$, поэтому $v' \in K_d \subset K'$. Но тогда и $(0, 1]\{v\} \subset K'$, что и требовалось.

(2) Выберем произвольное $v \in V$. Пусть $v = 0$. В силу леммы 6.98, множества K , K_d и K_u одновременно или содержат, или не содержат 0. Если содержат, то так как $K_d \subset K'$, множество K' также содержит 0. Если не содержат, то так как $K' \subset K_u$, то и K' не содержит 0. Тем самым, K и K' одновременно или содержат, или не содержат 0. Но это означает, в силу предложения 6.91, что значения в 0 функционалов Φ и $\Phi_{K'}$ совпадают.

Пусть теперь $v \neq 0$. Рассмотрим сначала случай $\Phi(v) = \infty$. Если для некоторого $r \in (0, \infty)$ выполняется $v/r \in K'$, то $\Phi(v/r) \leq 1$, так как $K' \subset K_u$. Но тогда, в силу предложения 6.95, имеем $\Phi(v) \leq r$, противоречие. Таким образом, ни для одного $r \in (0, \infty)$ не выполняется $v/r \in K'$, поэтому $\Phi_{K'}(v) = \infty = \Phi(v)$.

Пусть теперь $\Phi(v) < \infty$. Рассмотрим сначала случай $\Phi(v) = 0$. По предложению 6.95, для любого $r \in (0, \infty)$ имеем $\Phi(rv) = r\Phi(v) = 0$, поэтому для всех таких r выполняется $rv \in K_d \subset K'$, откуда

$$\Phi_{K'}(v) = \inf\{r \in (0, \infty) : rv \in K'\} = 0 = \Phi(v).$$

Рассмотрим теперь оставшийся случай $0 < \Phi(v) < \infty$. Положим $w = v/\Phi(v)$, тогда $\Phi(w) = 1$ в силу предложения 6.95, так что $w \in K_u$ и при каждом $r \in (1, \infty)$ имеем $\Phi(w/r) < 1$ в силу того же предложения 6.95, поэтому $w/r \in K_d \subset K'$, откуда

$$\Phi_{K'}(w) = \inf\{r \in (0, r) : w/r \in K'\} \leq 1.$$

С другой стороны, если $r < 1$, то $\Phi(w/r) > 1$, поэтому при всех $r < 1$ имеем $w/r \notin K_u$ и, значит, $w/r \notin K'$, поэтому $\Phi_{K'}(w) \geq 1$. Таким образом, мы показали, что $\Phi_{K'}(w) = 1$. В силу предложения 6.95, выполняется

$$\Phi_{K'}(v) = \Phi(v)\Phi_{K'}(w) = \Phi(v),$$

что и требовалось. □

Следствие 6.103. Имеем $K_d \subset K^\sigma \subset K_u$.

Доказательство. По предложению 6.93, имеем $\Phi = \Phi_{K^\sigma}$, поэтому K_d и K_u для K совпадают соответственно с $K'_d := \{v \in V : \Phi_{K^\sigma}(v) < 1\}$ и $K'_u := \{v \in V : \Phi_{K^\sigma}(v) \leq 1\}$. Так как, в силу предложения 6.96, множество K^σ — радиальное, то, из предложения 6.101 вытекает, что $K_d = K'_d \subset K^\sigma \subset K'_u = K_u$. □

Следствие 6.104. Для любого $K \subset V$ имеем $\Phi = \Phi_{K^\sigma} = \Phi_{K_d} = \Phi_{K_u}$.

Доказательство. В силу следствия 6.103, имеем $K_d \subset K^\sigma \subset K_u$, а предложение 6.102 влечет

$$\Phi = \Phi_{K^\sigma} = \Phi_{K_d} = \Phi_{K_u},$$

что и требовалось. □

Предложение 6.105. Если Φ — обобщенная полунорма, то оба множества K_d и K_u выпуклы и сбалансированы.

Доказательство. Докажем выпуклость K_u . Выберем произвольные $v, w \in K_u$, тогда $\Phi(v) \leq 1$ и $\Phi(w) \leq 1$. В силу полуаддитивности и положительной однородности функции Φ , для каждого $t \in [0, 1]$ имеем

$$\Phi((1-t)v + tw) \leq (1-t)\Phi(v) + t\Phi(w) \leq 1,$$

так что $(1-t)v + tw \in K_u$, поэтому K_u — выпукло.

Докажем теперь сбалансированность K_u . Пусть $v \in K_u$, тогда $\Phi(v) \leq 1$. Выберем произвольное $c \in \mathbb{F}$, $|c| \leq 1$. Из положительной однородности Φ вытекает, что $\Phi(cv) = |c|\Phi(v) \leq 1$, откуда $cv \in K_u$, что и требовалось.

Аналогично доказывается выпуклость и сбалансированность K_d . □

Замечание 6.106. Для обобщенной полунормы Φ множества K и K^σ не обязаны быть ни выпуклыми, ни сбалансированными. Например, рассмотрим в качестве $K = K^\sigma$ подмножество плоскости с координатами x, y , представляющее собой открытый квадрат $\{(x, y) : |x| < 1, |y| < 1\}$, к которому добавлены точки $(1, 1)$ и $(-1, 1)$. Это множество задает на плоскости шах-норму, но при это не является ни выпуклым, ни сбалансированным.

Предложение 6.107. Пусть $K \subset V$ — выпукло и сбалансировано, тогда Φ — обобщенная полунорма.

Доказательство. Как отмечалось в определении 6.80, каждое сбалансированное множество содержит 0, поэтому $0 \in K$. Но тогда, по предложению 6.91, имеем $\Phi(0) = 0$.

Докажем положительную однородность Φ . Выберем произвольное $v \in V$ и любое $\alpha \in \mathbb{F}$. Если $\alpha = 0$, то $\Phi(\alpha v) = \Phi(0) = 0 = |\alpha|\Phi(v)$, где последнее равенство имеет место в силу соглашения $0 \cdot \infty = 0$.

Пусть теперь $\alpha \neq 0$. Положим $c = \alpha/|\alpha|$, тогда $|c| = 1$. По определению,

$$\Phi(v) = \inf\{r \in (0, \infty) : v \in rK\},$$

и так как K сбалансировано, то $v \in rK$, если и только если $cv \in rK$, откуда $\Phi(v) = \Phi(cv)$. По предложению 6.95, для каждого $t \in (0, \infty)$ имеем $\Phi(tv) = t\Phi(v)$, поэтому

$$\Phi(\alpha v) = \Phi(|\alpha|cv) = |\alpha|\Phi(cv) = |\alpha|\Phi(v),$$

что и доказывает положительную однородность Φ .

Докажем теперь субаддитивность Φ . Выберем произвольные $v, w \in V$ и покажем, что $\Phi(v+w) \leq \Phi(v) + \Phi(w)$. Если $\Phi(v) = \infty$ или $\Phi(w) = \infty$, то все доказано. Пусть теперь $\Phi(v) < \infty$ и $\Phi(w) < \infty$. Тогда существуют $r_v, r_w \in (0, \infty)$, для которых $v/r_v, w/r_w \in K$. Так как K выпукло, то

$$\frac{v+w}{r_v+r_w} = \frac{r_v}{r_v+r_w} \frac{v}{r_v} + \frac{r_w}{r_v+r_w} \frac{w}{r_w} \in K,$$

поэтому

$$\Phi\left(\frac{v+w}{r_v+r_w}\right) \leq 1.$$

В силу положительной однородности Φ , имеем $\Phi(v+w) \leq r_v + r_w$. Переходя к точной нижней грани по r_v и r_w , получаем субаддитивность Φ . \square

Следствие 6.108. Если K^σ, K_d или K_u — выпукло и сбалансировано, то Φ — обобщенная полунорма.

Доказательство. Так как, по следствию 6.104, имеем $\Phi = \Phi_{K^\sigma} = \Phi_{K_d} = \Phi_{K_u}$, то в качестве K можно взять то из K^σ, K_d и K_u , которое выпукло и сбалансировано, а затем применить предложение 6.107. \square

Определение 6.109. Подмножество K векторного пространства V называется **поглощающим**, если для любого $v \in V$ существует $r \in (0, \infty)$ такое, что $v \in rK$. В частности, каждое поглощающее подмножество содержит 0, и надмножество каждого поглощающего множества также поглощающее.

Предложение 6.110. Множества $K \subset V$ и K^σ одновременно поглощающие или нет.

Доказательство. Так как $K \subset K^\sigma$, а каждое надмножество поглощающего множества само поглощающее, то если K — поглощающее, то и K^σ — такое же. Пусть теперь K^σ — поглощающее, тогда для каждого $v \in V$ существует $r \in (0, \infty)$ такое, что $v/r \in K^\sigma$. По определению K^σ , существует $w \in K$ и $t \in (0, 1]$ такое, что $v/r = tw$. Но тогда $v/(rt) = w \in K$, поэтому K — также поглощающее множество. \square

Лемма 6.111. Пусть $K \subset V$, $t \in (0, \infty)$ и $K_1 \subset \dots \subset K_n \subset tK_1 \subset V$, тогда

- (1) множество K — поглощающее, если и только если tK — поглощающее;
- (2) все множества K_1, \dots, K_n одновременно или поглощающие, или нет.

Доказательство. (1) Пусть множество K — поглощающее, тогда для каждого $v \in V$ существует $r \in (0, \infty)$, для которого $v/t \in rK$, но тогда $v \in r(tK)$, так что tK — поглощающее. Равенство $K = (1/t)(tK)$ завершает доказательство этого пункта.

(2) Если одно из K_i — поглощающее, то и все надмножества, в частности, tK_1 — тоже поглощающие. Из пункта (1) вытекает, что тогда и K_1 — поглощающее, поэтому все K_i такие. \square

Следствие 6.112. Если одно из множеств K, K^σ, K_d и K_u — поглощающее, то и все остальные — такие же. Таким образом, или все четыре множества поглощающие, или ни одно из них поглощающим не является.

Доказательство. В силу следствия 6.103, имеем $(1/2)K_u \subset K_d \subset K^\sigma \subset K_u$, поэтому K^σ , K_d и K_u одновременно поглощающие или нет по лемме 6.111. По предложению 6.110, множества K и K^σ одновременно поглощающие или нет. Последнее завершает доказательство. \square

Предложение 6.113. *Функционал Φ конечный, если и только если K , или K^σ , или K_d , или K_u — поглощающее множество.*

Доказательство. По определению, конечность функционала Φ равносильна тому, что для каждого $v \in V$ существует $r \in (0, \infty)$, для которого $v \in rK$. Но это есть в точности условие того, что K — поглощающее множество. Тем самым мы показали, что Φ конечен, если и только если множество K — поглощающее. По следствию 6.112, K , K^σ , K_d и K_u одновременно или поглощающие, или нет, что и завершает доказательство. \square

Определение 6.114. Назовем функционал Минковского Φ *невырожденным*, если для любого $v \in V$, $v \neq 0$ выполняется $\Phi(v) \neq 0$.

Предложение 6.115. *Функционал Φ — невырожденный, если и только если K_d не содержит ни одного открытого луча, выходящего из начала координат.*

Доказательство. Пусть Φ невырожден, тогда для любого $v \neq 0$ имеем $\Phi(v) \neq 0$, откуда $w = 2v/\Phi(v)$, в силу предложения 6.95, удовлетворяет $\Phi(w) = 2$, поэтому $w \notin K_d$. Таким образом, открытый луч из начала координат в направлении вектора v не содержится в K_d . Так как v — произвольный вектор, получаем декларируемое.

Обратно, мы покажем, что если Φ вырожденный, то некоторый открытый луч содержится в K_d . Пусть Φ — вырожденный, тогда существует $v \in V$ такое, что $\Phi(v) = 0$, но $v \neq 0$. Тогда для каждого $t \in (0, \infty)$ имеем $\Phi(tv) = 0$ по предложению 6.95, поэтому весь открытый луч, выходящий из начала координат в направлении v , содержится в K_d . \square

Аналогично лемме 6.111, доказываемся следующий результат.

Лемма 6.116. *Пусть $K \subset V$, $t \in (0, \infty)$ и $K_1 \subset \dots \subset K_n \subset tK_1 \subset V$, тогда*

- (1) *множество K содержит открытый луч, выходящий из начала координат, если и только если tK содержит этот луч;*
- (2) *все множества K_1, \dots, K_n одновременно или содержат открытый луч, выходящий из начала координат, или нет.*

Следствие 6.117. *Если одно из множеств K^σ , K_d и K_u содержит открытый луч, выходящий из начала координат, то и два остальных множества также содержат этот луч. Таким образом, или все три множества содержат такой луч, или все три не содержат.*

Доказательство. В силу следствия 6.103, имеем $(1/2)K_u \subset K_d \subset K^\sigma \subset K_u$. Остается применить лемму 6.116. \square

Предыдущие предложения удобно объединить в следствие.

Следствие 6.118. *Функционал Минковского Φ является*

- *обобщенной полунормой тогда и только тогда, когда или K_d , или K_u — выпуклое и сбалансированное;*
- *обобщенной нормой тогда и только тогда, когда или K_d , или K_u — выпуклое, сбалансированное и не содержит ни одного открытого луча, выходящего из начала координат;*
- *полунормой тогда и только тогда, когда или K_d , или K_u — выпуклое, сбалансированное и поглощающее;*
- *нормой тогда и только тогда, когда или K_d , или K_u — выпуклое, сбалансированное, поглощающее и не содержит ни одного открытого луча, выходящего из начала координат.*

6.8.6 Пополнение Минковского и замыкание полунорм

Предложение 6.119. Пусть V — подпространство нормированного пространства W , $L: V \rightarrow [0, \infty]$ — обобщенная полунорма, $K = \{v \in V : L(v) \leq 1\} \subset V \subset W$, и \bar{K} — замыкание K в W . Обозначим Φ функционал Минковского, соответствующий \bar{K} . Тогда Φ — обобщенная полунорма.

Доказательство. В силу следствия 6.118, достаточно показать, что множество \bar{K} — выпуклое и сбалансированное. Однако это мгновенно вытекает из леммы 6.83. \square

Для нормированного пространства V и полунормы L на V обозначим

- V^c пополнение по норме векторного пространства V ;
- \bar{B}^L замыкание в V^c множества $B^L = \{v \in V : L(v) \leq 1\}$;
- $L^c: V^c \rightarrow [0, \infty]$ функционал Минковского для \bar{B}^L ;
- \bar{V} линейное подпространство в V^c , состоящее из всех $v \in V^c$, для которых $L^c(v) < \infty$;
- \bar{L} ограничение L^c на \bar{V} ;
- $B^{\bar{L}} = \{v \in \bar{V} : \bar{L}(v) \leq 1\}$.

Из предложения 6.119 вытекает, что L^c — обобщенная полунорма, а \bar{L} — полунорма. Пространство \bar{V} с полунормой \bar{L} назовем **пополнением Минковского** пары (V, L) . Так как, по определению функционала Минковского, для каждого $v \in \bar{B}^L$ выполняется $L^c(v) \leq 1 < \infty$, то $\bar{B}^L \subset \bar{L}$. Кроме того, шар \bar{B}^L замкнут в V^c и, значит, замкнут в индуцированной топологии на \bar{V} , т.е. относительно нормы пространства \bar{V} . Из предложения 6.76 вытекает, что полунорма \bar{L} полунепрерывна снизу. Так как шар \bar{B}^L замкнут в полном пространстве V^c , то сам он является полным метрическим пространством (относительно нормы). При этом само пространство \bar{V} , в отличие от V^c , может быть неполным относительно нормы.

Пример 6.120. Пусть $V = \mathcal{P}([a, b])$ — пространство всех вещественных многочленов, ограниченных на отрезок $[a, b]$, наделенное \sup -нормой и стандартной липшицевой полунормой L . Тогда, по теореме Вейерштрасса, $V^c = C([a, b])$ — пространство всех непрерывных функций на $[a, b]$, а $\bar{V} = \text{Lip}([a, b])$ — подпространство всех липшицевых функций. Последнее пространство не является полным по той же теореме Вейерштрасса. В примере 6.75 мы показали, что липшицева полунорма \bar{L} полунепрерывна снизу, поэтому $B^{\bar{L}} = \text{Lip}_1([a, b])$ — замкнутое подмножество V^c и, значит, полное метрическое пространство.

Определение 6.121. Полунорму \bar{L} назовем **замыканием** полунормы L . Полунорма L называется **замкнутой**, если шар B^L замкнут в \bar{V} , т.е. $B^L = \bar{B}^L$ и, значит, $V = \bar{V}$.

Предложение 6.122. Полунорма L замкнута, если и только если шар B^L — полное пространство относительно нормы на V .

Доказательство. Если полунорма L замкнута, то $B^L = \bar{B}^L$, а последний шар, как было отмечено выше, — полный. Обратно, если шар B^L полный, то в V^c он замкнут и, значит, $B^L = \bar{B}^L$. \square

Замечание 6.123. Так как операция замыкания в топологии, заданной нормой, применяется к единичному шару полунормы L в разных пространствах, а замкнутость L в этих пространствах приводит к существенно разным свойствам полунормы L , соберем в данном замечании известные результаты, чтобы подчеркнуть имеющиеся отличия.

Итак, пусть V — нормированное пространство, L — полунорма на V , и $B^L = \{v \in V : L(v) \leq 1\}$ — единичный шар этой полунормы. Тогда

- (1) замкнутость шара B^L в V в топологии, заданной нормой пространства V , равносильна полунепрерывности снизу полунормы L (предложение 6.76);
- (2) замкнутость шара B^L в V^c в топологии, заданной нормой пополнения V^c пространства V , равносильна полноте метрического пространства B^L в метрической топологии, порожденной нормой пространства V (предложение 6.122);

- (3) замкнутость шара B^L в \bar{V} в топологии, индуцированной V^c , равносильна его замкнутости в топологии V^c ;
- (4) предыдущие два свойства названы замкнутостью полунормы L ;
- (5) замкнутость шара B^L в V в топологии пространства V не влечет замкнутость B^L в V^c , тем самым, полунепрерывность снизу полунормы L не влечет ее замкнутость;
- (6) замкнутость шара B^L в V^c или в \bar{V} влечет замкнутость B^L в V , поэтому замкнутость полунормы L влечет ее полунепрерывность снизу.

Верно ли, что замыкание полунормы является продолжением исходной полунормы, т.е. ограничение замыкания на исходное пространство совпадает с исходной полунормой? В общем случае ответ отрицательный.

Пример 6.124. Пусть $A = C([0, 1])$ — пространство непрерывных функций нормой

$$\|f\| = \int_0^1 |f(x)| dx.$$

В качестве L возьмем $L(f) = f(0)$. Пусть $B^L = \{f \in A : L(f) \leq 1\}$, тогда $1 \in B^L$ и $L(1) = 1$. Для каждого $c \in \mathbb{R}$ рассмотрим последовательность функций $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, равных c на $[1/n, 1]$ и $f_n(x) = nx$ на $[0, 1/n]$. Тогда $L(f_n) = 0$, т.е. $f_n \in B^L$, но $\|c - f_n\| = (1/2)(1/n)c \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, т.е. $f_n \rightarrow c$. Таким образом, $\mathbb{R} \subset \bar{B}^L$, поэтому $\bar{L}(1) = 0$.

Замечание 6.125. Отметим, что в примере 6.124 единичный шар B^L полунормы L незамкнут в пространстве A , что и приводит к неравенству полунормы L и ее замыкания \bar{L} , ограниченного на A . Кроме того, пространство A — неполное.

Задача 6.126. Можно ли построить пример, аналогичный 6.124, но в котором пространство A — полное? А если дополнительно потребовать, чтобы L была липшицевой полунормой или Лип-нормой?

Предложение 6.127. Пусть V — нормированное пространство и L — полунорма на V . Тогда для каждого $v \in V$ выполняется $\bar{L}(v) \leq L(v)$.

Доказательство. По предложению 6.89, полунорма L является функционалом Минковского для своего единичного шара $B^L = \{v \in V : L(v) \leq 1\}$. Обозначим той же буквой L продолжение L на \bar{V} , а именно, это новое L будем считать функционалом Минковского для $B^L \subset \bar{V}$. Так как $B^L \subset \bar{B}^L$, а \bar{L} — функционал Минковского для \bar{B}^L , то, в силу предложения 6.90, имеем $\bar{L}(v) \leq L(v)$ для всех $v \in \bar{V}$, в частности, это имеет место и для всех $v \in V$. \square

Тем не менее, если добавить условие полунепрерывности снизу, то ситуация исправится.

Предложение 6.128. Пусть V — нормированное пространство и L — полунепрерывная снизу полунорма на V . Тогда \bar{L} является продолжением L , т.е. для каждого $v \in V$ выполняется $\bar{L}(v) = L(v)$.

Доказательство. Пусть L_1 обозначает ограничение полунормы \bar{L} на V . Мы должны показать, что $L_1 = L$. Положим $B_1 = \{v \in V : L_1(v) \leq 1\}$. В силу предложения 6.89, достаточно показать, что $B_1 = B^L = \{v \in V : L(v) \leq 1\}$. В силу предложения 6.127, для каждого $v \in B^L$ выполняется $\bar{L}(v) \leq L(v) \leq 1$, поэтому $v \in B_1$, так что, в силу произвольности v , имеем $B^L \subset B_1$.

Докажем обратное включение. Пусть $v \in B_1$, тогда существует последовательность $v_i \in B^L$, сходящаяся по норме к v . Так как L полунепрерывна снизу, имеем

$$L(v) \leq \liminf_{i \rightarrow \infty} L(v_i) \leq 1,$$

поэтому $v \in B^L$ и, значит, $B_1 \subset B^L$. \square

Даже если полунорма L является Лип-нормой, возможна ситуация, при которой \bar{L} не является продолжением L .

Пример 6.129. Рассмотрим пример 6.86. Напомним конструкцию из этого примера. Пусть $I = [-1, 1] \subset \mathbb{R}$, а $A = C^1(I)$ — векторное пространство всех непрерывно дифференцируемых функций на отрезке $[-1, 1]$. В качестве нормы выберем \sup -норму $\|\cdot\|_\infty$, а полунорму L определим так:

$$L(f) = \|f'\|_\infty + |f'(0)|.$$

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ зададим непрерывную функцию $g_n: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ так: $g_n(t) = n|t|$ при $|t| \leq 1/n$, и $g_n(t) = 1$ на оставшихся t , тогда функция $f_n(t) = \int_{-1}^t g_n(s) ds$ принадлежит A . Последовательность f_n сходится к $f(t) = t + 1 \in A$ по норме пространства A , а $L(f_n) = 1$ и $L(f) = 2$. Это означает, что $f \in \bar{B}^L$, так что $\bar{L}(f) \leq 1$, но $L(f) = 2$, поэтому $\bar{L}(f) \neq L(f)$.

Верно ли, что замыкание липшицевой полунормы также липшицево? В общем случае, ответ отрицательный.

Замечание 6.130. Пусть $A \in \mathcal{OUS}$ — алгебра вещественных многочленов, ограниченных на отрезок $[0, 2]$, наделенная \sup -нормой. Определим $L: A \rightarrow [0, \infty]$, положив

$$L(f) = \sup \left\{ \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} : x \neq y, x, y \in [0, 1] \right\}.$$

Обратите внимание, что супремум в предыдущей формуле берется не по всему отрезку $[0, 2]$, а по его подотрезку $[0, 1]$. Покажем, что L является липшицевой полунормой. Действительно, каждый многочлен имеет на отрезке $[0, 1]$ ограниченную производную, а это означает, что каждый многочлен — липшицева функция. Кроме того, равенство $L(f) = 0$ равносильно тому, что многочлен f постоянен на отрезке $[0, 1]$ и, значит, на всем $[0, 2]$. Таким образом, ядро L состоит из постоянных функций.

По теореме Вейерштрасса, \bar{A} состоит из всех липшицевых функций на $[0, 2]$. Однако каждая непрерывная функция, постоянная на $[0, 1]$, входит в ядро \bar{L} , поэтому размерность ядра больше 1.

Пусть V — нормированное векторное пространство над полем \mathbb{F} , а V^c — его пополнение. Пусть $f \in V^*$ — произвольный непрерывный линейный функционал на V . По теореме Хана–Банаха 1.11, существует продолжение \bar{f} функционала f на все V^c без увеличения нормы. Так как функционал f ограниченный, то и \bar{f} — такой же и, значит, непрерывный, т.е. $\bar{f} \in (V^c)^*$. С другой стороны, так как каждая точка из V^c является пределом некоторой последовательности точек из V , функционал \bar{f} определен однозначно (по непрерывности). Таким образом, определено отображение $f \mapsto \bar{f}$, являющееся изоморфизмом пространств V^* и $(V^c)^*$. Так как норма при этом сохраняется, этот изоморфизм является изометрией.

Пусть теперь $(A, e) \in \mathcal{OUS}$ и A^c — пополнение этого пространства. Если $f \in \mathcal{S}(A)$, то соответствующий функционал $\bar{f} \in (A^c)'$ имеет ту же норму 1 и, являясь продолжением f , удовлетворяет $\bar{f}(e) = f(e) = 1$. В силу следствия 5.32, функционал \bar{f} — состояние, т.е. $\bar{f} \in \mathcal{S}(A^c)$. Обратно, для каждого состояния $\bar{g} \in \mathcal{S}(A^c)$ его ограничение $\bar{g}|_A$ на A имеет единичную норму (так как A всюду плотно в A^c) и удовлетворяет $\bar{g}|_A(e) = \bar{g}(e) = 1$ (так как $e \in A$), поэтому, в силу того же следствия 5.32, $\bar{g}|_A$ также является состоянием, т.е. $\bar{g}|_A \in \mathcal{S}(A)$.

Предложение 6.131. Пусть $A \in \mathcal{OUS}$ и L — липшицева полунорма на A . Обозначим \bar{A} пополнение Минковского пары (A, L) , и пусть \bar{L} — замыкание полунормы L . Тогда для любых $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ и соответствующих им $\bar{\lambda}, \bar{\mu} \in \mathcal{S}(\bar{A})$ выполняется $\rho_{\bar{L}}(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \rho_L(\lambda, \mu)$.

Доказательство. По определению пополнения Минковского, единичный шар $B^{\bar{L}} \subset \bar{A}$ для полунормы \bar{L} является замыканием в \bar{A} по норме единичного шара $B^L \subset A \subset \bar{A}$ для L , т.е. $B^{\bar{L}} = \bar{B}^L$. В частности, это означает, что супремум непрерывной на \bar{A} функции по шару $B^{\bar{L}}$ и по его части B^L совпадают. Кроме того, в силу сказанного выше, $\lambda = \bar{\lambda}|_A$ и $\mu = \bar{\mu}|_A$. Тогда

$$\begin{aligned} \rho_{\bar{L}}(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) &= \sup \left\{ |\bar{\lambda}(a) - \bar{\mu}(a)| : a \in B^{\bar{L}} \right\} = \sup \left\{ |\bar{\lambda}(a) - \bar{\mu}(a)| : a \in B^L \right\} = \\ &= \sup \left\{ |\bar{\lambda}|_A(a) - \bar{\mu}|_A(a)| : a \in B^L \right\} = \sup \left\{ |\lambda(a) - \mu(a)| : a \in B^L \right\} = \rho_L(\lambda, \mu), \end{aligned}$$

что и требовалось. \square

6.9 Радиус квантового метрического пространства

Пусть $(A, L) \in \mathcal{CQ}$, т.е. L — это Лір-норма. Аналогично формуле (6.8), зададим на A' двойственную обобщенную полунорму

$$(6.12) \quad L'(\lambda) = \sup \left\{ |\lambda(a)| : a \in A, L(a) \leq 1 \right\}.$$

По лемме 6.84, имеем $\rho_L(\lambda, \mu) = L'(\lambda - \mu)$ для любых $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$.

Рассуждения, аналогичные проделанным в замечании 6.45, показывают, что если $\lambda(e) \neq 0$, то $L'(\lambda) = \infty$, так как в качестве $a \in A$, $L(a) \leq 1$, можно выбирать всевозможные re , $r \in \mathbb{R}$. Таким образом, конечным может быть лишь ограничение L' на A'° . Это ограничение мы также обозначим L' . Ясно, что для каждого $\nu \in A'$ и любых $\lambda, \mu \in \nu + \mathcal{S}(A)$ имеем $\lambda - \mu \in A'^\circ$ и $\rho_L(\lambda, \mu) = L'(\lambda - \mu)$.

Предложение 6.132. *Обобщенная полунорма L' на A'° является нормой, ограниченной на шаре $D_2 \subset A'^\circ$ из предложения 6.55.*

Доказательство. Докажем сначала положительную определенность L' . Пусть $\lambda \in A'^\circ$ такой, что $L'(\lambda) = 0$. Это означает, что для каждого $a \in A$, $L(a) \leq 1$, выполняется $\lambda(a) = 0$. По определению L , для каждого $a \notin \mathbb{R}e$, имеем $L(a) \neq 0$, поэтому, из однородности функционала λ вытекает, что $\lambda(a) = 0$ для всех $a \notin \mathbb{R}e$. Но так как $\lambda \in A'^\circ$, то $\lambda(re) = 0$ для всех $r \in \mathbb{R}$. Таким образом, $\lambda(a) = 0$ при всех $a \in A$, откуда $\lambda = 0$.

Покажем, что L' — норма, т.е. что L' конечна. Так как Лип-норма L , по определению, индуцирует *-слабую топологию на $\mathcal{S}(A)$, то $\mathcal{S}(A)$ — компакт в топологии, заданной метрикой ρ_L , следовательно, это метрическое пространство ограничено. Так как для любых $\lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)$ имеем $\rho_L(\lambda, \mu) = L'(\lambda - \mu)$, а шар $D_2 \subset A'^\circ$ из предложения 6.55 составлен из всех таких разностей $\lambda - \mu$, то L' ограничена на шаре D_2 и, значит, ограничена на всем A'° . \square

Пусть $\|\cdot\|'$ обозначает ограничение на A'° двойственной нормы из A' , заданной порядковой нормой на A .

Следствие 6.133. *Существует константа $r \geq 0$, для которой $L' \leq r \|\cdot\|'$.*

Доказательство. По предложению 6.132, величина $r := (1/2) \sup_{\lambda \in D_2} L'(\lambda)$ конечна. Покажем, что это r удовлетворяет условию следствия. Выберем произвольное $\mu \in A'$. Если $\mu = 0$, то $L'(\mu) = 0 \leq r \|\mu\|' = 0$. Если же $\mu \neq 0$, то положим $\lambda = 2\mu/\|\mu\|'$, тогда $\lambda \in D_2$, поэтому

$$L'(\mu) = \frac{\|\mu\|'}{2} L'(\lambda) \leq \frac{\|\mu\|'}{2} (2r) = r \|\mu\|',$$

что и требовалось. \square

Наименьшая константа r из следствия 6.133 называется **радиусом компактного квантового метрического пространства** (A, L) и обозначается $\text{rad}(A, L)$ или, если понятно, о какой полунорме L идет речь, то $\text{rad}(A)$. Из следствия 6.59 заключаем:

Следствие 6.134. *Пусть $(A, L) \in \mathcal{CQ}$, тогда величина*

$$\begin{aligned} \text{rad}(A, L) &= \min\{r \in \mathbb{R} : \rho_L(\lambda, \mu) \leq 2r, \lambda, \mu \in \mathcal{S}(A)\} = \\ &= \min\{r \in \mathbb{R} : L'(\lambda) \leq r \|\lambda\|', \lambda \in A'^\circ\} = \\ &= \min\{r \in \mathbb{R} : \|b\|^\sim \leq r L^\sim(b), b \in \tilde{A}\} \end{aligned}$$

конечна. В частности, пространство состояний каждого компактного квантового метрического пространства ограничено.

Литература

- [1] Александрян Р.А., Мирзаханян Э.А. *Общая топология*. Учебное пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1979.
- [2] Бураго Д.Ю., Бураго Ю.Д., Иванов С.В. *Курс метрической геометрии*. Москва-Ижевск, Институт компьютерных исследований, 2004.
- [3] Gromov M. *Metric structures for Riemannian and non-Riemannian spaces*, Birkhдuser (1999). ISBN 0-8176-3898-9 (translation with additional content).
- [4] Rieffel M.A. *Compact Quantum Metric Spaces*, arXiv:math/0308207 [math.OA].
- [5] Rieffel M.A. *Metrics on states from actions of compact groups*. Doc. Math., 1998, v. 3, 215–229, см. также arXiv:math/9807084 [math.OA].
- [6] Rieffel M.A. *Metrics on state spaces*, Doc. Math., 1999, v. 4, pp. 559–600, см. также arXiv:math/9906151 [math.OA].
- [7] Rieffel M.A. *Gromov–Hausdorff distance for quantum metric spaces*. Mem. Amer. Math. Soc., 2004, v. 168, pp. 1–65, см. также arXiv:math/0011063 [math.OA].
- [8] Kerr D. *Matricial quantum Gromov-Hausdorff distance*. J. Funct. Anal., 2003, v. 205, no. 1, pp. 132–167, см. также arXiv:math/0207282 [math.OA].
- [9] Kerr D., Li H. *On Gromov–Hausdorff convergence of operator metric spaces*. J. Oper. Theory, 2009, v. 1, no. 1, 83–109, см. также arXiv:math/0411157 [math.OA].
- [10] Wu W. *Non-commutative metrics on state spaces*, J Ramanujan Math. Soc., 2005, v. 20, no. 3, pp. 215–214, см. также arXiv:math/0411475 [math.OA].
- [11] Wu W. *Non-commutative metric topology on matrix state spaces*. Proc. Amer. Math. Soc., 2006, v. 134, no. 2, pp. 443–453, см. также arXiv:math/0410587 [math.OA].
- [12] Wu W. *Quantized Gromov-Hausdorff distance*. J. Funct. Anal. 2006, v. 238, no. 1, pp. 58–98, см. также arXiv:math/0503344 [math.OA].
- [13] Paulsen V., Tomforde M. *Vector spaces with an order unit*. ArXiv:0712.2613 [math.OA].
- [14] Putnam I.F. *Lecture Notes on C*-algebras*.
https://www.math.uvic.ca/faculty/putnam/ln/C*-algebras.pdf
- [15] Kesavan S. *Functional Analysis*, Hindustan Book Agency, 2009.
- [16] Мерфи Дж. *C*-алгебры и теория операторов*. Факториал, 1997.
- [17] Pedersen G. K. *C*-algebras and their automorphism groups*. London: Academic Press, 1979.
- [18] Kadison R.V. *A representation theory for commutative topological algebra*. Mem. Amer. Math. Soc., no. 7, 1951.
- [19] Богачев В.И. *Слабая сходимость мер*, Ижевский институт компьютерных исследований, Москва–Ижевск, 2016.

- [20] Богачев В.И. *Основы теории меры*, Том 1, РХД, М. – 2003.
- [21] Богачев В.И. *Основы теории меры*, Том 2, РХД, М. – 2003.
- [22] Rudin W. *Real and complex analysis*, (third edition), McGraw-Hill Book Co., New York, 1987.
- [23] Latrémolière, F. *The quantum Gromov–Hausdorff propinquity*. Trans. Amer. Math. Soc., 2016, v. 368, N 1, 365–411.
- [24] Dudley R.M. *Real analysis and probability*. CRC Press, 2018.
- [25] Alfsen E.M. *Compact convex sets and boundary integrals*, Springer-Verlag, Berlin, New York, 1971.
- [26] Conway J.B. *A course in functional analysis*, Graduate Texts in Mathematics 96, Springer-Verlag, 1985.
- [27] https://en.wikipedia.org/wiki/Hahn-Banach_theorem
- [28] Krein M., Milman D. *On extreme points of regular convex sets*, Studia Mathematica, 1940, v. 9, pp. 133–138.